



سوال 1: ماڈرن پیریاڈک لاء سے کیا مراد ہے؟ ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو کیسے ترتیب دیا گیا ہے؟

جواب: ماڈرن پیریاڈک لاء: ”ماڈرن پیریاڈک لاء کے مطابق ایلیمنٹس کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات ان کے ایٹم نمبرز کے پیریاڈک افعال ہیں۔“

ماڈرن پیریاڈک ٹیبل: ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو ان کے ایٹم نمبرز میں بتدریج اضافے کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ جب ایلیمنٹس کو بائیں سے دائیں ان کے ایٹم نمبرز میں اضافے کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے تو باقاعدہ وقفوں کے بعد ایلیمنٹس کے خواص میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایلیمنٹس کو اس طرح ترتیب دینے سے ایک پیریاڈک ٹیبل وجود میں آتا ہے جس میں ایک جیسے خواص والے ایلیمنٹس کو عمودی سیریز میں رکھا گیا ہے۔

گروپس (Groups)

ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کی عمودی سیریز کو گروپس کہتے ہیں۔

پیریڈز (Periods)

ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں موجود افقی سیریز کو پیریڈز کہتے ہیں۔

سوال 2: پیریڈز سے کیا مراد ہے؟ پیریاڈک ٹیبل کے پیریڈز کی وضاحت کریں۔

جواب: پیریڈز: پیریاڈک ٹیبل میں موجود افقی قطاروں کو پیریڈز کہتے ہیں۔

پیریڈز کی تعداد: ٹیبل میں کل سات پیریڈز ہیں۔ پہلے پیریڈ کے علاوہ باقی سارے پیریڈز کا آغاز الکی میٹلز سے ہے اور اختتام نوبل گیسز پر ہوتا ہے۔ ایک پیریڈ کی تکمیل اور دوسرے پیریڈ کی شیل کی تکمیل ہے چونکہ کسی شیل میں موجود الیکٹرونز کی تعداد مخصوص ہوتی ہے اس لیے پیریڈ میں موجود ایلیمنٹس کی تعداد بھی مخصوص ہوگی۔

پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈز

| نمبر شمار | پیریڈ کا نام          | پیریڈ میں موجود عناصر کی تعداد | تکمیل ہونے والے شیل کا نمبر |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1         | شورٹ (Short)          | 2                              | پہلا                        |
| 2         | نارمل (Normal)        | 8                              | دوسرا                       |
| 3         | نارمل (Normal)        | 8                              | تیسرا                       |
| 4         | لونگ (Long)           | 18                             | چوتھا                       |
| 5         | لونگ (Long)           | 18                             | پانچواں                     |
| 6         | ویری لونگ (Very long) | 32                             | چھٹا                        |
| 7         | ویری لونگ (Very long) | 32                             | ساتواں                      |

لیتھنائڈز اور ایکٹینائڈز: چھٹے اور ساتویں پیریڈز میں موجود چودہ ایلیمنٹس کی دوسری بنائی گئی ہیں جن کو پیریاڈک ٹیبل میں جگہ کی کمی کی وجہ سے پیریاڈک ٹیبل کے نیچے مخصوص جگہوں پر رکھا گیا ہے۔ پہلی سیریز لیتھیم کے بعد شروع ہوتی ہے اس کو لیتھنائڈز کہتے ہیں۔ دوسری سیریز ایٹینیم کے بعد شروع ہوتی ہے اس کو ایکٹینائڈز کہتے ہیں۔

ایف بلاک ایلیمنٹس: لیتھنائڈز اور ایکٹینائڈز سیریز میں موجود ایلیمنٹس کو مجموعی طور پر ایف بلاک ایلیمنٹس یا ریرا تھس (Rare Earths) کہتے ہیں۔

سوال 3: گروپس سے کیا مراد ہے؟ پیریاڈک ٹیبل کے گروپس کی وضاحت کریں۔

جواب: گروپس: پیریاڈک ٹیبل میں موجود عمودی سیریز کو گروپس کہتے ہیں۔

ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں گروپس کی تعداد پیریاڈک ٹیبل میں ٹوٹل اٹھارہ گروپس ہیں۔

وضاحت: گروپس میں موجود ایلیمینٹس کے خواص آپس میں ملتے جلتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیرونی شیلز میں الیکٹرونز کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہر گروپ میں موجود ایلیمینٹس ایک فیملی ہے جس کا اپنا ایک فیملی نام ہے۔

گروپس کے فیملی نام

| گروپ نمبر | فیملی کا نام   | بیرونی شیل کا الیکٹرونک کنفیگوریشن | گروپ نمبر | فیملی کا نام       | بیرونی شیل کا الیکٹرونک کنفیگوریشن |
|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|
| 1         | الکلی میٹلز    | $ns^1$                             | 2         | الکلائن ارتھ میٹلز | $ns^2$                             |
| 3 to 12   | ٹرانزیشن میٹلز | $nd^x ns^2$                        | 13        | بورون فیملی        | $ns^2 np^1$                        |
| 14        | کاربن فیملی    | $ns^2 np^2$                        | 15        | نائٹروجن فیملی     | $ns^2 np^3$                        |
| 16        | آکسیجن فیملی   | $ns^2 np^4$                        | 17        | ہیلوجن فیملی       | $ns^2 np^5$                        |
| 18        | نوبل گیس       | $ns^2 np^6$                        |           |                    |                                    |

نارل ایلیمینٹس گروپ 1 تا 2 اور 13 سے 17 میں موجود ایلیمینٹس کو نارل ایلیمینٹس کہتے ہیں ان میں اندرونی تمام شیلز الیکٹرونز سے بھرے ہوتے ہیں جبکہ بیرونی شیل ناممکن ہوتا ہے۔

ٹرانزیشن ایلیمینٹس گروپ 3 تا 12 میں موجود ایلیمینٹس ٹرانزیشن ایلیمینٹس کہلاتے ہیں اور ان ایلیمینٹس کے اندرونی سب شیلز بتدریج مکمل ہو رہے ہوتے ہیں۔

سوال 4: پیریاڈک ٹیبل میں موجود بلاکس پر نوٹ لکھیں۔  
جواب: پیریاڈک ٹیبل میں موجود ایلیمینٹس کو چار بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے کسی بلاک کا نام اس میں موجود ایلیمینٹس کے اس سب شیل پر رکھا گیا ہے جو مکمل ہو رہا ہے۔

s بلاک: گروپ I اور II کے ایلیمینٹس کو s بلاک ایلیمینٹس کہتے ہیں کیونکہ ان کے بیرونی شیلز کے سب شیلز مکمل ہو رہے ہوتے ہیں۔  
p بلاک: گروپ 13 سے 18 (سوائے ہیلیم) میں موجود ایلیمینٹس p بلاک ایلیمینٹس کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے بیرونی شیلز میں موجود p سب شیلز مکمل ہو رہے ہوتے ہیں۔

d بلاک: s اور p گروپس کے درمیان d بلاک ایلیمینٹس موجود ہیں۔ کیونکہ ان کے بیرونی شیلز میں موجود ہی سب شیلز مکمل ہو رہے ہوتے ہیں۔  
f بلاک: f بلاک ایلیمینٹس پیریاڈک ٹیبل کے نچلے حصہ میں موجود دو سیریز ہیں۔

مشق

- ایک ایلیمینٹ کے بیرونی شیل کا الیکٹرونک کنفیگوریشن  $s^2 p^3$  ہے۔ پیریاڈک ٹیبل میں اس ایلیمینٹ کا پیریڈ نمبر اور گروپ نمبر معلوم کریں۔ نیز یہ بھی معلوم کریں کہ یہ ایلیمینٹ کس بلاک میں موجود ہے؟  
جواب: ایلیمینٹ کا پیریڈ نمبر 3 اور گروپ نمبر 15 ہے۔ یہ p بلاک میں موجود ہے۔
- ایلیمینٹ کا گروپ نمبر معلوم کریں جبکہ اس کے بیرونی شیل میں آٹھ الیکٹرونز ہیں۔ یا ایلیمینٹ کسی طبعی حالت میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے؟  
جواب: یہ گروپ 18 میں موجود ہوگا۔ یہ ایلیمینٹ کسی حالت میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔
- ایک ایلیمینٹ کا گروپ نمبر 16 ہے اور یہ ایک گیس ہے یہ ایلیمینٹ کس پیریڈ میں موجود ہوگا؟  
جواب: ایلیمینٹ دوسرے پیریڈ میں موجود ہوگا۔

# ماڈرن پیریڈک ٹیبل

30 — Atomic Number  
**Zn** — Element Symbol  
 Zinc — Element Name

ماڈرن پیریادک ٹیبل

30 — Atomic Number  
Zn — Element Symbol  
Zinc — Element Name

4 Be Beryllium  
12 Mg Magnesium

20 Ca Calcium

38 Sr Strontium

56 Ba Barium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

21 Sc Scandium

39 Y Yttrium

57 La Lanthanum

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

22 Ti Titanium

40 Zr Zirconium

72 Hf Hafnium

104 Rf Rutherfordium

104 Rf Rutherfordium

104 Rf Rutherfordium

104 Rf Rutherfordium

104 Rf Rutherfordium

104 Rf Rutherfordium

23 V Vanadium

41 Nb Niobium

73 Ta Tantalum

105 Db Dubnium

105 Db Dubnium

105 Db Dubnium

105 Db Dubnium

105 Db Dubnium

105 Db Dubnium

24 Cr Chromium

42 Mo Molybdenum

74 W Tungsten

106 Sg Seaborgium

106 Sg Seaborgium

106 Sg Seaborgium

106 Sg Seaborgium

106 Sg Seaborgium

106 Sg Seaborgium

25 Mn Manganese

43 Tc Technetium

75 Re Rhenium

107 Bh Bohrium

107 Bh Bohrium

107 Bh Bohrium

107 Bh Bohrium

107 Bh Bohrium

107 Bh Bohrium

26 Fe Iron

44 Ru Ruthenium

76 Os Osmium

108 Hs Hassium

108 Hs Hassium

108 Hs Hassium

108 Hs Hassium

108 Hs Hassium

108 Hs Hassium

27 Co Cobalt

45 Rh Rhodium

77 Ir Iridium

109 Mt Meitnerium

109 Mt Meitnerium

109 Mt Meitnerium

109 Mt Meitnerium

109 Mt Meitnerium

109 Mt Meitnerium

28 Ni Nickel

46 Pd Palladium

78 Pt Platinum

110 Ds Darmstadtium

110 Ds Darmstadtium

110 Ds Darmstadtium

110 Ds Darmstadtium

110 Ds Darmstadtium

110 Ds Darmstadtium

29 Cu Copper

47 Ag Silver

79 Au Gold

111 Rg Roentgenium

111 Rg Roentgenium

111 Rg Roentgenium

111 Rg Roentgenium

111 Rg Roentgenium

111 Rg Roentgenium

30 Zn Zinc

48 Cd Cadmium

80 Hg Mercury

112 Cn Copernicium

112 Cn Copernicium

112 Cn Copernicium

112 Cn Copernicium

112 Cn Copernicium

112 Cn Copernicium

31 Ga Gallium

49 In Indium

81 Tl Thallium

113 Nh Ununnilium

113 Nh Ununnilium

113 Nh Ununnilium

113 Nh Ununnilium

113 Nh Ununnilium

113 Nh Ununnilium

32 Ge Germanium

50 Sn Tin

82 Pb Lead

114 Fl Flerovium

114 Fl Flerovium

114 Fl Flerovium

114 Fl Flerovium

114 Fl Flerovium

114 Fl Flerovium

33 As Arsenic

51 Sb Antimony

83 Bi Bismuth

115 Mc Moscovium

115 Mc Moscovium

115 Mc Moscovium

115 Mc Moscovium

115 Mc Moscovium

115 Mc Moscovium

34 Se Selenium

52 Te Tellurium

84 Po Polonium

116 Lv Livermorium

116 Lv Livermorium

116 Lv Livermorium

116 Lv Livermorium

116 Lv Livermorium

116 Lv Livermorium

35 Br Bromine

53 I Iodine

85 At Astatine

117 Ts Tennessine

117 Ts Tennessine

117 Ts Tennessine

117 Ts Tennessine

117 Ts Tennessine

117 Ts Tennessine

36 Kr Krypton

54 Xe Xenon

86 Rn Radon

118 Og Oganesson

118 Og Oganesson

118 Og Oganesson

118 Og Oganesson

118 Og Oganesson

118 Og Oganesson

37 Rb Rubidium

55 Cs Caesium

87 Fr Francium

87 Fr Francium

87 Fr Francium

87 Fr Francium

87 Fr Francium

87 Fr Francium

87 Fr Francium

38 Sr Strontium

56 Ba Barium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

88 Ra Radium

39 Y Yttrium

57 La Lanthanum

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

89 Ac Actinium

40 Zr Zirconium

58 Ce Cerium

90 Th Thorium

90 Th Thorium

90 Th Thorium

90 Th Thorium

90 Th Thorium

90 Th Thorium

90 Th Thorium

41 Nb Niobium

59 Pr Praseodymium

91 Pa Protactinium

91 Pa Protactinium

91 Pa Protactinium

91 Pa Protactinium

91 Pa Protactinium

91 Pa Protactinium

91 Pa Protactinium

42 Mo Molybdenum

60 Nd Neodymium

92 U Uranium

92 U Uranium

92 U Uranium

92 U Uranium

92 U Uranium

92 U Uranium

92 U Uranium

43 Tc Technetium

61 Pm Promethium

93 Np Neptunium

93 Np Neptunium

93 Np Neptunium

93 Np Neptunium

93 Np Neptunium

93 Np Neptunium

93 Np Neptunium

44 Ru Ruthenium

62 Sm Samarium

94 Pu Plutonium

94 Pu Plutonium

94 Pu Plutonium

94 Pu Plutonium

94 Pu Plutonium

94 Pu Plutonium

94 Pu Plutonium

45 Rh Rhodium

63 Eu Europium

95 Am Americium

95 Am Americium

95 Am Americium

95 Am Americium

95 Am Americium

95 Am Americium

95 Am Americium

46 Pd Palladium

64 Gd Gadolinium

96 Cm Curium

96 Cm Curium

96 Cm Curium

96 Cm Curium

96 Cm Curium

96 Cm Curium

96 Cm Curium

47 Ag Silver

65 Tb Terbium

97 Bk Berkelium

97 Bk Berkelium

97 Bk Berkelium

97 Bk Berkelium

97 Bk Berkelium

97 Bk Berkelium

97 Bk Berkelium

48 Cd Cadmium

66 Dy Dysprosium

98 Cf Californium

98 Cf Californium

98 Cf Californium

98 Cf Californium

98 Cf Californium

98 Cf Californium

98 Cf Californium

49 In Indium

67 Ho Holmium

99 Es Einsteinium

99 Es Einsteinium

99 Es Einsteinium

99 Es Einsteinium

99 Es Einsteinium

99 Es Einsteinium

99 Es Einsteinium

50 Sn Tin

68 Er Erbium

100 Fm Fermium

100 Fm Fermium

100 Fm Fermium

100 Fm Fermium

100 Fm Fermium

100 Fm Fermium

100 Fm Fermium

51 Sb Antimony

69 Tm Thulium

101 Md Mendelevium

101 Md Mendelevium

101 Md Mendelevium


101 Md Mendelevium

101 Md Mendelevium

سوال 5: پیریاڈک ٹیبل کے مختلف گروپس میں الیمینٹس کے کیمیکل خواص میں مماثلت کیوں پائی جاتی ہیں؟


جواب: الیمینٹس کے کیمیکل خواص کا زیادہ تر انحصار ان کے بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز کی تعداد پر ہے۔ چونکہ پیریاڈک ٹیبل کے ایک گروپ میں موجود تمام الیمینٹس کے بیرونی شیلز میں ایک جیسے الیکٹرون ہوتے ہیں اس لیے امید کی جاتی ہے کہ ان کے کیمیکل خواص ملتے جلتے ہوں گے۔

**گروپ I کے الیمینٹس** گروپ ایک کے تمام الیمینٹس کے بیرونی شیلز میں صرف ایک الیکٹرون موجود ہے اس لیے ان الیمینٹس کی یہ از حد کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس الیکٹرون کو کھو کر کیٹائن بنائیں۔ اس لیے ان کو الیکٹرو پوزیٹیو میٹلز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ میٹلز پانی کے ساتھ بھرپور طریقے سے ری ایکٹ کر کے الکلی بناتے ہیں اور ہائڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔




الکلی

ان میٹلز کے آکسائیڈ بہت طاقتور پیسز ہیں اور پانی میں حل ہو کر الکلیز دیتے ہیں۔




الکلی میٹلز ہیلوجنز کے ساتھ ری ایکٹ کر کے ہیلائیڈز بناتی ہیں۔




الکلی میٹلز کی ری ایکٹ کرنے کی طاقت گروپ میں نیچے کی طرف جائیں تو بتدریج بڑھ جاتی ہے۔



**گروپ II کے الیمینٹس** گروپ 2 کے الیمینٹس بھی اپنے بیرونی الیکٹرونز آسانی سے کھو کر دو مثبت چارج والے کی کٹائن بناتے ہیں۔




گروپ 2 میں اوپر سے نیچے کی طرف ایٹمز کا سائز بڑھنے کی وجہ سے ایٹمز کی الیکٹرونز کھانے کی کوشش بتدریج زیادہ ہوتی ہے۔ ان میٹلز کے آکسائیڈ بھی بیسک ہوتے ہیں اس لیے پانی کے ساتھ ری ایکٹ کر کے الکلیز بناتے ہیں۔



**گروپ 17 کے الیمینٹس** گروپ 17 میں موجود الیمینٹس کے بیرونی شیلز کا الیکٹرونک کنفیگوریشن  $s^2, p^5$  ہے۔ ان الیمینٹس کی از حد کوشش ہے کہ وہ ایک الیکٹرون حاصل کر کے اینائن بنائیں۔ ان کو الیکٹرو نیگیو الیمینٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ری ایکٹو میٹلز ہیں اور میٹلز کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سالٹس بناتے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں ہیلوجنز یعنی سالٹس بنانے والے الیمینٹس کہا جاتا ہے۔ الکلی میٹلز کے برعکس ان کی ری ایکٹیویٹی گروپ میں اوپر سے نیچے بتدریج کم ہو جاتی ہے۔



**گروپ 16 کے الیمینٹس** گروپ 16 میں موجود الیمینٹس کے بیرونی شیلز کے الیکٹرونک  $s^2, p^4$  ہیں اس لیے ان کی کوشش ہے کہ دو الیکٹرونز حاصل کر کے منفی چارج رکھنے والا اینائن بنائیں۔ آکسیجن ایک بہت ہی زیادہ الیکٹرو نیگیو الیمینٹ ہے۔



سوال 6: گروپ نمبر اور الیمینٹس کے ایٹمز پر چارج کا باہمی تعلق کیا ہے؟

جواب: جب ہم پیریاڈک ٹیبل میں بائیں سے دائیں چلیں تو مین گروپ الیمینٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گروپ کے نمبر کے برابر الیکٹرون یا الیکٹرونز کھو کر کیٹائن بنائیں۔ مثلاً گروپ I کے الیمینٹس +1 آئنز، گروپ 2 کے الیمینٹس +2 آئنز اور گروپ 3 کے الیمینٹس +3 آئنز بناتے ہیں۔

کیٹائنز پر چار جزو کی تعداد ان پلیمنٹس کے بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز کی تعداد کے برابر ہے۔

جب ہم پیریاڈک ٹیبل میں اٹھارہویں گروپ سے بائیں طرف چلیں تو پلیمنٹس اکثر اپنے گروپ نمبر کے برابر چار جزو والے اینائنز بناتے ہیں۔ گروپ کو نمبر دینا نوبل گیسوں کے گروپ کے بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گروپ 17 پلیمنٹس (نوبل گیسوں سے بائیں طرف) ایک منفی چارج والے آئنز بناتے ہیں۔ اسی طرح گروپ 16 کے پلیمنٹس دو منفی چار جزو والے آئنز بناتے ہیں۔ ان آئنز پر چار جزو کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے الیکٹرونز ان کو اپنے آکٹیٹس (octets) مکمل کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔

سوال 7: اٹامک ریڈیئس سے کیا مراد ہے؟ پیریاڈک ٹیبل میں اٹامک ریڈیئس کے رجحان کے وضاحت کریں۔  
جواب: اٹامک ریڈیئس (Atomic Radius): اٹامک ریڈیئس دو ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلے کے نصف کے برابر ہے جب ان دو ایٹمز کے درمیان کوویلنٹ بانڈ موجود ہو۔

یونٹ: اٹامک ریڈیئس کو پیکومیٹر میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

جبکہ  $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$  ہے۔

مثال: مثال کے طور پر دو کاربن ایٹمز جو آپس میں کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں ان کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلہ  $154 \text{ pm}$  ہے۔ اس فاصلے کا نصف یعنی  $77 \text{ pm}$  کو کاربن ایٹم کا ریڈیئس کہتے ہیں۔ اسے کاربن ایٹم کا کوویلنٹ ریڈیئس بھی کہتے ہیں۔

#### پیریاڈک ٹیبل میں رجحان (Variation of Atomic Radius in Periodic Table)

پیریڈز میں اٹامک ریڈیئس میں تبدیلی (Variation of Atomic Radius in Periods): جب ہم پیریاڈک ٹیبل کے پیریڈ میں بائیں سے دائیں چلتے ہیں تو ایٹمز کا سائز عموماً کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے پیریڈ میں جب ہم لیتھیم (Li) سے نیون (Ne) کی طرف چلتے ہیں تو ایٹمز کے بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان ایٹمز کے نیوکلیائی میں مثبت چارج بھی +3 سے +10 تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مثبت چارج جب بیرونی الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو لیتھیم سے نیون تک ایٹم کے سائز کم ہوتے ہیں۔  
دوسرے پیریڈ میں موجود ایٹمز کے ایٹمی ریڈیئس

| دوسرے پیریڈ کے ایٹم | Li  | Be  | B  | C  | N  | O  | F  | Ne |
|---------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| اٹامک ریڈیئس (pm)   | 152 | 113 | 88 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |

گروپس میں اٹامک ریڈیئس میں تبدیلی: پیریاڈک ٹیبل کے ایک گروپ میں اٹامک ریڈیئس اوپر سے نیچے جاتے وقت بتدریج بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو پلیمنٹس میں موجود شیلز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو جاتا ہے اور شیلز میں اضافہ کی وجہ سے نیوکلیس کی کشش کی قوت بیرونی شیل میں موجود الیکٹرونز کے لیے بتدریج کم ہو جاتی ہے اور یہ بات ایٹم کے سائز میں اضافہ کا موجب بنتی ہے۔

گروپ کے پلیمنٹس کے اٹامک ریڈیئس

| گروپ I کے ایٹم | اندرونی شیلز میں الیکٹرونز کی تعداد | اٹامک ریڈیئس (pm) |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Li             | 2                                   | 152               |
| Na             | 10                                  | 186               |
| K              | 18                                  | 227               |
| Rb             | 36                                  | 248               |
| Cs             | 54                                  | 265               |


سوال 8: آئیونائزیشن انرجی سے کیا مراد ہے؟ پیریاڈک ٹیبل میں آئیونائزیشن انرجی کا رجحان لکھیں۔

جواب: آئیونائزیشن انرجی (Ionization Energy): انرجی کی وہ کم از کم مقدار جو ایک آزاد گسی ایٹم کے بیرونی شیل میں موجود ایک الیکٹرون کو باہر نکال دے اس کو آئیونائزیشن انرجی کہتے ہیں۔

یونٹ: آئیونائزیشن انرجی کو  $\text{kJ mol}^{-1}$  میں ظاہر کیا جاتا ہے۔



پہلی آئیونائزیشن انرجی: جب بیرونی شیل میں صرف ایک ہی الیکٹرون موجود ہوگا تو اس کو باہر نکالنے کے لیے جو انرجی دلاکار ہوگی اس کو فرسٹ آئیونائزیشن انرجی کہیں گے۔

مثال: مثال کے طور پر سوڈیم ایٹم کی پہلی آئیونائزیشن انرجی  $+496 \text{ kJ mol}^{-1}$  ہے۔



سیکنڈ آئیونائزیشن انرجی: ایک پازیٹو آئن سے دوسرے الیکٹرون کو نکالنے کے لیے درکار انرجی سیکنڈ آئیونائزیشن انرجی کہلاتی ہے۔

مثال: میکینٹیم کے بیرونی شیل میں دو الیکٹرونز ہیں۔ پہلے الیکٹرون کو نکالنے کے لیے کم انرجی درکار ہوگی جبکہ دوسرے الیکٹرون کے لیے اس ہے زیادہ انرجی درکار ہوگی۔



اٹامک سائز اور آئیونائزیشن انرجی کے درمیان تعلق: آئیونائزیشن انرجی کا تعلق اٹامک سائز سے ہے۔ ایٹم کا ریڈیئس جتنا کم ہوگا اتنا ہی نیوکلئیس بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون یا الیکٹرونز کو زیادہ شدت سے کھینچے گا اتنا ہی الیکٹرون کو نکالنا مشکل ہوگا اس لیے آئیونائزیشن انرجی کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی۔

پیریاڈک ٹیبل میں رجحان (Variation in Periodic Table)

گروپس میں رجحان: گروپ میں اوپر سے نیچے آئیونائزیشن انرجی کی ویلیو کم ہوتی ہیں۔

گروپ I کی آئیونائزیشن انرجی ویلیوز

| گروپ I کے عناصر | آئیونائزیشن انرجی ( $\text{kJ mol}^{-1}$ ) |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Li              | 520                                        |
| Na              | 496                                        |
| K               | 419                                        |
| Rb              | 403                                        |
| Cs              | 377                                        |

پیریڈ میں رجحان: پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب آئیونائزیشن انرجی کی ویلیو بتدریج بڑھتی ہیں۔

دوسرے پیریڈ میں ایلیمینٹس کی آئیونائزیشن انرجی کی ویلیوز


| دوسرے پیریڈ کے ایلیمینٹس              | Li  | Be  | B   | C    | N    | O    | F    | Ne   |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| اٹامک ریڈیئس ( $\text{kJ mol}^{-1}$ ) | 520 | 899 | 801 | 1086 | 1402 | 1314 | 1681 | 2081 |

سوال 9: الیکٹرون آفینٹی سے کیا مراد ہے؟ گروپس اور پیریڈز میں اس کا رجحان لکھیں۔

جواب: الیکٹرون آفینٹی (Electron Affinity): انرجی کی وہ مقدار جو کسی آزاد گسی ایٹم کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون حاصل کرنے سے خارج ہوا الیکٹرون آفینٹی کہلاتی ہے۔

یونٹ (Unit): اس کو  $\text{kJ mol}^{-1}$  میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال: مثال کے طور پر جب فلورین ایٹم ایک الیکٹرون حاصل کرتا ہے تو  $-328 \text{ kJ mol}^{-1}$  انرجی خارج ہوتی ہے۔



الیکٹرون افینٹی اور اٹامک سائز کے درمیان تعلق: الیکٹرون افینٹی کی ویلیوز کا تعلق بھی ایٹم کے سائز سے ہوتا ہے۔ ایٹم کا سائز جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی نیوکلئیس بیرونی شیل میں جذب ہونے والے الیکٹرون کو زیادہ قوت سے کھینچے گا اور الیکٹرون افینٹی کی ویلیوز بھی زیادہ ہوں گی۔

پیریاڈک ٹیبل میں الیکٹرون افینٹی کا رجحان (Variation of Electron Affinity in Periodic Table)

گروپ میں رجحان: پیریاڈک ٹیبل میں اوپر سے نیچے چلیں تو الیکٹرون افینٹی کی ویلیوز بتدریج کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹم کا سائز اوپر سے نیچے بڑھتا ہے اور بیرونی شیل میں جذب ہونے والے الیکٹرون کو نیوکلئیس کم شدت سے کھینچتا ہے جس سے خارج ہونے والی انرجی کم ہو جاتی ہے۔

گروپ 17 کے ہالوجن کی الیکٹرون افینٹی ویلیوز

| گروپ 1 کے عناصر | الیکٹرون افینٹی ( $\text{kJ mol}^{-1}$ ) |
|-----------------|------------------------------------------|
| F               | -328                                     |
| Cl              | -349                                     |
| Br              | -324.6                                   |
| I               | -295.2                                   |

پیریاڈ میں رجحان: اٹامک سائز کم ہونے کی وجہ سے بائیں سے دائیں جانب پیریاڈ میں الیکٹرون افینٹی کی ویلیوز بڑھتی ہیں۔

سوال 10: الیکٹرون فیلٹیٹی کی تعریف لکھیں نیز پیریاڈک ٹیبل میں اس کا رجحان بتائیں۔

جواب: الیکٹرون فیلٹیٹی: کسی ایٹم کی الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت کو الیکٹرون فیلٹیٹی کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک قوت ہے جس سے ایک ایٹم کو یلنٹ بانڈ میں موجود الیکٹرونز کے جوڑے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ زیادہ الیکٹرون فیلٹیٹی والے ویلیوز رکھنے والے ایٹمز کے بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز کو نیوکلئیس چارج زیادہ قوت سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔

پیریاڈ میں رجحان: الیکٹرون فیلٹیٹی کی ویلیوز پیریاڈ میں بائیں سے دائیں بڑھتی ہیں۔

الیکٹرون فیلٹیٹی میں دوسرے پیریاڈ میں موجود ہالوجن کی ویلیوز (پانگ سیل پر)

| دوسرے پیریاڈ میں موجود ہالوجن | Li  | Be  | B   | C   | N   | O   | F   |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| الیکٹرون فیلٹیٹی              | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 4.0 |

گروپ میں رجحان: گروپ میں اوپر سے نیچے الیکٹرون فیلٹیٹی کی ویلیوز کم ہوتی ہیں۔

گروپ 17 میں موجود ہالوجن کی الیکٹرون فیلٹیٹی ویلیوز (پانگ سیل پر)

| گروپ 17 میں موجود عناصر | الیکٹرون فیلٹیٹی |
|-------------------------|------------------|
| F                       | 4.0              |
| Cl                      | 3.2              |
| Br                      | 3.0              |
| I                       | 2.7              |

سوال 11: میٹلک کیریکٹر سے کیا مراد ہے؟ پیریاڈک ٹیبل کے گروپس اور پیریاڈ میں اس کے رجحان کی وضاحت کریں۔

جواب: میٹلک کیریکٹر کسی ایلیمنٹ کے الیکٹرون کھودینے کی قابلیت کو میٹلک کیریکٹر کہتے ہیں۔ الیکٹرون کھودینے کے نتیجے میں مثبت آئنز یا کیٹائنز بنتے ہیں۔

گروپ میں رجحان (Variation in groups): آئیونائزیشن انرجی کی ویلیوز ایک گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی ہے اس لیے گروپ کے نیچے والے حصے میں موجود ایلیمینٹس بڑی آسانی سے الیکٹرون ہودیتے ہیں اس وجہ سے میٹلک کیریٹر اور ری ایکٹیویٹی گروپ میں اوپر سے نیچے بتدریج بڑھ جاتی ہے۔

پیریڈ میں رجحان (Variation in Periods): ایک پیریڈ میں جب بائیں سے دائیں چلتے ہیں تو ایلیمینٹس کے نیوکلیس میں موجود مثبت چارج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بیرونی شکل کے الیکٹرونز کو نیوکلیس زیادہ طاقت سے کھینچتا ہے اور ایٹمز کے لیے الیکٹرونز کا کھونا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے پیریڈ میں بائیں سے دائیں میٹلک کیریٹر بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔

سوال 12: کیمیکل ری ایکٹیویٹی پر نوٹ لکھیں۔

جواب: کیمیکل ری ایکٹیویٹی (Chemical Reactivity): کسی میٹل کی الیکٹرون کھونے کی صلاحیت کو کیمیکل ری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔

پیریڈک ٹیبل میں رجحان (Variation in Periodic Table)

گروپ میں رجحان: اناک سائز بڑھنے کی وجہ سے گروپ میں اوپر سے نیچے کیمیکل ری ایکٹیویٹی بڑھتی ہے۔

پیریڈ میں رجحان: بائیں سے دائیں جانب پیریڈ میں کیمیکل ری ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے۔

مثال (Example): مثال کے طور پر دوسرا پیریڈ ایک ری ایکٹیو ایلیمینٹ سوڈیم سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد مقابلتا کم ری ایکٹیو ایلیمینٹ میگنیشیم ایلیمینٹ آتا ہے۔ ایلومینیم اور سیلیکون دونوں سوڈیم کی نسبت کم ری ایکٹیو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم پیریڈ میں بائیں سے دائیں چلتے ہیں تو بیرونی شیل میں الیکٹرونز کی تعداد بڑھتی ہے جس سے الیکٹرون کا کھونا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔

سوال 13: ڈینسٹی سے کیا مراد ہے؟ پیریڈک ٹیبل میں اس کا رجحان لکھیں۔

جواب: ڈینسٹی (Density): کسی شے کے اکائی حجم میں موجود ماس کو اس شے کی ڈینسٹی کہتے ہیں۔

یونٹ (Unit): ڈینسٹی کو  $g/cm^3$  میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

گروپ میں رجحان: گروپ میں اوپر سے نیچے ایلیمینٹس کی ڈینسٹی میں معمولی سا اضافہ ہوتا ہے جبکہ کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی۔

پیریڈ میں رجحان: پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب ڈینسٹی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایلیمینٹس میں الیکٹرونک کنفیگریشن اور ایٹمز کی پیکنگ میں فرق کی وجہ سے ڈینسٹی میں معمولی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔

پیریڈ میں موجود ایلیمینٹس کی ڈینسٹی ویلیوز

| گروپ میں موجود ایلیمینٹس | Li  | Be  | B   | C   | N   |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ڈینسٹی $g/cm^3$          | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 |

مشق

1- پیریڈک ٹیبل کے دوسرے گروپ اور چھٹے پیریڈ میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں ذیل میں درج سوالات کے جواب دیں۔

(i) کیا یہ میٹل ہے یا نان میٹل؟

جواب: یہ ایک میٹل ہے۔

(ii) کیا یہ ایلیمینٹ الیکٹرو پازٹیو ہوگا یا الیکٹرونکیٹو؟

جواب: ایلیمینٹ الیکٹرو پازٹیو ہوگا۔

(iii) اس کے آکسائیڈ کی نوعیت کیا ہوگی؟

جواب: یہ بیسیک (Basic) ہوگا۔

(iv) یہ ایلیمینٹ کس طبعی حالت میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے؟

جواب: یہ ٹھوس حالت میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔

2- سب سے زیادہ اٹامک ریڈیئس رکھنے والا ایلیمینٹ کسی گروپ اور کس پیریڈ میں ہوگا؟

جواب: سب سے زیادہ ریڈیئس رکھنے والا ایلیمینٹ گروپ 1 اور پیریڈ 7 سے ہوگا۔

3- کیا آپ سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹو اور سب سے زیادہ الیکٹرو پوزیٹو ایلیمینٹ کے گروپ نمبر کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟

جواب: سب سے زیادہ الیکٹرو پازیٹو ایلیمینٹ گروپ (1) اور سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹو ایلیمینٹ گروپ 17 سے ہوگا۔

4- ذیل میں درج ایلیمینٹس میں سے کون سے ایلیمینٹ کی آئیونائزیشن انرجی سب سے کم ہوگی اور کس ایلیمینٹ کی الیکٹرون افینٹی سب سے زیادہ

ہوگی۔ نیز اس ایلیمینٹ کے گروپ اور پیریڈ کا نمبر بھی معلوم کریں۔

Li, K, O, F, Cl


جواب: سب سے کم آئیونائزیشن انرجی والا ایلیمینٹ K =

سب سے زیادہ الیکٹرون افینٹی والا ایلیمینٹ F =


5- پیریاڈک ٹیبل کے کون سے دو ایلیمینٹس ری ایکٹ کر کے بناتے ہیں۔

(i) ایک بیسیک آکسائیڈ (ii) ایک ایسڈک آکسائیڈ

جواب: (i) بیسیک آکسائیڈ: سوڈیم اور آکسیجن مل کر بیسیک آکسائیڈ بناتے ہیں۔



(ii) ایسڈک آکسائیڈ: سلفر اور آکسیجن مل کر ایسڈک آکسائیڈ بناتے ہیں۔



### دلچسپ معلومات

• مینڈلیف نے اپنے پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمینٹس کو ان کے اٹامک ماسز کے مطابق ترتیب دیا تھا۔ بعد میں موزے نے ان ایلیمینٹس کو ان کے اٹامک نمبرز کے مطابق ترتیب دیا۔

• ای۔ جی۔ مازوروز نے پیریاڈک ٹیبل کے 700 مختلف شائع شدہ نمونے جمع کیے۔ ان میں سے بہت سے نمونے باقاعدہ مستطیل ساخت کو برقرار رکھتے ہیں، جبکہ کچھ میں سپائرلز، دائرے اور مثلثی اشکال بھی شامل ہیں۔

• اگرچہ ہم امید کرتے ہیں کہ اٹامک نمبرز کے بڑھنے سے اٹامک سائز بڑھ جائے گا لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹم کا انحصار اس میں موجود الیکٹرون کے شیلز کے ڈایامیٹر (Diameter) پر ہے۔

• اگرچہ پہلی الیکٹرون افینٹی کی ویلیوز منفی ثابت یا زیر صفر ہوتی ہیں لیکن کینڈا لیکٹران افینٹی کی ویلیوز ہمیشہ پازیٹو ہوتی ہیں۔

• الیکٹرو نیگیٹیویٹی ایلیمینٹس کی ایک ایسی خاصیت ہے جس سے ہم ٹیبل کی ایکشنز کے وقوع پذیر ہونے کی وضاحت کی جاتی ہے۔

• کسی میٹل کے میٹلک کیریئر سے عام طور پر اس کی ری ایکٹیویٹی کا اندازہ ہوتا ہے۔

## اہم نکات

- 1- جدید پیراڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو ان کے ایٹمی نمبر کی معمولی ترتیب کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس ٹیبل میں 18 گروپس اور سات پیراڈز ہیں۔
- 2- جدید پیراڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو s, p, d اور f بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔
- 3- ہر پیراڈک ٹیبل سے شروع ہوتا ہے اور نوبل گیس پر ختم ہوتا ہے۔ ایک پیراڈک ٹیبل کی تکمیل کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔
- 4- s اور p بلاکس میں موجود ایلیمنٹس کو نارمل ایلیمنٹس اور d اور f بلاکس میں موجود ایلیمنٹس کو ٹرانزیشن ایلیمنٹس کہتے ہیں۔
- 5- ایک گروپ کے تمام ایلیمنٹس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ یکساں کیمیائی خصوصیات ظاہر کریں گے کیونکہ ان کے بیرونی شیلز میں الیکٹرانز یکساں تعداد میں موجود ہیں۔
- 6- جب ہم پیراڈک ٹیبل میں بائیں سے دائیں اور گروپ میں اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو ایلیمنٹس کے فزیکل خواص بتدریج تبدیل ہوتے ہیں۔
- 7- ایلیمنٹس کے ایٹمی سائز پیراڈک ٹیبل میں بائیں سے دائیں گھٹتے ہیں جبکہ گروپ میں اوپر سے نیچے بڑھتے ہیں۔
- 8- آئیونائزیشن انرجی پیراڈک ٹیبل میں بائیں سے دائیں بڑھتی ہے جبکہ گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی ہے۔
- 9- الیکٹران افینٹی اور الیکٹرونگیٹیویٹی ویلیوز پیراڈک ٹیبل میں بائیں سے دائیں بڑھتی ہیں جبکہ گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی ہیں۔
- 10- مٹیکل کم پیکٹر گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے جبکہ پیراڈک ٹیبل میں بائیں سے دائیں کم ہوتا ہے۔

## مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔
- 1- سولر سیل میں موجود ایک اہم ایلیمنٹ پیراڈک ٹیبل کے کس گروپ اور کس پیراڈک ٹیبل میں موجود ہے؟
- (الف) تیسرا پیراڈک اور چودھواں گروپ (ب) دوسرا پیراڈک اور چودھواں گروپ
- (ج) تیسرا پیراڈک اور پندرہواں گروپ (د) تیسرا پیراڈک اور سولہواں گروپ
- 2- ٹرانزیشن میٹل کے بیرونی شیل کے الیکٹرونک کنفیگوریشن کی شناخت کریں۔
- (الف)  $ns^2 np^4$  (ب)  $nd^x ns^2$  (ج)  $ns^2 np^6$  (د)  $ns^2 np^5$
- 3- کوئی میٹل سب سے نرم ہے؟
- (الف) Na (ب) Ca (ج) Al (د) Zn
- 4- ایک پیلے رنگ کا ٹھوس ایلیمنٹ جس کی ایلوٹراپک اشکال بھی ہیں اور جو فوسل فیول میں بھی موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟
- (الف) کاربن (ب) آئیوڈین (ج) ایلومینیم (د) سلفر
- 5- نائٹروجن کا اٹم اپنے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹرونز حاصل کر سکتا ہے؟
- (الف) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5
- 6- کون سا ایلیمنٹ سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہے؟
- (الف) آکسیجن (ب) کلورین (ج) فلورین (د) نائٹروجن

-7- فلورین سے ایٹمنٹ کا میلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہے؟

Cs (د)

Rb (ج)

K (ب)

Na (الف)

-8- دوسرے گروپ میں میٹلک آؤڈر کیسے تبدیل ہوتا ہے؟

Sr > Ba > Ca > Mg (ب)

Mg > Ca > Ba > Sr (الف)

Ba > Sr > Ca > Mg (د)

Mg > Sr > Ca > Ba (ج)

-9- ذیل میں درج کون سا آرڈر آکسیجن، فلورین اور نائٹروجن کے ایٹمک ریڈیئس کے بارے میں صحیح ہے؟

O < N < F (د)

F < O < N (ج)

N < F < O (ب)

O < F < N (الف)

-10- جس ایٹمنٹ کی آئیونائزیشن انرجی اور الیکٹرون افینٹی دونوں کم ہوں گی اس کا تعلق کس گروپ سے ہوگا؟

(د) گروپ 17

(ج) گروپ 16

(ب) گروپ 13

(الف) گروپ I

### جوابات

|     |    |   |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|----|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| د   | 5  | د | 4 | الف | 3 | ب   | 2 | الف | 1 |
| الف | 10 | ج | 9 | د   | 8 | الف | 7 | ج   | 6 |

### مختصر سوالات -

-1- پیریاڈک ٹیبل میں ایٹمنٹس کو ترتیب دینے کے لیے ایٹم نمبر کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟

جواب: ایٹم نمبر کو پیریاڈک ٹیبل میں ایٹمنٹس کو ترتیب دینے کے لیے چنا گیا کیونکہ ایٹم نمبر ایٹم میں پروٹون کی تعداد کی نمائندگی کرتا ہے، جو اس کی شناخت اور کیمیائی خصوصیات کا تعین کرتا ہے۔ ایٹمنٹس کو ایٹم نمبر کے لحاظ سے ترتیب دینا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک جیسی خصوصیات والے ایٹمنٹس کو منظم طریقے سے ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے گروپ اس کے علاوہ ایٹم نمبر کا ایک ہی ایٹم نمبر نہیں ہوتا۔

-2- لفظ پیریاڈک کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: لفظ ”پیریاڈک“ ایٹمنٹس کی کیمیائی خصوصیات کے دہرائے جانے والے پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے جب انہیں ایٹم نمبر میں اضافے کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے۔

-3- پیریاڈک ٹیبل میں جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو پیریاڈک سائز بڑا کیوں ہو جاتا ہے؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں اوپر سے نیچے الیکٹرون شیلز میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیرونی الیکٹرون اور نیوکلئس کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نتیجے میں ایٹم سائز بڑھ جاتا ہے۔

-4- گروپ میں موجود ایٹمنٹس کے بیرونی شیلز میں الیکٹرونز کی تعداد ایک جیسی کیوں ہے؟

جواب: ایک ہی گروپ کے ایٹمنٹس میں ویلنس الیکٹرونز کی تعداد یکساں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے بیرونی شیل میں ایک ہی الیکٹرون رکھتے ہیں جو کہ انہیں کیمیائی خصوصیات دیتی ہے۔

-5- کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ کیشیم ہوڈیم کی نسبت زیادہ ری ایکٹیو ہوگا؟ وضاحت کریں۔

جواب: نہیں، سوڈیم کیشیم سے زیادہ ری ایکٹیو ہے۔ سوڈیم گروپ I کی پہلی شیل ہے جبکہ کیشیم گروپ 2 کی کلکائن ارتھ میٹل ہے۔ سوڈیم اپنا ایک الیکٹرون زیادہ آسانی سے خارج کرتی ہے جبکہ کیشیم کے آخری شیل میں دو الیکٹرونز ہوتے ہیں جن کو خارج کرنا مشکل ہیں۔

6- تیسرے پیرید میں کس ایلیمینٹ کا اٹامک ریڈیس سب سے زیادہ ہوگا اور کس ایلیمینٹ کا سب سے کم؟

جواب: تیسرے پیرید میں، سوڈیم (Na) کا اٹامک ریڈیس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور کلورین (Cl) اور آرگون (Ar) کا اٹامک ریڈیس سب سے کم ہوتا ہے کیونکہ پیرید میں نیوکلیئر چار بڑھنے کی وجہ سے اٹامک سائز کم ہو جاتا ہے۔

7- چھپے اور ساتویں گروپس میں سب سے زیادہ الیکٹرونگیٹو ایلیمینٹس کیوں موجود ہیں؟

جواب: گروپس 16 اور 17 نان میٹلز ہیں جیسے آکسیجن، سلفر، فلورین اور کلورین۔ ان میں اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے الیکٹرونز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ زیادہ کشش انھیں الیکٹرونگیٹو بناتی ہے۔

8- میکینیشم کے لیے پہلی آئیونائزیشن انرجی کی ویلیو دوسری سے کم کیوں ہے؟

جواب: ایک ویلنس الیکٹرون کو خارج کرنے کے درکار ہوتی ہے جبکہ دوسری آئیونائزیشن انرجی میں مثبت چارج شدہ آئن، ایک مستحکم، مکمل بھرے ہوئے آرپٹل سے ایک الیکٹرون کو خارج کرنے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔

9- کیا یہ دو میٹلز یا دو نان میٹلز کے لیے ممکن ہے کہ وہ آئیونک بانڈ بنائیں؟

جواب: نہیں، آئیونک بانڈ عام طور پر ایک میٹل اور ایک نان میٹل کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ دو میٹلز یا دو نان میٹلز آسانی سے الیکٹرونز منتقل نہیں کر سکتیں۔ اس لیے وہ آئیونک بانڈ نہیں بنا سکتیں۔

10- کس ایلیمینٹ کی آئیونائزیشن انرجی کی ویلیو سب سے کم ہے اور کس ایلیمینٹ کی الیکٹرونگیٹوٹی کی ویلیو سب سے زیادہ ہے؟

جواب: کم سے کم آئیونائزیشن انرجی: فرانسیئم (Fr) کی آئیونائزیشن انرجی کم ترین ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑے سائز کی الکی میٹل ہے۔ سب سے زیادہ الیکٹرونگیٹوٹی: فلورین (F) کی الیکٹرونگیٹوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ایٹم کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور نیوکلیئر چارج زیادہ ہوتا ہے۔

3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)

1- فرض کریں کہ ایک نیا ایلیمینٹ دریافت ہوتا ہے۔ آپ اس ایلیمینٹ کو پیریاڈک ٹیبل میں کہا رکھنا چاہیں گے؟

جواب: کسی نئے ایلیمینٹ کو پیریاڈک ٹیبل میں رکھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کا اٹامک نمبر اور الیکٹرونک کنفیگریشن معلوم کرنی چاہیے۔ اس سے گروپ اور پیرید کی شناخت کرنے میں مدد ملے گی جس سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر

گروپ: ویلنس الیکٹرون کی تعداد گروپ کی نشاندہی کرے گی۔  
پیرید: الیکٹرون شیلز کی تعداد پیرید کا تعین کرے گی۔

ان خصوصیات کو جان کر، نئے ایلیمینٹ کو پیریاڈک ٹیبل میں صحیح جگہ پر رکھا جاسکتا ہے تاکہ اس کی کیمیائی اور طبعی خصوصیات ملتے جلتے ایلیمینٹ سے مطابقت رکھیں۔

2- پیریاڈک ٹیبل کا پہلا ایلیمینٹ کونسا ہے؟ کیا یہ الیکٹران کھوتا ہے یا حاصل کرتا ہے؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل کا پہلا ایلیمینٹ ہائیڈروجن ہے۔ اس کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی ماحول کے لحاظ سے  $H^+$  (میٹلز کی طرح) بننے کے لیے ایک الیکٹرون کو خارج کر سکتا ہے یا  $H^-$  (نان میٹلز کی طرح) بننے کے لیے ایک الیکٹرون حاصل کر سکتا ہے۔

3- بورون اور ایلومینیم کے اٹامک ریڈیس بالترتیب 88pm اور 128pm ہیں۔ کون سا ایلیمینٹ الیکٹرون یا الیکٹرونز آسانی سے کھو دے گا؟

جواب: ایلومینیم زیادہ آسانی سے الیکٹرون خارج کر دے گا کیونکہ اس کا اٹامک ریڈیس (125pm) زیادہ ہے۔ اٹامک ریڈیس جتنا بڑا ہوگا، نیوکلیس اور بیرونی الیکٹرونز کے درمیان کشش اتنی ہی کمزور ہوگی جس سے الیکٹرون کو خارج کرنا آسان ہوگا۔

4- آپ کسی ایٹم کا ریڈیئس کیسے معلوم کریں گے؟

جواب: دو جڑے ہوئے ایٹم کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلے کا نصف اس ایٹم کا اٹامک ریڈیئس ہوگا۔ سائنس دان اس فاصلے کو درست طریقے سے

ناپنے کے لیے X-ray ڈفریکشن اور سپیکٹر و سکوپس کے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔

5- نائٹروجن تو تین الیکٹرونز جذب کر کے  $N^{3-}$  بنا دیتی ہے آکسیجن کیوں ایسا نہیں کر سکتی؟

جواب: آکسیجن کے پاس چھ ویلنس الیکٹرونز ہوتے ہیں، اس لیے تین الیکٹرونز قبول کرنے کے نتیجے میں بیرونی ٹیبل میں 9 الیکٹرونز ہو جائیں گے

جو کہ مستحکم آکٹیٹ رول سے تجاوز کر جائے گا۔ یہ بہت زیادہ الیکٹرون، الیکٹرون ری پلشن پیدا کرے گا جس سے  $O^{3-}$  غیر مستحکم ہو جائے

گا۔ نائٹروجن 5 ویلنس الیکٹرونز کے ساتھ ایک مستحکم  $N^{3-}$  آئن بنانے کے لیے 3 الیکٹرون قبول کر سکتا ہے۔

4- تفصیلی سوالات۔

1- پیریاڈک ٹیبل میں کسی ایلیمینٹ کو تلاش کرنے کے لیے کون سی معلومات کا ہونا ضروری ہے اگر اس کے اٹامک نمبر کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کیا

اس کا اٹامک ماس آپ کی مدد کر سکتا ہے؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمینٹس کو تلاش کرنے کے لیے اٹامک نمبر سب سے زیادہ مددگار ہے۔

اٹامک نمبر: یہ کسی ایلیمینٹ کی جگہ کا تعین کرنے کا سب سے درست طریقہ ہے کیونکہ یہ براہ راست اس کے الیکٹرون کی تعداد کا تعین کرتا

اٹامک ماس: یہ ایک اشارہ دے سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ قابل اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ ایک جیسے ماس والے ایلیمینٹس مختلف گروپس سے تعلق رکھ

سکتے ہیں۔ مثلاً آئسوٹوپس مختصراً کسی ایلیمینٹ کی جگہ معلوم کرنے کے لیے اٹامک ماس کی نسبت اٹامک نمبر زیادہ مددگار ہے۔

2- پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمینٹس کے کتنے بلاکس موجود ہیں؟ کیا یہ بلاکس ایلیمینٹ کی خصوصیات کا پتہ لگانے میں ہمارے لیے مفید ہیں؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں چار بلاکس ہیں۔

s بلاک، p بلاک، d بلاک اور f بلاک۔ یہ بلاکس بہت مددگار ہیں کیونکہ وہ ایلیمینٹس کو ان کی ویلنس الیکٹرونک کنفیگریشن کی بنیاد پر گروپ

کرتے ہیں، جو کیمیائی خصوصیات کا تعین کرتی ہے مثال کے طور پر:

● s- بلاک ایلیمینٹس انتہائی ری ایکٹیو میٹلز ہیں۔

● p- بلاک ایلیمینٹس میٹل اور نان میٹلز دونوں ہیں۔

● d- بلاک ایلیمینٹس متغیر آکسیدیشن حالتوں کے ساتھ ٹرانزیشن میٹلز ہیں۔

● f- بلاک ایلیمینٹس میں لینتھانائیڈز اور ایکٹینائیڈز شامل ہیں۔

3- پیریڈز میں درج ذیل خصوصیات کیسے تبدیل ہوتی ہیں؟ وجہ بتائیں۔

(الف) اٹامک ریڈیئس (ب) آئیونائزیشن انرجی

جواب: دیکھئے سوال نمبر 7 اور 8

4- ایلیمینٹ کی کون سی طبعی خصوصیت کا علم ہونے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا بانڈ بنائے گا؟

جواب: طبعی خصوصیات جیسے آئیونائزیشن انرجی، الیکٹرو نیگیٹیویٹی اور اٹامک ریڈیئس ہمیں بانڈ کی قسم معلوم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

● کم آئیونائزیشن انرجی اور بڑے ریڈیئس والے ایلیمینٹس آئیونک بانڈ بناتے ہیں۔

● زیادہ الیکٹرو نیگیٹیویٹی والے ایلیمینٹس کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں۔

5- ایسی چار مثالیں دیں جو عام درجہ حرارت پر ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں؟

جواب: (1) کاربن (2) سلفر (3) فاسفورس (4) آئیوڈین

6- دوسرے اور تیسرے پیریڈز میں الیمینٹس کی تعداد برابر ہے جبکہ باقی پیریڈز میں مختلف ہے۔ وجہ تائیں؟

جواب: دوسرے اور تیسرے پیریڈز میں 18 الیمینٹس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بیرونی ٹیل میں زیادہ سے زیادہ 8 الیکٹرونز سما سکتے ہیں۔ اس کے برعکس

اعلیٰ پیریڈز (چوتھے اور اس سے آگے کے) میں 18 اور f اور d آر بیٹلز ہوتے ہیں جو مزید الیمینٹس کی گنجائش دیتے ہیں۔

## 5- تحقیقی سوالات (Investigative Questions)

1- الیمینٹس کی پیریاڈک ٹیبل میں ترتیب کیسے دیا گیا ہے۔ اس بات پر تبصرہ کریں اور پیریاڈک ٹیبل کے فوائد بتائیں۔

جواب: عناصر کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر ترتیب دینا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ پیریاڈک ٹیبل میں الیمینٹس کی ترتیب کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔

● الیمینٹس کو سمجھنے اور ان کے خواص کا مطالعہ کرنے میں آسانی۔

● مختلف الیمینٹس کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں مدد۔

● نئے الیمینٹس کی پیش گوئی کرنے میں مدد۔

● کیمسٹری کے مطالعہ کو آسان بنانا۔

2- لیٹھیم اور پیریلیم دونوں کی خصوصیات اپنے گروپس کے باقی ممبران سے مختلف ہیں۔ کیا آپ اس فرق کی ممکنہ وجوہات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟

جواب: لیٹھیم اور پیریلیم اپنے گروپس کے دیگر عناصر کے مقابلے میں چھوٹے ایٹمک سائز اور زیادہ آکسائیڈیشن انرجی رکھتے ہیں۔

مثال کے طور پر:

● لیٹھیم پانی کے ساتھ سوڈیم کے برعکس مضبوط بانڈ بناتا ہے۔

● پیریلیم دیگر الکلائن ارتھ میٹلز کے برعکس کو ویلنٹ بانڈنگ ظاہر کرتا ہے جبکہ باقی آئیونک بانڈ بناتے ہیں۔

3- جدید پیریاڈک ٹیبل مینڈلیف پیریاڈک ٹیبل میں ترامیم کر کے بنایا گیا ہے۔ ان دونوں میں فرق کی وضاحت کریں۔

جواب: میڈلیف کا ٹیبل: یہ ایٹمک ماس کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا تھا، اس میں دریافت نہ ہونے والے الیمینٹس کے لیے خالی جگہیں تھیں، اور کچھ الیمینٹس کو مختلف خصوصیات کے ساتھ گروپ کیا گیا تھا۔

جدید پیریاڈک ٹیبل: یہ ایٹمک نمبر کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے، اس میں تمام دریافت شدہ الیمینٹس شامل ہیں اور ایک واضح بلاک ساخت (s, p, d, f) استعمال کرتا ہے۔

## کثیر الانتخابی معروضی سوالات

☆ درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- گروپ 17 کے تمام الیمینٹس کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہے:

(د)  $s^2p^6$

(ج)  $s^2p^5$

(ب)  $s^2p^4$

(الف)  $s^2p^3$

- 2- پلیمنٹس کی کیمیکل خصوصیات کس شیل میں الیکٹرونز کی تعداد پر منحصر ہیں؟  
 (الف) پہلے شیل (ب) دوسرے شیل (ج) سب سے بیرونی شیل (د) الف اور ب دونوں
- 3- گروپ 1 میٹلز کے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں؟  
 (الف) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- 4- ہیلوجنز کی ری ایکٹیویٹی:  
 (الف) گروپ میں نیچے کی جانب بڑھتی ہے۔ (ب) گروپ میں نیچے کی جانب کم ہوتی ہے۔  
 (ج) یکساں رہتی ہے۔ (د) اوپر کی جانب بڑھتی ہے۔
- 5- جدید پیریاڈک ٹیبل میں پلیمنٹس کو ترتیب دیا گیا:  
 (الف) بڑھتے ہوئے میلنگ پوائنٹس کے مطابق (ب) بڑھتے ہوئے ایٹامک نمبر کے مطابق  
 (ج) بڑھتے ہوئے بوائلنگ پوائنٹس کے مطابق (د) بڑھتے ہوئے ایٹامک ماسز کے مطابق
- 6- جدید پیریاڈک ٹیبل کے مطابق پیریڈز کی تعداد ہے:  
 (الف) 18 (ب) 13 (ج) 7 (د) 8
- 7- پانچویں پیریڈ میں پلیمنٹس کی تعداد ہے:  
 (الف) 18 (ب) 8 (ج) 32 (د) 2
- 8- پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب ایٹامک ریڈیئس:  
 (الف) بڑھتا ہے (ب) کم ہوتا ہے (ج) یکساں رہتا ہے (د) الف اور ج دونوں
- 9- آئیونائزیشن انرجی کو ظاہر کیا جاتا ہے:  
 (الف) kJ/mol (ب) g/cm<sup>3</sup> (ج) kg/mol (د) km/mol
- 10- پیریاڈک ٹیبل کا سب سے الیکٹرو نیگیو ایلیمنٹ ہے:  
 (الف) Na (ب) H (ج) Cl (د) F
- 11- فلورین کی الیکٹرو نیگیو ویلیو ہے:  
 (الف) 3.2 (ب) 2.7 (ج) 4.0 (د) 3.0
- 12- ڈینسٹی کو ظاہر کیا جاتا ہے:  
 (الف) km/g (ب) cm/g (ج) g/cm<sup>3</sup> (د) ml/cm<sup>3</sup>
- 13- کسی ایٹم کی مالیکیول میں موجود اشتراک شدہ الیکٹرون بیئر کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کہلاتی ہے:  
 (الف) الیکٹرون آفینٹی (ب) آئیونائزیشن انرجی (ج) الیکٹرو نیگیوٹیٹی (د) ایٹامک سائز
- 14- کسی ایلیمنٹ کے آؤٹگسی ایٹم کے پلینس شیل میں ایک الیکٹرون حاصل کرنے کے سبب خارج ہونے والی انرجی کہلاتی ہے:  
 (الف) الیکٹرون آفینٹی (ب) آئیونائزیشن انرجی (ج) ایٹامک ریڈیئس (د) میٹلک کریکٹر
- 15- کس گروپ کے پلیمنٹس کو ڈائی پوزیٹو آئنز کہا جاتا ہے؟  
 (الف) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

- 16- کونسا ایلیمینٹ ڈائی نیٹرو آکسائیڈ بناتا ہے؟  
 (الف) آکسیجن (ب) کلورین (ج) سوڈیم (د) میکیشیم
- 17- گروپ 16 کے ایلیمینٹس کو اپنا آکائیڈ مکمل کرنے کے لیے کتنے الیکٹرونز کی ضرورت ہوتی ہے؟  
 (الف) 6 (ب) 7 (ج) 2 (د) 1
- 18- نان میٹلو کی کیمیکل ری ایکٹیویٹی:  
 (الف) بائیں سے دائیں جانب بڑھتی ہے (ب) بائیں سے دائیں جانب کم ہوتی ہے۔  
 (ج) یکساں رہتی ہے (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 19- گروپ 17 کے ایلیمینٹس کو کہا جاتا ہے  
 (الف) ہالوجن فیملی (ب) کاربن فیملی (ج) ہیلوجنز (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 20- گروپ 13 کے ایلیمینٹس کو کہا جاتا ہے  
 (الف) بورون فیملی (ب) نائٹروجن فیملی (ج) کاربن فیملی (د) آکسیجن فیملی
- 21- گروپ 1 کے ایلیمینٹس کے بیرونی شیل میں الیکٹرونز کی تعداد ہے:  
 (الف) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 1
- 22- نوبل گیسز کس گروپ میں موجود ہوتی ہیں؟  
 (الف) 1 (ب) 17 (ج) 18 (د) 13
- 23- جدید پیریاڈک ٹیبل مٹی ہے:  
 (الف) اٹامک نمبر (ب) اٹامک ماس (ج) میلنگ پوائنٹس (د) بولنگ پوائنٹس
- 24- 17 ایلیمینٹس کے گروپ کو عام طور پر کہا جاتا ہے:  
 (الف) ہیلوجنز (ب) الکی میٹلز (ج) نوبل گیسز (د) کاربن فیملی
- 25- جدید پیریاڈک ٹیبل میں گروپس کی تعداد ہے:  
 (الف) 2 (ب) 8 (ج) 7 (د) 18
- 26- نوبل گیسوں کے سب سے بیرونی شیل کی الیکٹرانک کنفیگریشن کی نشاندہی کرتا ہے:  
 (الف)  $ns^2np^6$  (ب)  $ns^2np^5$  (ج)  $ns^2np^4$  (د)  $ns^2np^1$
- 27- پیریاڈک ٹیبل میں افقی قطار میں کہلاتی ہیں:  
 (الف) گروپس (ب) پیریڈز (ج) ایلیمینٹس (د) بلاکس
- 28- پیریاڈک ٹیبل میں عمودی کالم کہلاتے ہیں:  
 (الف) گروپس (ب) پیریڈز (ج) بلاکس (د) الف اور ب دونوں
- 29- مندرجہ ذیل میں سے کس گروپ کو الکی میٹلز کہا جاتا ہے؟  
 (الف) گروپ I میٹلز (ب) گروپ II میٹلز (ج) گروپ III میٹلز (د) گروپ IV میٹلز

30- گروپ 1 سے بننے والے ایٹمز پر چارج ہوتا ہے:

- (الف) -1 (ب) +1 (ج) -2 (د) +2

31- ایک پیکومیٹر برابر ہے:

- (الف)  $10^{12}m$  (ب)  $10^{-12}m$  (ج)  $10^{-6}m$  (د)  $10^6m$

32- کاربن ایٹم کا کوویٹ ریڈیئس ہے:

- (الف) 154pm (ب) 145pm (ج) 77pm (د) 7pm

33- گروپ 17 سے بننے والے ایٹمز پر چارج ہوتا ہے:

- (الف) +1 (ب) -1 (ج) +2 (د) -2

34- دو جڑے ہوئے ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلے کے نصف کو کہتے ہیں:

- (الف) الیکٹرون افینٹی (ب) الیکٹرونیکٹیوٹی (ج) ایٹمک ریڈیئس (د) آئیونائزیشن انرجی

35- جدید پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈز کی تعداد ہے:

- (الف) 2 (ب) 8 (ج) 18 (د) 7

36- مندرجہ ذیل میں سے کون سے شارٹ پیریڈ ہیں؟

- (الف) پہلا اور چھٹا (ب) دوسرا اور ساتواں (ج) دوسرا اور تیسرا (د) ساتواں اور پانچواں

37- پیریاڈک ٹیبل میں ویری لاگ پیریڈ ہے:

- (الف) پہلا (ب) دوسرا (ج) تیسرا (د) چھٹا

38- میٹلز کے گروپ (1) کو کہا جاتا ہے:

- (الف) ہیلوجنز (ب) الکلائن ارتھ میٹلز (ج) الکلی (د) ان میں سے کوئی نہیں

39- ایک ایلیمینٹ کی الیکٹرون کھونے کی صلاحیت کہلاتی ہے:

- (الف) الیکٹرونیکٹیوٹی (ب) الیکٹرون افینٹی (ج) آئیونائزیشن انرجی (د) میٹلک کریکٹر

### جوابات

|    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 1  | ج   | 2  | ج   | 3  | الف | 4  | ب   | 5  | ب   | 6  | ج   | 7  | الف | 8  | ب   |
| 9  | الف | 10 | د   | 11 | ج   | 12 | ج   | 13 | ج   | 14 | الف | 15 | ب   | 16 | الف |
| 17 | ج   | 18 | الف | 19 | ج   | 20 | الف | 21 | د   | 22 | ج   | 23 | الف | 24 | الف |
| 25 | د   | 26 | الف | 27 | ب   | 28 | الف | 29 | الف | 30 | ب   | 31 | ب   | 32 | ج   |
| 33 | ب   | 34 | ج   | 35 | د   | 36 | ج   | 37 | د   | 38 | ج   | 39 | د   | —  | —   |

## کثیر الانتخابی مختصر سوالات

مختصر جواب دیں۔

- 1- پیریڈ میں میٹلک کریکٹر کم کیوں ہوتا ہے؟  
جواب: پیریڈ میں دائیں سے بائیں جانب اٹامک سائز کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے میٹلک کریکٹر کم ہوتا ہے۔
- 2- مینڈلیف کے پیریاڈک لاء سے کیا مراد ہے؟  
جواب: مینڈلیف نے اپنے پیریاڈک لاء میں ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کی بنا پر ترتیب دیا۔
- 3- s-بلاک ایلیمنٹس سے کیا مراد ہے؟  
جواب: s-بلاک ایلیمنٹس سے مراد وہ ایلیمنٹس ہیں جن کا ویلنس الیکٹرون الیکٹرونک کنفیگریشن کے درمیان s-آربیٹل میں داخل ہوتا ہے۔
- 4- الیکٹرو نیگیٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟  
جواب: الیکٹرو نیگیٹیوٹی: کسی ایٹم کی مالیکول میں موجود اشتراک شدہ الیکٹرون پیئر کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کو الیکٹرو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں۔
- 5- الیکٹرون افینٹیٹی کی تعریف لکھیں۔  
جواب: کسی ایلیمنٹ کے آزاد گسی ایٹم کے ویلنس شیل میں الیکٹرون حاصل کرنے کے سبب خارج ہونے والی انرجی کو الیکٹرون افینٹیٹی کہتے ہیں۔  
$$F + e^- \longrightarrow F^- \quad \Delta H = -328 \text{ kJ mol}^{-1}$$
- 6- الکی میٹلز کے سب سے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں؟  
جواب: گروپ I- (الکی میٹلز) کے تمام ایلیمنٹس کے آخری شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے۔
- 7- الکی میٹلز کو الیکٹرو پازیٹیو میٹلز کیوں کہا جاتا ہے؟  
جواب: الکی میٹلز کو الیکٹرو پازیٹیو میٹلز کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں کیٹائن (پازیٹیو آئن) بنانے کے لیے اپنا ویلنس الیکٹرون کھولنے کا تمہید رجحان ہوتا ہے۔
- 8- میٹلک کریکٹر سے کیا مراد ہے؟ گروپ میں اس کا رجحان لکھیں۔  
جواب: میٹلک کریکٹر ایک ایلیمنٹ کا الیکٹرون کھونے کا رجحان ہے۔ گروپس میں میٹلک کریکٹر اوپر سے نیچے بڑھتا ہے۔
- 9- گروپ سے کیا مراد ہے؟  
جواب: گروپ: پیریاڈک ٹیبل میں اٹھارہ عمودی کالمز ہیں جنہیں 1 سے 18 تک بائیں سے دائیں جانب نمبر دیے گئے ہیں جو کہ گروپس کہلاتے ہیں۔
- 10- ایک ہی گروپ میں موجود ایلیمنٹس میں ایک جیسی کیمیائی خصوصیات کیوں ہوتی ہیں؟  
جواب: ایک ہی گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹس میں ایک جیسی کیمیائی خصوصیات ہوتی ہیں کیونکہ ان کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرونز کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔
- 11- الیکٹرونک کنفیگریشن کی تعریف لکھیں۔  
جواب: نیوکلیس کے درمیان شیلز اور سب شیلز میں الیکٹرونز کی بڑھتی ہوئی انرجی کے مطابق الیکٹرونز کی تقسیم کو الیکٹرونک کنفیگریشن کہتے ہیں۔
- 12- ہیلوجنز سے کیا مراد ہے؟  
جواب: گروپ 17 کے ایلیمنٹس کو ہیلوجنز کہا جاتا ہے۔ ہیلوجنز کا مطلب ہے نمک بنانے والے گروپ 17 کے ایلیمنٹس جب الکی میٹلز کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو نمک بناتے ہیں۔

13- پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈ کی تعریف لکھیں۔ ان کی کل تعداد کیا ہے؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل سات افقی قطاروں پر مشتمل ہے جو پیریڈز کہلاتی ہیں۔ ان کی کل تعداد سات (7) ہے۔

14- پیریاڈک ٹیبل کسی ایلیمینٹ کے گروپ نمبر کا تعین کیسے کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ایلیمینٹ کے گروپ نمبر کا تعین آخری شیل میں موجود الیکٹرونز کی تعداد سے کیا جاتا ہے۔

مثلاً: سوڈیم کے آخری شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اس لیے اس کا تعلق گروپ I سے ہے۔

15- گروپ 2 کے ایلیمینٹس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں؟

جواب: گروپ 2 کے ایلیمینٹس کے آخری شیل میں دو الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں۔

16- الکالائن ارتھ میٹلز سے کیا مراد ہے؟ ان کے نام لکھیں۔

جواب: گروپ 2 کی میٹلز کو الکالائن ارتھ میٹلز کہا جاتا ہے۔ بریلیم، میگنیشیم، کالمیم، سٹرانشیم، اورینیم۔

17- گروپ میں میٹلک کریکٹر کارجان کیا ہے؟

جواب: میٹلک کریکٹر اوپر سے نیچے کی جانب بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ گروپ میں نیچے کی طرف جاتے ہیں ایٹم کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے۔

18- جدید پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمینٹس کو کیسے ترتیب دیا گیا ہے؟

جواب: جدید پیریاڈک ٹیبل بڑھتے ہوئے ایٹمک نمبر کے مطابق ایلیمینٹس کی ترتیب پر مبنی ہے۔

19- گروپ 17 کے ایلیمینٹس کو الیکٹرو نیگیو ایلیمینٹس کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: گروپ 17 کے ایلیمینٹس کو الیکٹرو نیگیو ایلیمینٹس کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں ایٹم (ایلیکٹرون) بننے کے لیے الیکٹرونز حاصل کرنے کا شدید رجحان ہوتا ہے۔

20- پیریاڈک ٹیبل کے کون سے گروپس نارمل ایلیمینٹس پر مشتمل ہیں؟

جواب: 1 سے 2 اور 13 سے 17 تک کے گروپس کے ایلیمینٹس کو نارمل ایلیمینٹس کہا جاتا ہے۔

21- ایٹمک ریڈیئس کا یونٹ کیا ہے؟ کاربن کے ایٹم کا ریڈیئس کتنا ہے؟

جواب: ایٹمک ریڈیئس کو pm میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ کاربن کا ریڈیئس 77 pm ہے۔

22- جدید پیریاڈک ٹیبل میں کتنے پیریڈز ہیں؟

جواب: جدید پیریاڈک ٹیبل میں 7 افقی قطاریں ہیں جنہیں پیریڈز کہتے ہیں۔

23- چوتھے پیریڈ میں کتنے ایلیمینٹس ہیں؟

جواب: چوتھے پیریڈ میں 18 ایلیمینٹس ہیں۔

24- کیا ہمیشہ ایٹمک نمبر بڑھنے سے ایٹمک سائز بڑھے گا؟

جواب: ہمیشہ ایٹمک نمبر بڑھنے سے ایٹمک سائز نہیں بڑھتا۔ مثال کے طور پر کسی پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانے سے ایٹمک نمبر بڑھنے کے باوجود ایٹم کا سائز کم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرونز ایک ہی شیل میں شامل ہوتے ہیں اور نیوکلیس میں پروٹونز کی تعداد میں اضافہ الیکٹرونز پر مضبوط کشش پیدا کرتا ہے جس سے وہ نیوکلیس کے قریب کھینچے جاتے ہیں اور ایٹم کا سائز کم ہو جاتا ہے۔

نتیجہ: اناک نمبر میں اضافہ ہمیشہ ایٹم کے سائز میں اضافے کا باعث نہیں بنتا۔ ایٹم کا سائز الیکٹرونک شیلز کے ڈایامیٹر، نیوکلیئر چارج اور

25- دوسری آئیونائزیشن انرجی کی وہ پیلوز پہلی آئیونائزیشن انرجی کی وہ پیلوز سے زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟

جواب: (i) الیکٹروسٹیک فورس:

جب پہلا الیکٹرون نکال لیا جاتا ہے تو ایٹم پر پازٹیو چارج بڑھ جاتا ہے۔ اس پازٹیو چارج کی وجہ سے باقی الیکٹرونز نیوکلیس کی کشش زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا دوسرا الیکٹرون نکالنے کے لیے زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔

(ii) الیکٹرون شیلڈنگ:

جب پہلا الیکٹرون نکال لیا جاتا ہے تو الیکٹرون شیلڈنگ کم ہو جاتی ہے۔ الیکٹرون شیلڈنگ کا مطلب ہے کہ اندرونی شیلز کے الیکٹرون بیرونی شیلز کے الیکٹرونز کو نیوکلیس کی کشش جزوی طور پر بچاتے ہیں۔ جب شیلڈنگ کم ہوتی ہے تو نیوکلیس کی کشش زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں عوامل کی وجہ سے دوسری آئیونائزیشن انرجی پہلی سے زیادہ ہوتی ہے۔