

سوال 1: پیریاڈک ٹیبل میں موجود ایک گروپ کے ایلیمینٹس کے کیمیائی خواص میں مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ ان کے کیمیائی خواص میں تبدیلیاں کیوں ممکن ہیں؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں موجود ایک گروپ کے ایلیمینٹس کے کیمیائی خواص میں مماثلت ان کے بیرونی شیلز میں الیکٹرونز کی یکساں تعداد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ایلیمینٹس کے ایٹمک سائز اوپر سے نیچے بتدریج بڑھتے ہیں اس لیے کیمیائی خواص میں کچھ تبدیلیاں عین ممکن ہیں۔

سوال 2: الکی میٹلز گروپ (1) کی خصوصیات بیان کریں۔


جواب: الکی میٹلز: الکی میٹلز گروپ 1 میں موجود میٹلز ہیں۔ یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ان کے بیرونی شیل میں ایک ویلنس الیکٹرون ہوتا ہے۔

الیکٹرونک کنفیگریشن: گروپ 1 میں موجود تمام ایلیمینٹس کے بیرونی شیلز کی الیکٹرونک کنفیگریشن ns^1 ہے۔


گروپ 1 کے ایلیمینٹس میں ایٹمک سائز کا رجحان: گروپ 1 میں اوپر سے نیچے ایٹمک سائز بڑھتا ہے۔

گروپ 1 کے ایلیمینٹس کی ری ایکٹیویٹی: گروپ 1 میں اوپر سے نیچے ایٹمک سائز بڑھتا ہے اس لیے ایلیمینٹس کے لیے الیکٹرون کھونا بتدریج آسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیچے والے ایلیمینٹس کی ری ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔


پانی کے ساتھ ری ایکشن: (i) لیٹھیم: لیٹھیم پانی کے ساتھ آسانی سے ری ایکشن کر کے ہائیڈروجن گیس اور لیٹھیم ہائیڈروآکسائیڈ بناتی ہے۔






(ii) سوڈیم: سوڈیم کا پانی کے ساتھ ری ایکشن شدید ہوتا ہے۔ سوڈیم پانی کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔



(iii) پوٹاشیم: پوٹاشیم پانی کے ساتھ ری ایکٹ کر کے پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتی ہے۔



کلورین کے ساتھ ری ایکشن: گروپ 1 میں شامل ایلیمینٹس کلورین کے ساتھ تعامل کر کے کلورائیڈ بناتے ہیں۔ جب ہم گروپ 1 میں نیچے کی طرف جاتے ہیں تو یہ ری ایکشن بھی بتدریج شدید ہوتا ہے۔



سوال 3: گروپ 1 کے ایلیمینٹس کے میلنگ پوائنٹس اور ڈینسٹی کا پیریاڈک ٹیبل میں رجحان لکھیں۔

جواب: میلنگ پوائنٹس (Melting Points): گروپ 1 میں اوپر سے نیچے آنے سے جو ایٹمک سائز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے میٹلز کے ایٹمز کے درمیان کشش کی قوت بتدریج کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں میٹلز بتدریج نرم ہوتے جاتی ہیں جس سے ان کے میلنگ پوائنٹس کم ہوتے جاتے ہیں۔

ڈینسٹی (Density): اسی طرح گروپ 1 میں اوپر سے نیچے کی طرف ایٹمز کے سائز اور حجم دونوں بڑھتے ہیں لیکن چونکہ ایلیمینٹس کے ماسز میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کی ڈینسٹی میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی چیز کی ڈینسٹی اس کے یونٹ حجم میں ماس کی مقدار کو کہتے ہیں۔

نیبل: گروپ (1) کے ایلیمینٹس کے طبعی خواص

میٹل	Li	Na	K	Rb	Cs
میلنگ پوائنٹ °C	180	98	64	39	28
ڈینسٹی	0.53	0.97	0.86	1.53	1.87

سوال 4: ہیلوجنز کی فزیکل اور کیمیکل خصوصیات لکھیں۔

جواب: ہیلوجنز (Halogens): گروپ 17 کے ایلیمینٹس کو عام طور پر ہیلوجنز کہا جاتا ہے۔



بیرونی شیل میں الیکٹرونز کی تعداد گروپ 17 میں شامل تمام ایلیمینٹس کے بیرونی شیلز میں 7 الیکٹرونز (ns^2p^5) ہوتے ہیں۔

الیکٹرونیکو نان میٹلز گروپ 17 کے تمام ایلیمینٹس الیکٹرونیکو نان میٹلز ہیں۔ کیونکہ ان میں ایک الیکٹرون حاصل کر کے اینائن بنانے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔

گروپ 17 (ہیلوجنز) کی فزیکل خصوصیات گروپ 17 کے اپنے ایلیمینٹس ڈائی اٹامک مالیکیولز کی صورت میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ اٹامک ریڈیوں، میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس اوپر سے نیچے گروپ میں بتدریج بڑھتے ہیں۔

وجہ: ایلیمینٹس کے ساتھ ساتھ ہیلوجنز میں الیکٹرونز بڑھتے جاتے ہیں۔ جن سے ان کے سائز بھی بڑھتے ہیں۔ جب یہ ایٹمز آپس میں مل کر مالیکیولز بناتے ہیں تو ان کے سائز بھی بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔ چونکہ بڑے سائز کے مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے برومین اور آئیوڈین کے میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس کلورین اور فلورین سے زیادہ ہوتے ہیں۔

ہیلوجنز کے الکی اور الکلائن ارتھ میٹلز کے ساتھ ری ایکشنز ہیلوجنز کے الکی اور الکلائن ارتھ میٹلز سے ری ایکشنز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کا نام ہیلوجنز رکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے سالٹ بنانے والے ایلیمینٹس مثلاً:



ہیلوجنز کی ری ایکٹیوٹی کا رجحان ہیلوجنز کی ری ایکٹیوٹی گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ گروپ میں اٹامک سائز بڑھ جاتا ہے جس سے ان ایلیمینٹس کی الیکٹرون جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جو ری ایکٹیوٹی میں کمی کا باعث بنتی ہے۔

ہیلوجنز کے رنگ

فلورین (F_2) = فلورین گیس کا ہلکا پیلا رنگ ہے۔


کلورین (Cl_2) = کلورین کا رنگ بھی پیلا ہے لیکن اس میں سبز رنگ کی آمیزش ہوتی ہے۔

برومین (Br_2) = برومین کا رنگ بھی پیلا ہے جس میں سے بخارات نکلتے رہتے ہیں۔


آئیوڈین (I_2) = آئیوڈین کی کرٹلز چمکدار گرے رنگ کی ہیں جو گرم کرنے سے غنشی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ہیلوجنز، میٹلز کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو میٹل ہیلوآئڈز (Metal Halides) بنتے ہیں جو کہ مخصوص آئیوڈین کمپاؤنڈز ہیں۔

سوال 5: آکسائیڈیشن اور ریڈکشن میں فرق کریں۔

جواب: آکسائیڈیشن (Oxidation) ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں کسی شے کا الیکٹرون کھویا جاتا ہے اور جو شے الیکٹرون کھوتی ہے اس ریڈیو سنک ایجنٹ (Reducing Agent) کہتے ہیں۔




اس کے برعکس ریڈکشن (Reduction) ایسا عمل ہے جس میں الیکٹرون کسی شے سے حاصل ہوتا ہے۔ حاصل کرنے والی شے کو آکسیڈائزنگ ایجنٹ (Oxidizing Agent) کہتے ہیں۔






آکسیدیشن، ریڈکشن ری ایکشنز بیک وقت ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک شے الیکٹران اُس وقت نکالتی ہے جو کوئی دوسری شے اسے قبول کرنے والی موجود ہو۔

ہیلوجنز کی آکسیدائزنگ نیچر ہیلوجنز آکسیدائزنگ ایجنٹس ہیں اور ان کی آکسیدائزنگ پاور گروپ میں اوپر سے نیچے بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔




ڈسپلیمینٹ ری ایکشن: ہیلوجنز جن کی آکسیدائزنگ پاور زیادہ ہے وہ دوسرے ہیلوجنز کے آئنز کو اس کے کمپائونڈز میں سے نکال باہر کرتے ہیں۔




سوال 6: ہائیڈروجن ہیلائیڈز کیسے بنتے ہیں؟ ان کی تھرمل سٹیبلٹی کے متعلق لکھیں۔

جواب: ہائیڈروجن کے ساتھ ری ایکشن: ہیلوجنز، ہائیڈروجن سے لے کر ایکٹ کر کے ہائیڈروجن ہیلائیڈز (Hydrogen Halides) بناتے ہیں۔



تمام ہائیڈروجن ہیلائیڈز عام درجہ حرارت پر گیس کی صورت وقوع پذیر ہوتے ہیں سوائے ہائیڈروجن فلورائیڈ کے جو ایک مائع ہے۔ ہائیڈروجن ہیلائیڈز میں ہیلوجن اور ہائیڈروجن ایٹمز کے درمیان بانڈ لینتھ (Bond length) بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ہیلوجن ایٹم کا سائز بڑا ہونے سے کوویلنٹ بانڈ کا الیکٹرانی جوڑا ہیلوجن نیوکلئیس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس دوری کی وجہ سے ان دونوں ایٹمز کے درمیان بانڈ کمزور ہوتا جاتا ہے اس لیے اس بانڈ کو توڑنے کے لیے درکار انرجی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ ان باتوں کا حتمی نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن ہیلائیڈز کی تھرمل سٹیبلٹی (Thermal Stability) بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔



مشق

1- پہلے گروپ میں ایلیمینٹس کی ری ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ ایلیمینٹس آکسیجن کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کریں گے؟

جواب: آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن: الکی میٹلز آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کر کے آکسائیڈز بناتی ہیں۔




مثال:

الکی میٹلز کے آکسائیڈز بیسک خصوصیات رکھتے ہیں۔


2- ہیلوجنز کا پانی کے ساتھ ری ایکشن کیسے ہوتا ہے؟

جواب: ہیلوجنز کا پانی کے ساتھ ری ایکشن: ہیلوجنز پانی کے ساتھ ری ایکٹ کر کے ایسڈک سلوشنز بناتے ہیں۔



جزل ری ایکشن:

ہیلوجنز کی ری ایکٹیویٹی گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی ہے۔



مثال:

ہائپوکلورس ایسڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ پانی کلورین

سوال 7: ٹرانزیشن الیمینٹس سے کیا مراد ہے؟ ان کی خصوصیات اور اہمیت لکھیں۔

جواب: ٹرانزیشن الیمینٹس (Transition Elements): جدید پریاڈک ٹیبل کے درمیان میں گروپ 3 سے گروپ 12 میں موجود الیمینٹس کو d بلاک یا ٹرانزیشن الیمینٹس کہتے ہیں۔

طبعی خصوصیات تمام ٹرانزیشن الیمینٹس میٹلز ہیں اور ان کی خصوصیات آپس میں ملتی جلتی (ایک جیسی) ہے۔


- (i) ٹرانزیشن الیمینٹس عموماً سخت ہوتے ہیں۔
- (ii) ان کی ڈینسٹی، میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بھی زیادہ ہیں۔
- (iii) یہ میٹلز مختلف آکسیدیشن سٹیٹس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
- (iv) ان کے کمپاؤنڈز اکثر رنگدار ہوتے ہیں۔
- (v) یہ میٹلز میلبل اور ڈکٹائل ہوتی ہیں۔

اہمیت: ٹرانزیشن میٹلز اور ان کے کمپاؤنڈز بہت سے اہم کیمیکل ری ایکشنز میں بطور کیٹالسٹس (Catalysts) استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ میٹلز اشیاء کو اپنی سطحوں پر جذب کر کے ری ایکشن کے لیے ایکٹیوٹ (Activate) کر دیتی ہیں۔



سوال 8: ٹرانزیشن میٹلز کو بطور کیٹالسٹس کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: ٹرانزیشن میٹلز اور ان کے کمپاؤنڈز بہت سے اہم کیمیکل ری ایکشنز میں بطور کیٹالسٹس (Catalysts) استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ میٹلز اشیاء کو اپنی سطحوں پر جذب کر کے ری ایکشنز کے لیے ایکٹیوٹ (Activate) کر دیتی ہیں۔

آئرن کا استعمال: آئرن جو ایک ٹرانزیشن میٹل ہے ایک بہت ہی اہم صنعتی ری ایکشن میں بطور کیٹالسٹ استعمال ہوتا ہے۔ اس صنعتی ری ایکشن کو ہابر پراسس (Haber process) کہتے ہیں اور اس میں امونیا گیس بنائی جاتی ہے جو پھر یوریا کھاد بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔



پلاٹینم کا استعمال: پلاٹینم میٹل پہلے سلفیورک ایسڈ بنانے کے لیے کنٹیکٹ پروس (Contact Process) میں استعمال ہوتا تھا تاہم یہ مہنگا کیٹالسٹ نان ری ایکٹیو ہو جاتا تھا کیونکہ سلفر ڈائی آکسائیڈ میں آرسینک کی موجودگی بطور ملاوٹ اسے متاثر کرتی تھی۔ اس لیے اب وینڈیم پینٹا آکسائیڈ (Vanadium pentoxide) (V₂O₅) کو بطور کیٹالسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔



کیٹالیک کنورٹرز میں استعمال: کیٹالیک کنورٹرز (Catalytic Converter) ایک ایسا آلہ ہے جس کو گاڑیوں میں موجود اخراج کے نظام میں لگایا جاتا ہے۔ یہ آلہ انجن میں فیول کے جلنے سے پیدا ہونے والی نقصان دہ گیسوں کو ایسی گیسوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو ماحول کے لیے خطرناک نہیں ہیں۔ ان کیٹالیک کنورٹرز میں پلاٹینم، پالڈیم اور رھوڈیم میٹلز کو بطور کیٹالسٹس استعمال کیا جاتا ہے۔

نکل کا استعمال: ایک ٹرانزیشن میٹل نکل (Nickel) کو ویکٹیل آئل کی ہائیڈروجنیشن (Hydrogenation) کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ری ایکشن سے مارجرین (Margarine) بنتی ہے جو مکھن کے مقابلے میں دیر تک رکھنے پر بھی خراب نہیں ہوتی۔

سوال 9: نوبل گیسز کے کیا مراد ہے؟ نوبل گیسز کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: نوبل گیسز (Nobel Gases) جدید پیریاڈک ٹیبل کے گروپ 18 میں موجود ایلیمینٹس کو نوبل گیسز کہا جاتا ہے۔

مونو اٹامک: تمام نوبل گیسز مونو اٹامک ہیں۔ ان کے میلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔ نوبل گیسز کے نام اور سمبلز:

ہیلیم = He ، نیون = Ne ، آرگون = Ar ، کریپٹون = Kr ، زینون = Xe ، ریڈون = Rn

بیرونی شیلز میں الیکٹرون کی تعداد: ان تمام گیسز کے بیرونی شیلز میں آٹھ الیکٹرونز ہیں ماسوائے ہیلیم کے جس کے بیرونی شیل میں دو الیکٹرونز ہیں۔

کیمیکل ری ایکٹیویٹی: ان سب ایلیمینٹس کے بیرونی شیلز مکمل بھرے ہوتے ہیں اس لیے ان کی کیمیکل ری ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔

سوال 10: میٹلز کی طبعی خصوصیات لکھیں۔

جواب: میٹلز: میٹلز ایسے ایلیمینٹس ہیں جو آسانی سے الیکٹرون یا الیکٹرونز کھو کر کیٹائن بناتے ہیں۔

میٹلز کی خصوصیات

(i) میٹلز میں موجود ایٹمز کے درمیان میٹلک بانڈ ہوتا ہے۔

(ii) میٹلز کو تھوڑے سے بھر کر شیش یا چادروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس خاصیت کو ملیا بیلٹی (Malleability) کہتے ہیں۔

(iii) میٹلز کو کھینچ کر تاروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اس خاصیت کو ڈکٹیلٹی (Ductility) کہتے ہیں۔

(iv) میٹلز میں میٹلک بانڈ کی موجودگی انھیں حرارت اور الیکٹریسیٹی کی بہترین کنڈکٹرز بناتی ہیں۔

(v) میٹلز عام طور پر چمکدار ہوتی ہیں۔

(vi) زیادہ تر ٹینسائل سٹرنٹھ کی وجہ سے میٹلز بھاری وزن اٹھا سکتی ہیں۔

(vii) جب میٹلز پر کسی چیز کی ضرب لگائی جاتی ہے تو ان میں ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جسے رنگینگ ساؤنڈ کہتے ہیں۔

(viii) میٹلز عام طور پر سخت ہوتی ہیں اس لیے انھیں کاٹنا آسان نہیں ہے سوائے الکی میٹلز کے جو کافی نرم ہوتی ہیں۔

(ix) طاقتور میٹلک بانڈ کی موجودگی کی وجہ سے میٹلز کے میلنگ اور بوائنگ پوائنٹس عموماً زیادہ ہوتے ہیں۔

(x) ان کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔

(xi) میٹلز کی مثالیں: الکی میٹلز، کارپ، سلور، آئرن، لیڈ، ایلومینیم، گولڈ، پلائنیم اور زنک وغیرہ شامل ہیں۔

سوال 11: نان میٹلز کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: نان میٹلز (Non-metals): ایسے ایلیمینٹس جو الیکٹرونز حاصل کر کے آسانی سے اینائن بناتے ہیں نان میٹلز کہلاتے ہیں۔ ان کو

الیکٹرو نیگیٹیو ایلیمینٹس بھی کہتے ہیں۔

نان میٹلز کی خصوصیات: نان میٹلز کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔

(i) نان میٹلز عموماً آسانی سے الیکٹرون حاصل کر لیتی ہیں۔

(ii) نان میٹلز کے رنگوں میں خاصی ورائٹی پائی جاتی ہے۔ بھر بھری ہونے کی وجہ سے نان میٹلز کی ملیا بیلٹی ممکن نہیں ہے کیونکہ ان پر ضرب لگانے سے یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔

(iii) نان میٹلز شیش بنانا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی گرم کر کے ان سے تاریں بنائی جاتی ہیں۔


- (iv) نان میٹلز کے درمیان بانڈز مقابلتہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کو میٹلز کی طرح کھینچا نہیں جاسکتا۔
- (v) نان میٹلز کے ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز آزاد نہیں کھینچ سکتے اس لیے یہ بجلی اور حرارت کے کندکڑ نہیں ہوتے۔
- (vi) نان میٹلز کو پالش کرنا ممکن نہیں ہے یہ یا تو پاؤڈر کی شکل میں ملتے ہیں یا پھر کھسکتے ہیں۔
- (vii) زیادہ تر نان میٹلز کے پاؤڈر غیر چمکدار ہوتے ہیں۔
- (viii) ڈکٹیلیٹی یا ملیا بیٹی ممکن نہ ہونے کی وجہ سے نان میٹلز مضبوط نہیں ہوتیں۔
- (ix) ان کے بانڈز کمزور ہونے کی وجہ سے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔
- (x) تمام نان میٹلز کے میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں سوائے گریفائٹ اور ڈائمنڈ کے۔
- (xi) نان میٹلز کی ڈینسٹی کی ویلیوز میٹلز کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔
- (xii) آکسیجن، نائٹروجن، کلورین، سلفر، کاربن اور برومین وغیرہ نان میٹلز کی چند مثالیں ہیں۔
- سوال 12: میٹلز اور نان میٹلز کے خواص کا موازنہ کریں۔

جواب:

میٹلز اور نان میٹلز کے طبعی خواص کا موازنہ	
نان میٹلز (Non-Metals)	میٹلز (Metals)
نان میٹلز عام درجہ حرارت پر ٹھوس مائع اور گیس کی حالتوں میں پائی جاتی ہیں ان کے میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں۔	عام طور پر میٹلز کے میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں۔
نان میٹلز بجلی اور حرارت کی ناقص کندکڑ ہیں (سوائے گریفائٹ کے)۔	میٹلز بجلی اور حرارت کی اچھی کندکڑ ہیں۔
نان میٹلز بھری ہوتی ہیں۔	دباؤ کی وجہ سے میٹلز کی شکل و صورت تبدیل کی جاسکتی ہے ان کو تاروں اور شیٹس میں ڈھالا جاتا ہے۔
نان میٹلز چمکدار نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان کو پالش کیا جاسکتا ہے (سوائے آئیوڈین کے)	میٹلز عام طور پر چمکدار ٹھوس حالت میں ہوتی ہیں (سوائے مرکری کے)۔
نان میٹلز عام طور پر نہ تو سخت ہوتی ہیں اور نہ ہی مضبوط۔	عام طور پر میٹلز سخت اور مضبوط ہوتی ہیں۔

دلچسپ معلومات

- ☆ سیزیم اور پوٹاشیم پانی سے ہلکی میٹلز ہیں جبکہ ریڈیم پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ سیزیم (Cesium) جب پانی سے ملتی ہے تو دھماکہ ہوتا جس سے ممکنہ طور پر برش ٹوٹ سکتا ہے۔
- ☆ نہانے والے تالاب میں موجود پانی کو کلورین گیس کی مدد سے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔
- ☆ پیریاڈک ٹیبل میں موجود 75% میٹلز ہیں۔ 20 نان میٹلز ہیں جو کہ عام درجہ حرارت پر ٹھوس مائع اور گیس کی حالتوں میں ہیں۔
- ☆ ایک رپورٹ کے مطابق 19 پیمینٹس کثرت استعمال کی وجہ سے معدوم ہونے کے خطرہ سے دوچار ہیں۔ ان میں آرسینک، گلیسیم، ہیلیم، گولڈ اور زنک شامل ہیں۔



گرافائٹ کی ساخت

سوال 13: نان میٹلز بجلی اور حرارت کی اچھی کنڈکٹرز کیوں نہیں ہوتیں؟ لیکن گرافائٹ کو استثناء ہے۔ وضاحت کریں۔

جواب: نان میٹلز بجلی اور حرارت کی اچھی کنڈکٹرز نہیں ہوتیں کیونکہ نان میٹلز میں آزاد الیکٹرون نہیں ہوتے۔ گرافائٹ ایک کو استثناء ہے۔ اس میں موجود ایٹمز کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ الیکٹرونز حرکت کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ بجلی کا کنڈکٹر ہے۔ گرافائٹ کے کرٹلز میں ایٹمز کمزور گرفت کے ساتھ تہ در تہ جڑے ہوتے ہیں۔ ان تہوں کے درمیان جو الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ گرافائٹ کا کنڈکٹر ہونا ان الیکٹرونز کی حرکت کی وجہ سے ہے۔

سوال 14: ٹرانزیشن میٹلز میں ٹینسائل سٹرنٹھ زیادہ کیوں ہوتی ہے؟

جواب: ٹینسائل سٹرنٹھ ایک مادی خصوصیت ہے جو کسی مادہ کی کھینچنے یا تباہی کے خلاف مزاحمت کی پیمائش کرتی ہے۔ زیادہ ٹینسائل سٹرنٹھ کا مطلب ہے کہ مادہ ٹوٹنے سے پہلے زیادہ کھینچ برداشت کر سکتا ہے۔

ٹرانزیشن میٹلز میں مضبوط میٹلک بانڈز ہوتے ہیں۔ جو ان کی زیادہ ٹینسائل سٹرنٹھ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ میٹلز میں موجود الیکٹرونز آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے مضبوط بانڈز بنتے ہیں۔

سوال 15: ہائیڈروجن ہیلانڈز کی تھرمل سٹیبلٹی بتدریج کم کیوں ہوتی جاتی ہے؟

جواب: ہائیڈروجن اور ہیلانڈز میں ہیلوجن اور ہائیڈروجن ایٹمز کے درمیان بانڈ لینتھ بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ہیلوجن ایٹم کا سائز بڑا ہونے سے کوویلنٹ بانڈ کا الیکٹران جوڑا ہیلوجن نیوکلیس سے دور ہوتا جاتا ہے اس دوری کی وجہ سے ان دونوں ایٹمز کے درمیان بانڈ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اس بانڈ کو توڑنے کے لیے کم انرجی درکار ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہائیڈروجن ہیلانڈز کی تھرمل سٹیبلٹی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔

اہم نکات

- 1- گروپ 1 کے ایلیمینٹس کے ایٹمی سائز اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ایلیمینٹس کے لیے اپنے واحد الیکٹرون کو کھونا آسان ہو جاتا ہے۔
- 2- گروپ 1 میں موجود ایلیمینٹس کی کیمیکل ری ایکٹیویٹی اوپر سے نیچے آنے کی صورت میں بڑھتی ہے۔
- 3- گروپ 1 میں موجود ایلیمینٹس کے ایٹمک سائز میں اضافے کی وجہ سے موجود ایٹمز کے مابین کشش اوپر سے نیچے بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ ایلیمینٹس بتدریج نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے میلنگ پوائنٹس بھی کم ہو جاتے ہیں۔
- 4- ایٹمز کے سائز اور حجم میں اضافے کے باعث الیکٹرونیکی ڈیولٹی گروپ میں اوپر سے نیچے بڑھتی ہے۔
- 5- گروپ 17 ایلیمینٹس یا ہیلوجنز ڈائی ایٹمک مالیکیولز کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یا انتہائی ری ایکٹیو نان میٹلز ہیں جو الکی اور الکلائن ارتھ میٹلز کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں۔
- 6- ہیلوجنز آکسی ڈائزنگ ایجنٹس ہیں اور ان کی آکسی ڈائزنگ طاقت (Power Oxidizing) گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی جاتی ہے۔

- 7- اگر گروپ 17 میں جیسے جیسے نیچے کی جانب بڑھتے ہیں ہائیڈروجن اور ہیلوجنز کا بانڈ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے گروپ میں نیچے آنے سے ہائیڈروجن ہائیڈروجن کی شکل میں ہوجاتی ہے۔
- 8- d بلاک کے ایلیمینٹس سب میٹلز ہیں۔ عام طور پر یہ میٹلز سخت ہوتی ہیں اور ان کی فزیکل و کیمیکل خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں۔ ان ایلیمینٹس اور ان کے کمپائونڈز کو بطور کیٹالسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔
- 9- تمام نوبل گیسوں کی ایکٹوٹی کم ہوتی ہے کیونکہ ان کے بیرونی شیلز مکمل ہیں۔
- 10- میٹلز اور نان میٹلز کی فزیکل خصوصیات میں بہت فرق ہے۔



مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔
- (i) کون سا ہیلوجن الکلائن ارتھ میٹلز کے ساتھ سب سے آہستہ ری ایکٹ کرے گا؟
 (الف) کلورین (ب) آئیوڈین (ج) برومین (د) فلورین
- (ii) کون سا کمپائونڈ رنگین ہوگا؟
 (الف) KCl (ب) $BaCl_2$ (ج) $AlCl_3$ (د) $NiCl_2$
- (iii) کن ایلیمینٹس کے ایٹمز میں مضبوط ترین باہمی کشش موجود ہوتی ہے؟
 (الف) Mg (ب) Ca (ج) Sr (د) Ba
- (iv) کس گروپ کے تمام ایلیمینٹس رنگین ہیں؟
 (الف) دوسرے گروپ (ب) چھٹے گروپ (ج) چوتھے گروپ (د) پانچویں گروپ
- (v) کون سا ہیلوجن ایسڈ عام درجہ حرارت پر ان سٹبل ہے؟
 (الف) HBr (ب) HI (ج) HCl (د) HF
- (vi) کون سا آکسائیڈ سب سے بلیک آکسائیڈ ہے؟
 (الف) Na_2O (ب) Li_2O (ج) MgO (د) CO
- (vii) کون سے گروپ کے ایلیمینٹس سب سے زیادہ ری ایکٹو ہیں؟
 (الف) ٹرانزیشن میٹلز گروپ (ب) پہلا گروپ (ج) دوسرا گروپ (د) تیسرا گروپ
- (viii) درج ذیل ہیلوجن اور سوڈیم ہائیڈرائڈ کے سلوشنز کو آپس میں ملا یا جاتا ہے۔ کون سا سلوشن ایک ری ایکشن کے نتیجے میں گہرے رنگ کا ہو جائے گا؟
 (الف) $NaCl$ اور Br_2 (ب) NaF اور Br_2 (ج) NaF اور Cl_2 (د) NaI اور Cl_2
- (ix) x ایک مونو اٹامک گیس ہے۔ کون سا بیان اس کے بارے میں درست ہے؟
 (الف) x ہوا میں جلتی ہے (ب) x رنگین ہے (ج) x نان ری ایکٹو ہے (د) x آئیوڈین کو سوڈیم آئیوڈائیڈ میں سے باہر نکال دے گا

(x) گروپ کے انشمیں کے لیے کون سی خصوصیت درست ہے؟

(الف) کم کیپالسٹ سرگرمی (ب) زیادہ ڈنپٹی (ج) کم الیکٹرک کڈ کیوٹی (د) زیادہ میلنگ پوائنٹ

جوابات

1	ب	2	د	3	الف	4	ب	5	ب
6	الف	7	ب	8	ج	9	ج	10	الف

2- مختصر سوالات۔

(i) جب ہم گروپ میں نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو الکی میٹل کا کائنا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟
الکی میٹلز نرم ہوتی جاتی ہیں جب ہم گروپ میں نیچے کی جانب حرکت کرتے ہیں کیونکہ ایٹمز کا سائز بڑھنے کی وجہ سے میٹلک بانڈ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے الکی میٹلز کو توڑنا آسان ہے۔

(ii) ہیلوجنز کے ساتھ پوٹاشیم کی ری ایکٹیوٹی کے بارے میں بتائیں۔
پوٹاشیم ہیلوجنز جیسے کہ کلورین کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے اور پوٹاشیم ہیلوائیڈ (کلورائیڈ) (مثلاً KCl) بناتا ہے۔ اس ری ایکشن میں انرجی خارج ہوتی ہے اور سالٹ بنتا ہے۔

(iii) درج ذیل ری ایکشن میں کلورین ایک آکسی ڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس میں ریڈیوسنگ ایجنٹ کون سا ہوگا؟



جواب: NaBr ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے کیونکہ برومین (Br) الیکٹرون خارج کرتا ہے اور کلورین حاصل کرتا ہے۔

(iv) آئیوڈین عام درجہ حرارت پر ٹھوس حالت میں کیوں پائی جاتی ہے؟

جواب: آئیوڈین ٹھوس شکل میں پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے مالیکیولز بڑے ہوتے ہیں اور ان میں مضبوط انٹر مالیکیولر فورسز (وینڈر وال فورسز) ہوتی ہیں جو انھیں ٹھوس ساخت میں اکٹھا رکھتی ہیں۔

(v) تیل کی ہائیڈروجنیشن میں Ni کسی طرح ایک کیپالسٹ کے طور پر کام کرتا ہے؟

جواب: نکل (Ni) ایک کیپالسٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ایک جگہ فراہم کرتا ہے جہاں ہائیڈروجن اور آئل کے مالیکیولز زیادہ موثر طریقے سے تعامل کر سکتے ہیں اور ان کو سچور پیڈ فیٹس میں تبدیل کرنے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔

3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)


(i) کسی نوہل گیس کا بوائٹنگ پوائنٹ سب سے کم ہونا چاہیے اور کیوں؟

جواب: ہیلیم کا بوائٹنگ پوائنٹ سب سے کم ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹا نوہل گیس ایلیمنٹ ہے۔ اس میں انٹر مالیکیولر فورسز (لندن ڈسپرشن فورسز) بہت کمزور ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے ہیلیم گیس کی حالت میں پائی جاتی ہے۔

(ii) الکی میٹلز اور کلورین کے ری ایکشنز کا موازنہ کریں۔

جواب: الکی میٹلز اور کلورین کے ساتھ ری ایکٹ کر کے میٹل کلورائیڈز بناتے ہیں۔

مثال کے طور پر سوڈیم کلورین کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) بناتا ہے۔ اس میں ہیٹ اور لائٹ بھی پیدا ہوتی ہے۔



(iii) عام طور پر میٹلز ٹھوس جبکہ نان میٹلز عموماً مائع اور گیس حالت میں پائی جاتی ہیں کیوں؟
جواب: میٹلز میں آزاد حرکت کرنے والے الیکٹرون کی وجہ سے مضبوط میٹلیک بانڈز موجود ہوتے ہیں جو انہیں روم ٹمپریچر پر ٹھوس بناتے ہیں۔ نان میٹلز میں کمزور انٹر مالیکیولر فورسز موجود ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سی نان میٹلز گیسز یا کمزور ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں۔

(iv) پیریاڈک ٹیبل میں سے کوئی سے تین ایلیمینٹس کے نام بتائیں جو مائع حالت میں پائے جاتے ہیں۔
جواب: ☆ مرکری (Hg) ☆ برومین (Br) ☆ گلیمیم (Ga)

(v) ٹرانزیشن ایلیمینٹس نارل ایلیمینٹس سے کیوں مختلف ہوتے ہیں؟
جواب: ٹرانزیشن ایلیمینٹس میں جزوی طور پر بھرے ہوئے d آر بیٹلز ہوتے ہیں جو انہیں منفرد خصوصیات دیتے ہیں جیسے کہ ویری اسبل آکسیدیشن سٹیٹس، رنگین کمپاؤنڈز کی تشکیل اور کیٹالیٹک خصوصیات وغیرہ۔

(vi) کلورین اور برومین کا بطور کسی ڈائننگ ایجنٹ موازنہ کریں۔
جواب: کلورین اور برومین سے زیادہ مضبوط آکسیدائنگ ایجنٹ ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونگیٹیویٹی زیادہ اور اٹامک سائز چھوٹا ہوتا ہے جو اسے الیکٹرون کو زیادہ آسانی سے حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

(vii) ہیلوجنز میں سے کون سا ایلیمینٹ سب سے زیادہ ری ایکٹیو اور کون سا ایلیمینٹ سب سے کم ری ایکٹیو ہے؟ اپنے جواب کی دو وجوہات بیان کریں۔
جواب: سب سے زیادہ ری ایکٹیو: فلورین سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونگیٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اور اٹامک سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ سب سے کم ری ایکٹیو: آئیوڈین سب سے کم ری ایکٹیو ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونگیٹیویٹی کم ہوتی ہے اور اٹامک سائز زیادہ ہوتا ہے۔

4- تفصیلی سوالات۔

(i) گاڑیوں میں کیٹالیٹک کنورٹر کے استعمال کی وضاحت کریں۔
جواب: ایک کیٹالیٹک کنورٹر گاڑی سے نکلنے والی گیسوں کو کم نقصان دہ گیسوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ کاربن مونو آکسائیڈ (CO) اور نائٹروجن آکسائیڈ (NOx) جیسی زہریلی گیسوں کو کم نقصان دہ گیسوں جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) اور نائٹروجن (N₂) میں تبدیل کرتا ہے۔ کنورٹر میں پلاٹینیم اور پیلڈیم کیٹالسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔

(ii) الکی میٹلز میں کیمیائی ری ایکشنز کے رجحانات گروپ میں نیچے کی طرف بڑھتے ہیں جبکہ ہیلوجنز میں یہ رجحانات کم ہوتے ہیں کیوں؟
جواب: الکی میٹلز: الکی میٹلز میں ری ایکٹیویٹی اٹامک سائز بڑھنے کی وجہ سے بڑھتی ہے کیونکہ بیرونی الیکٹرون نیوکلئیس سے دور ہوتا ہے اور اسے خارج کرنا آسان ہوتا ہے۔

ہیلوجنز: ہیلوجنز میں گروپ میں اٹامک سائز بڑھنے کی وجہ سے ری ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے کیونکہ نیوکلئیر کشش کی وجہ سے الیکٹرونز کو حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔

(iii) میٹلز عموماً سخت اور مضبوط ہوتی ہیں جبکہ نان میٹلز نہ ہی سخت اور نہ ہی مضبوط ہوتی ہیں کیوں؟
جواب: میٹلز: میٹلز میں آزاد الیکٹرونز سے بننے والے میٹلیک بانڈز مضبوط ہوتے ہیں جو میٹلز کے آئز کو ایک ساتھ رکھتے ہیں جس سے میٹلز مضبوط اور سخت ہوتی ہیں۔

نان میٹلز: نان میٹلز میں کوویلنٹ بانڈز اور انٹر مالیکیولر فورسز کمزور ہوتی ہیں جو انہیں کمزور بناتی ہیں۔

(iv) الکی میٹلز اور ہیلوجنز ایک دوسرے کے مخالف کرداروں کے باوجود ری ایکٹو پیمائش میں وضاحت کریں۔

جواب: الکی میٹلز پازیٹو آکسز بنانے کے لیے الیکٹرونز خارج کرتے ہیں۔ جو انھیں مضبوط ریڈیوسنگ ایجنٹ بناتی ہیں۔ ہیلوجنز نیگیٹو آکسز بنانے کے لیے الیکٹرونز حاصل کرتے ہیں جو انھیں مضبوط آکسڈانٹ بناتے ہیں۔ ان کی ری ایکٹیوٹی مستحکم الیکٹرونک کنفیگریشن حاصل کرنے کے رجحان کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(v) ہائیڈروجن برومائیڈ، ہائیڈروجن کلورائیڈ کے مقابلے میں کم شیل ہے کیوں؟

جواب: ہائیڈروجن برومائیڈ، کا بانڈ ہائیڈروجن کلورائیڈ کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ برومین کلورین سے بڑا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کمزور بانڈ بنتا ہے۔ HBr کم درجہ حرارت پر ڈی کمپوز ہو جاتا ہے۔

(vi) میٹلز اور نان میٹلز کی خصوصیات کا موازنہ کریں۔

میٹلز اور نان میٹلز کے طبعی خواص کا موازنہ		جواب:
عام طور پر میٹلز کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں۔	نان میٹلز عام درجہ حرارت پر ٹھوس مائع اور گیس کی حالتوں میں پائی جاتی ہیں ان کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں۔	
میٹلز بجلی اور حرارت کی اچھی کنڈکٹرز ہیں۔	نان میٹلز بجلی اور حرارت کی ناقص کنڈکٹرز ہیں (سوائے گرافائیٹ کے)۔	
عام طور پر میٹلز سخت اور مضبوط ہوتے ہیں۔	نان میٹلز عام طور پر نہ تو سخت ہوتے ہیں اور نہ ہی مضبوط۔	

(vii) بطور کیپالسٹ V_2O_5 کو سلفر ڈائی آکسائیڈ کی آکسائیڈیشن میں پلاٹینم پری کوریج دی جاتی ہے۔ وجہ بتائیں۔

جواب: V_2O_5 کم مہنگا ہے، زیادہ درجہ حرارت پر زیادہ موثر ہے اور آکسائیڈیشن کے عمل کے دوران مستحکم رہتا ہے۔ جبکہ پلاٹینم مہنگا ہے اور یہ زہریلا ہو سکتا ہے۔

5- تحقیقی سوالات (Investigative Questions)

(i) ایٹمی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں بطور حرارت کی منتقلی کے لیے سوڈیم کے کردار کی وضاحت کریں۔ سوڈیم کی کون سی خصوصیت اس کردار میں استعمال ہوتی ہے؟

جواب: سوڈیم کو اس لیے استعمال کی جاتا ہے کیونکہ اس میں تھرمل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور مائع ٹمبر پمپ کی وسیع رینج ہوتی ہے۔ یہ ری ایکٹر سے سٹیم جنریٹر تک ہیٹ کو موثر طریقے سے منتقل کرتا ہے۔

(ii) لیٹھیم کی خصوصیات باقی الکی میٹلز سے کس طرح مختلف ہیں اس کی وجہ بھی بتائیں؟

جواب: لیٹھیم کا ایٹمی نمبر کم ہے، آکسائیڈیشن انرجی زیادہ اور مضبوط کوویلنٹ کریکٹر ہوتا ہے۔ یہ پانی کے ساتھ کم ری ایکٹیوٹی ظاہر کرتا ہے اور پر آکسائیڈ اور سپر آکسائیڈ کی بجائے ایک مستحکم (Li_2O) آکسائیڈ بناتا ہے۔

(iii) ایلمینیم کو کھانا کھانے کے برتنوں کی تیاری میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ میگنیشیم کو اس مقصد کے لیے مفید نہیں سمجھا جاتا کیوں؟

جواب: ایلمینیم وزن میں ہلکا ہے۔ اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی اچھی ہوتی ہے اور آکسائیڈ کی ایک تہہ بننے کی وجہ سے ہائیڈروجن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ میگنیشیم اگرچہ وزن میں ہلکا ہے لیکن اسے ترجیح نہیں دی جاتی ہے کیونکہ یہ کم پائیدار ہوتا ہے اور پانی کے ساتھ زیادہ ری ایکٹیوٹی ظاہر کرتا ہے۔

کثیر الانتخابی معروضی سوالات

- ☆ درست جواب کا انتخاب کریں۔
- 1 مندرجہ ذیل میں سے کون سی ہلکی میٹلز ہیں؟
 (الف) ہیلوجنز (ب) الکلائن ارتھ میٹلز (ج) الکی میٹلز (د) ب اور ج دونوں
- 2 عام طور پر تمام نان میٹلز میں ہوتے ہیں:
 (الف) کم میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس
 (ج) زیادہ میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس
 (د) زیادہ میلنگ پوائنٹس
- 3 نان میٹلز کی ڈینسٹی ہوتی ہے:
 (الف) کم (ب) زیادہ (ج) معتدل (د) بہت زیادہ
- 4 الیکٹرونز حاصل کرنے کو کہتے ہیں:
 (الف) ریڈکشن (ب) آکسیدیشن (ج) ریڈوکس ری ایکشنز (د) ہائیڈرولائسز
- 5 جیٹھ پائڈک ٹیبل کے وسط میں موجود ایلیمینٹس، گروپ 3 سے گروپ 17 تک کہلاتے ہیں:
 (الف) ہیلوجنز (ب) ٹرانزیشن ایلیمینٹس (ج) نوبل گیسز (د) نان میٹلز
- 6 تمام ٹرانزیشن ایلیمینٹس ہیں:
 (الف) نان میٹلز (ب) میٹلز (ج) نوبل گیسز (د) ہیلوجنز
- 7 ہمہر کے عمل میں کیا لٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
 (الف) Ni (ب) C (ج) Co (د) Fe
- 8 تیل کی ہائیڈروجنیشن کے لیے کون سی میٹل بطور کیا لٹ استعمال ہوتی ہے؟
 (الف) Fe (ب) Ni (ج) Co (د) Zn
- 9 نان میٹلز ناقص کنڈکٹر ہوتی ہیں سوائے:
 (الف) آئیوڈین (ب) گریفائٹ (ج) سلفر (د) فاسفورس
- 10 پیریاڈک ٹیبل کے گروپ 18 کے ایلیمینٹس کہلاتے ہیں:
 (الف) الکلائن ارتھ میٹلز (ب) الکی میٹلز (ج) ہیلوجنز (د) نوبل گیسز
- 11 تمام نوبل گیسز ہیں:
 (الف) مونو اٹامک (ب) ڈائی اٹامک (ج) ٹرائی اٹامک (د) الف اور ب دونوں
- 12 نوبل گیسز ظاہر کرتی ہیں:
 (الف) بہت زیادہ کیمیائی رد عمل (ب) معتدل کیمیائی رد عمل (ج) بہت کم ری ایکٹیویٹی (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 13 مندرجہ ذیل میں سے کون سا ہیلوجن ہے؟
 (الف) Na (ب) Ca (ج) Cl₂ (د) O₂

- 14- الیکٹرڈ کا اخراج کہلاتا ہے: (الف) آکسیدیشن (ب) ریلیکشن (ج) ہائیڈرولائس (د) ب اور ج دونوں
- 15- ہیلوجنز کا اٹاک ریڈیٹس: (الف) گروپ میں نیچے کی جانب کم ہوتا ہے (ب) گروپ میں نیچے کی جانب بڑھتا ہے (ج) پیریڈ میں دائیں سے بائیں جانب کم ہوتا ہے (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 16- سوڈیم میٹل کی ڈینسٹی ہے: (الف) 1.87 g/cm^3 (ب) 1.53 g/cm^3 (ج) 2.0 g/cm^3 (د) 0.97 g/cm^3
- 17- مندرجہ ذیل میں سے کسی گروپ کے ایلیمینٹس کو الیکٹرونیکو نان میٹلو کہا جاتا ہے؟ (الف) گروپ 3 (ب) گروپ 17 (ج) گروپ 18 (د) گروپ 2
- 18- کس گیس کا رنگ زرد ہوتا ہے؟ (الف) برومین (ب) آئیوڈین (ج) فلورین (د) کلورین
- 19- الکی میٹلو کے بیرونی شیل کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہے: (الف) ns^1 (ب) ns^2 (ج) ns^3 (د) ns^4
- 20- مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایلیمینٹ پانی سے ہلکا ہے؟ (الف) Fe (ب) Ca (ج) Na (د) Mg
- 21- پوٹاشیم کلورین کے ساتھ ری ایکٹ کر کے بناتی ہے: (الف) پوٹاشیم آکسائیڈ (ب) پوٹاشیم کلورائیڈ (ج) پوٹاشیم کلورائیڈ (د) پوٹاشیم ڈائی کلورائیڈ
- 22- مندرجہ ذیل میں سے کون سی نوبل گیس ہے؟ (الف) فلورین (ب) نیون (ج) سوڈیم (د) ہائیڈروجن
- 23- کنٹیکٹ کے عمل میں کیا لسٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے: (الف) Fe (ب) Ni (ج) V_2O_5 (د) H_2
- 24- میٹلو ہیلائیڈز عام طور پر ہوتے ہیں: (الف) آئیونک کمپائونڈ (ب) کوویلنٹ کمپائونڈ (ج) ہائیڈروجن چمکدار سرخی کرکٹ کے طور پر موجود ہوتا ہے جو گرم ہونے پر آسانی سے گہرے جامنی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ (الف) فلورین (ب) کلورین (ج) برومین (د) آئیوڈین
- 25- سوئمگ پول کے پانی کو کیسے سٹریلائز (جراثیم سے پاک) کیا جاتا ہے؟ (الف) فلورین (ب) کلورین (ج) آئیوڈین (د) برومین
- 26- کون سی میٹلو رگین کمپائونڈز بناتی ہیں؟ (الف) ٹرانزیشن میٹلو (ب) الکی میٹلو (ج) الکلائن ارتھ میٹلو (د) نان میٹلو

- 28- میٹنر پانی پین (الف) کوویلنٹ بانڈ (ب) آئیونک بانڈ (ج) کوآرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (د) میٹلک بانڈ
- 29- دھاتوں کو پتی چادروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یہ خاصیت کہلاتی ہے: (الف) ملیا بیٹی (ب) میسیلیٹی (ج) الف اور ب دونوں (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 30- پیریاڈک ٹیبل کے گروپ میں موجود ایلیمنٹس رکھتے ہیں: (الف) یکساں کیمیائی خصوصیات (ج) یکساں طبعی خصوصیات (ب) یکساں طبعی خصوصیات (د) مختلف کیمیائی خصوصیات
- 31- گروپ 1 کے ایلیمنٹس کے بیرونی شیل کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہے: (الف) ns^2 (ب) ns^1 (ج) $n^1s^1p^2$ (د) n^2sp^3
- 32- لیتھیم پانی کے ساتھ مسلسل ری ایکٹ کرتا ہے اور بناتا ہے: (الف) ہائیڈروآکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ (ج) ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروجن (ب) ہائیڈروآکسائیڈ اور آکسائیڈ (د) ہائیڈروآکسائیڈ اور پانی
- 33- لیتھیم کامیونٹنگ پوائنٹ ہے: (الف) $98^\circ C$ (ب) $64^\circ C$ (ج) $39^\circ C$ (د) $180^\circ C$
- 34- ہیلوجن کسی گروپ کا نام ہے: (الف) گروپ VI ایلیمنٹس (ب) گروپ 17 ایلیمنٹس (ج) گروپ 1 ایلیمنٹس (د) گروپ 2 ایلیمنٹس
- 35- تمام ہیلوجنز موجود ہوتے ہیں: (الف) ڈائی اٹامک مالیکیولز کے طور پر (ب) ٹرائی اٹامک مالیکیولز کے طور پر (ج) مونو اٹامک مالیکیولز کے طور پر (د) الف اور ب دونوں
- 36- مندرجہ ذیل میں سے یوریا کھاد بنانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ (الف) امونیا (ب) ہائیڈروجن (ج) نائٹروجن (د) آکسیجن
- 37- ہائیڈروکسائیڈ کیا تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ (الف) سلفیورک ایسڈ (ب) امونیا (ج) پانی (د) سلفر ڈائی آکسائیڈ
- 38- کوئیٹک عمل کس کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ (الف) سلفیورک ایسڈ (ب) امونیا (ج) پانی (د) کاربن ڈائی آکسائیڈ

1	ج	2	الف	3	الف	4	الف	5	ب	6	ب	7	د	8	ب	9	ب	10	د
11	الف	12	ج	13	ج	14	الف	15	ب	16	د	17	ب	18	ج	19	الف	20	ج
21	ب	22	ب	23	ج	24	الف	25	د	26	ب	27	الف	28	د	29	الف	30	الف
31	ب	32	ج	33	د	34	ب	35	الف	36	الف	37	ب	38	الف	—	—	—	—

کثیر الانتخابی مختصر سوالات

مختصر جواب دیں۔

1- آکسیڈائزنگ ایجنٹس سے کیا مراد ہے؟


جواب: آکسیڈائزنگ ایجنٹ: ایسی شے (ایٹم یا آئن) جو الیکٹرون لے کر خود کو ریڈیوس کرے آکسیڈائزنگ ایجنٹ کہلاتا ہے۔ مثلاً: Cl_2

2- ٹرانزیشن ایلیمینٹس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایسے ایلیمینٹس جن میں d یا f سب شیل تکمیل کے مرحلہ میں ہو ٹرانزیشن ایلیمینٹس کہلاتے ہیں۔ یہ ویری ایبل آکسیڈیشن سٹیٹس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلاً آئرن، کرومیم

3- امونیا کی تیاری کے لیے کون سا پروس استعمال ہوتا ہے؟ اس کی کیمیائی مساوات لکھیں۔

جواب: امونیا کی تیاری کے لیے ہیمبر پروس استعمال ہوتا ہے۔



4- امونیا کا ایک استعمال لکھیں۔

جواب: امونیا پوریا کھا دتیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

5- کیٹالیک کنورٹر سے کیا مراد ہے؟

جواب: کیٹالیک کنورٹر: یہ ایک ایسا آلہ ہے جو گاڑیوں کے اخراج میں استعمال ہوتا ہے جو انجن میں پیدا ہونے والی زیادہ نقصان دہ گیسوں کو ایسی گیسوں میں تبدیل کرتا ہے جو ماحول کو آلودہ نہیں کرتیں۔

6- ٹرانزیشن ایلیمینٹس کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیں:

جواب: ٹرانزیشن ایلیمینٹس کی خصوصیات:

(الف) یہ ویری ایبل آکسیڈیشن سٹیٹس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ (ب) یہ اکثر رنگین کمپاؤنڈز بناتے ہیں۔

7- ہیمبر کے پراس میں کون سا ایلیمینٹ بطور کیٹالسٹ استعمال ہوتا ہے؟

جواب: ہیمبر کے پراس میں آئرن بطور کیٹالسٹ استعمال ہوتا ہے۔

8- نوبل گیسز سے کیا مراد ہے؟

جواب: نوبل گیسز: جدید پیریاڈک ٹیبل کے گروپ 18 میں موجود ایلیمینٹس کو نوبل گیسز کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہیلیم۔

9- ریڈکشن کی تعریف لکھیں۔

جواب: الیکٹرونز کا حصول ریڈکشن کہلاتا ہے۔

10- ہیلوجنز سے کیا مراد ہے؟ ان کے نام لکھیں۔

جواب: پیریاڈک ٹیبل کے گروپ 17 کے ایلیمینٹس کو عام طور پر ہیلوجنز کہا جاتا ہے۔ فلورین، کلورین، برومین، آیوڈین وغیرہ۔

11- گروپ میں ہیلوجنز کی ری ایکٹیویٹی کا رجحان کیا ہے؟

جواب: ہیلوجنز کی ری ایکٹیویٹی گروپ میں نیچے کی جانب کم ہوتی ہے۔

12- ہیلیم کی الیکٹرونک کنفیگریشن لکھیں۔

جواب: ہیلیم کی الیکٹرونک کنفیگریشن $1s^2$ ہے۔

13- کوئی سی دونوں گیسز کے نام لکھیں۔

جواب: (i) ہیلیم (ii) نیون

14- سلیفورک ایسڈ کی تیاری کے لیے کون سا پروس استعمال ہوتا ہے؟

جواب: سلیفورک ایسڈ کی تیاری کے لیے کنٹیکٹ کا پروس استعمال ہوتا ہے۔

15- پیریاڈک ٹیبل کے ایک گروپ میں موجود تمام ایلیمینٹس ایک جیسی کیمیائی خصوصیات کیوں ظاہر کرتے ہیں؟


جواب: پیریاڈک ٹیبل کے ایک گروپ میں موجود تمام ایلیمینٹس ایک جیسی کیمیائی خصوصیات رکھتے ہیں کیونکہ ان میں الیکٹرونز کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔

16- گروپ 1 کے ایلیمینٹس میں اٹامک سائز کا رجحان کیا ہے؟

جواب: گروپ 1 کے ایلیمینٹس کا اٹامک سائز گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب بڑھتا ہے۔

17- آکسائیڈیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثال دیں

جواب: الیکٹرانز کا اخراج آکسائیڈیشن کہلاتا ہے۔



18- کیا الیکٹرونز میں کون سے کیا سلش استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: کنورٹ میں پلاٹینم، پیلیڈیم اور روڈیم بطور کیا سلش استعمال ہوتے ہیں۔

19- نوبل گیسز کیوں ری ایکٹو نہیں ہوتیں؟



جواب: نوبل گیسز کے ویلنس شیل میں دو یا آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کا ویلنس شیل پورا ہونے کی وجہ سے یہ مزید الیکٹرون جذب یا خارج نہیں کرتیں اس وجہ سے ان میں کیمیکل ری ایکٹیوٹی کا رجحان کم ہوتا ہے۔

20- ڈائیلیٹس سے کیا مراد ہے؟

جواب: میٹلز کو تاروں کی شکل میں کھینچا جاسکتا ہے اس خاصیت کو ڈائیلیٹس کہتے ہیں۔

21- جب ہیلوجن ہائیڈروجن کے ساتھ ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟

جواب: جب ہیلوجن ہائیڈروجن کے ساتھ ملتا ہے تو ہائیڈروجن ہیلائیڈز بناتے ہیں۔



22- ریڈیوسنگ ایجنٹس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ریڈیوسنگ ایجنٹ: ایسی شے (ایٹم یا آئن) جو الیکٹرون خارج کر کے خود کو آکسائیڈائز کرے۔ ریڈیوسنگ ایجنٹ کہلاتا ہے۔ مثلاً: تمام میٹلز

ریڈیوسنگ ایجنٹس کہلاتی ہیں

23- ٹھوس ہیلوجن کا نام لکھیں نیز اس کا رنگ بھی بتائیں۔

جواب: آئیوڈین ایک ٹھوس ہیلوجن ہے۔ آئیوڈین کی کرملز چمکدار گرے رنگ کی ہوتی ہیں جو گرم کرنے پر بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

24- میٹلز کی تعریف لکھیں۔

جواب: میٹلز وہ ایلیمینٹس ہیں جو عام طور پر کیٹائنز (پازیٹو آئنز) بناتے ہیں جیسے سوڈیم۔

25- میٹلز کے میٹلک اور بوائٹنگ پوائنٹس زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟

جواب: میٹلز کے میٹلک اور بوائٹنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں مضبوط میٹلک بانڈ موجود ہوتے ہیں۔

26- پیریاڈک ٹیبل میں کتنے فیصد ایلیمینٹس میٹلز ہیں؟ ان کی طبعی حالت کیسی ہوتی ہے؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں تقریباً 75 فیصد ایلیمینٹس میٹلز ہیں سوائے مرکری (مائع) باقی تمام میٹلز ٹھوس ہوتے ہیں۔

27- میٹل ہیلائیڈز میں کسی قسم کی بانڈنگ ہوتی ہے؟


جواب: میٹل ہیلائیڈز میں آئیونک بانڈنگ ہوتی ہے مثلاً: NaCl۔

28- ملیا پیٹی سے کیا مراد ہے؟

جواب: میٹلز کو پتلی چادروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس خاصیت کو ملیا پیٹی کہتے ہیں۔

29- سوئمنگ پول میں پانی کو کیسے سٹیر لائیڈ کیا جاتا ہے؟

جواب: سوئمنگ پول میں پانی کو کلورین سے سٹیر لائیڈ کیا جاتا ہے۔



HOCl کے ٹوٹنے سے OCl^- آئینز بنتے ہیں تو جراثیم کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔

30- نان میٹلز سے کیا مراد ہے؟

جواب: نان میٹلز: نان میٹلز وہ ایلیمینٹس ہیں جو آسانی سے آکسائیڈ (نگلیو آئنز) بناتے ہیں۔ مثلاً آکسیجن۔



31- الکی میٹلز کی ڈینسٹی کارجمان لکھیں اور اس کی وجہ بتائیں۔

جواب: اوپر سے نیچے گروپ میں الکی میٹلز کی ڈینسٹی بڑھتی ہے چونکہ گروپس میں اوپر سے نیچے کی طرف ایٹم کے ماسز اور حجم دونوں بڑھتے ہیں لیکن

چونکہ ایلیمینٹس کے ماسز میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کی ڈینسٹی میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔

32- گروپ 17 کے ایلیمینٹس کو ہیلوجنز کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: الکی اور الکلائن ارتھ میٹلز گروپ 17 کے ایلیمینٹس کے ساتھ مل کر نمک بناتی ہیں۔ اس لیے انھیں ہیلوجنز (نمک بنانے والا) کہا جاتا ہے۔



33- کیسی حالت والی نان میٹلز کی تین مثالیں لکھیں۔

جواب: آکسیجن، کلورین اور نائٹروجن نان میٹلز ہیں۔

34- جب سیزیم پانی کے ساتھ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟

جواب: جب سیزیم پانی سے ملتا ہے تو CsOH اور H_2 بنتے ہیں۔

