

باب 2 کائنی میٹکس (Kinematics)

www.ilmkidunya.com

سوال نمبر 1: میکینکس سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام کو مختصراً بیان کریں۔

جواب: میکینکس: میکینکس، فزکس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں اجسام کی حرکت اور اس حرکت کو تبدیل کرنے والی فورس (Force) کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر میکینکس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(i) کائنی میٹکس (Kinematics) (ii) ڈائنامکس (Dynamics)

(i) کائنی میٹکس: کائنی میٹکس، فورس کے حوالے کے بغیر اجسام کی حرکت کے مطالعہ کا نام ہے۔ جب کہ ڈائنامکس، فورسز اور اجسام کی حرکت پر فورسز کے اثرات کے مطالعے کا علم ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم بہت سے حرکت کرتے ہوئے اجسام کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً سڑکوں پر دوڑتی ہوئی کاریں۔ بسیں، سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز، نہروں میں بہتا ہوا پانی اور میز پر سے زمین پر گرتی ہوئی کچھ اشیا۔

(ii) ڈائنامکس: ڈائنامکس ان اجسام کی حرکت کے مطالعہ کا نام ہے جو بلحاظ یا بالحاظ اُس فورس پر منحصر ہے جو ان میں حرکت پیدا کرتی ہے یا ان کی حرکت کو تبدیل کرتی ہے۔

سوال نمبر 2: سکیلرز اور ویکٹرز مقداروں کے مابین فرق بیان کریں۔

جواب:	سکیلرز مقداریں	ویکٹرز مقداریں
تعریف:	سکیلر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جو صرف اس کی عددی مقدار کے ذریعے مکمل طور پر بیان کی جاسکتی ہے۔	تعریف: ویکٹر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اس کی عددی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی سمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
مثالیں:	ماس، فاصلہ، لمبائی، وقت، سپیڈ، انرجی، ٹمپریچر وغیرہ سکیلرز مقداریں ہیں۔	مثالیں: ویکٹر مقداروں کی مثالیں ڈس پلیسمنٹ، ولاسٹی، ایکسلریشن، وزن اور فورس ہیں۔
	سکیلر مقداروں کو عام اعداد کی طرح جمع کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر: 8 میٹر = 3 میٹر + 5 میٹر	ویکٹر مقداروں کو سکیلر مقداروں کی طرح جمع نہیں کیا جاسکتا۔ ویکٹرز کو جمع کرنے کے خاص طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں ویکٹرز کی سمتوں کو بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔
	عددی مقدار میں ایک عدد اور اس کا مناسب یونٹ شامل ہوتا ہے۔ مثلاً 5 سیکنڈ، 3 کلوگرام	سمت کے بغیر کسی ویکٹر کو بیان کرنا بے معنی ہوگا مثال کے طور پر کسی ریفرنس پوائنٹ یا حوالہ کی جگہ سے کسی مقام کا فاصلہ اس مقام کی نشاندہی کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ اس مقام کا ریفرنس پوائنٹ سمت کا علم بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔

سوال نمبر 3: ویکٹرز کے اظہار کی وضاحت کریں۔


یا **ویکٹرز کے اظہار کے طریقوں کی وضاحت کریں۔**

جواب: ویکٹرز کو ظاہر کرنے کا طریقہ (Representation of Vectors):

1- ویکٹرز کو سیدھے جلی حروف سے ظاہر کرنا: ویکٹرز کو سیدھے جلی حروف (Bold-face letters) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ A، F، v اور d وغیرہ۔ چونکہ ہم کاغذ پر جلی حروف میں نہیں لکھ سکتے لہٰذا ویکٹر کو لکھنے کے لیے حرف (Letter) کے اوپر ایک چھوٹا سا تیر کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا


کہ $\vec{v}, \vec{F}, \vec{A}$ اور $\vec{d}$ ویکٹر کی عددی قیمت ظاہر کرنے کے لیے حرف کو ٹیڑھا (Italic) لکھا جاتا ہے اور اس پر تیر کا نشان نہیں بنایا جاتا۔

2- ویکٹرز کو اشکال کے ذریعے ظاہر کرنا: اشکال کے ذریعے (Graphically) ویکٹر کو ایک سیدھی لائن سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کے ایک سرے پر تیر کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ لائن کی لمبائی ایک مناسب سکیل کے مطابق ویکٹر مقدار کی عددی قیمت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ تیر کی سمت، ویکٹر کی سمت بتاتی ہے۔



ویکٹر V مشرق سے شمال کی طرف θ زاویہ بناتے ہوئے شکل (a)

افقی لائن (x-ایکسز) اور عمودی لائن (y-ایکسز): کسی ویکٹر کی سمت ظاہر کرنے کے لیے آپس میں عمودی دو لائنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لائن ہم مشرق، مغرب کی سمتوں کے لیے اور دوسری لائن شمال، جنوب کی سمتیں ظاہر کرنے کے لیے لگاتے ہیں، جیسا کہ شکل (a) میں دکھایا گیا ہے۔ ویکٹر کی سمت ان دو لائنوں کے حوالے سے بتائی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر ہم کوئی بھی دو لائنیں استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے پر عمود ہوں۔ افقی (Horizontal) لائن (xx') کو x۔ایکسز کہلاتی ہے اور عمودی (Vertical) لائن (yy') کو y-ایکسز کہلاتی ہے جیسا کہ شکل (b) میں دکھایا گیا ہے۔




ویکٹر F، x۔ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتے ہوئے شکل (b)

نقطہ آغاز (Origin): نقطہ (Point) جہاں یہ دونوں ایکسز ملتے ہیں، نقطہ آغاز (Origin) کہلاتا ہے۔ اسے عموماً O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ایکسز عموماً حوالہ کے ایکسز (Reference axes) بھی کہلاتے ہیں۔

ویکٹر کا گرافیکلی اظہار: ''ویکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی لائن نقطہ آغاز سے مطلوبہ سمت کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ عموماً سمت کے لیے لائن کا x۔ایکسز کے ساتھ زاویہ θ (تھیٹا) بنایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ x- ایکسز کی دائیں طرف سے گھڑی مخالف (Anticlockwise) سمت میں ماپا جاتا ہے۔''

سوال نمبر 4: ہیڈ ٹو ٹیل طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز کو جمع کر کے حاصل ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں؟

جواب: حاصل ویکٹر: ہم دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز کو جمع کر کے ایک ویکٹر حاصل کر سکتے ہیں، یہ حاصل ویکٹر کہلاتا ہے۔ اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو جمع کیے جانے والے تمام ویکٹرز کا مجموعی اثر ہوگا۔ ہمیں حاصل ویکٹر کی عددی قیمت اور سمت دونوں معلوم کرنا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ سکیلرز کی جمع سے بالکل مختلف ہے۔ ویکٹرز کو جمع کرنے کے ایک طریقے کو شکل کے ذریعے اظہار گرافیکل (Graphical) کا طریقہ کیا جاتا ہے۔




شکل (a)

شکل کے ذریعے ویکٹرز کی جمع کا طریقہ: آئیے دو ویکٹرز $\vec{V}_1$ اور $\vec{V}_2$ کو جمع کریں جن کی عددی قیمتیں 300N اور 400N ہیں اور وہ x۔ایکسز کے ساتھ بالترتیب 30° اور 60° کے زاویے بناتے ہیں۔ ایک مناسب سکیل منتخب کر کے یعنی 100 N = 1cm ہم ویکٹرز بنا سکتے ہیں جیسا کہ شکل (a) میں دکھایا گیا ہے۔

ان ویکٹرز کو جمع کرنے کے لیے ہم ایک اصول پر عمل درآمد کرتے ہیں جو ہیڈ ٹو۔ٹیل رُول (Head-to-tail Rule) کہلاتا ہے اسے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔

www.ilmkidunya.com



شکل (b)

ہیڈ ٹو ٹیل رُول: ''بہت سے ویکٹرز کو جمع کرنے کے لیے اُن کی نمائندہ لائنیں اس طرح کھینچیں کہ ایک ویکٹر کا ہیڈ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ جُڑے۔ اُن کا حاصل ویکٹر ایک ایسا ویکٹر ہوگا جو کہ پہلے ویکٹر کی ٹیل سے شروع ہو کر آخری ویکٹر کے ہیڈ تک جائے گا۔''


وضاحت: حاصل ویکٹر v کو شکل (b) میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش 6.8 cm ہے۔ منتخب کی گئی سکیل کے مطابق حاصل جمع ویکٹر کی عددی قیمت 680N ہوگی اور اس کی سمت x۔ ایکسز کے ساتھ (پیمائش کیا گیا) 49^o کا زاویہ ہے۔

نوٹ: ''ہم دو سے زیادہ ویکٹرز کا حاصل ویکٹر بھی اسی طریقے سے ان کو ہیڈ ٹو۔ ٹیل رُول کے مطابق جمع کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔''

سوال نمبر 5: مثالوں کی مدد سے ریسٹ اور موشن کی تعریف کریں وضاحت کریں کہ کسی جسم کی ریسٹ کی حالت یا حرکت کی حالت مشاہدہ کرنے والے کے لحاظ سے ہے۔

جواب: **ریسٹ (Rest):** اگر کوئی شے اپنے اردگرد کے حوالے سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو یہ ریسٹ کی حالت میں کہلاتی ہے۔


مثال: جب ہم اپنے اردگرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتیں۔ مثلاً عمارتیں، درخت، بجلی کے کھمبے وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسٹ کی حالت میں ہیں۔



شکل (a)

وضاحت: فرض کریں کہ ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر کھڑا ہے (شکل a)۔ کوئی شخص (Observer) اسے دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اردگرد کی اشیا مثلاً قریبی عمارت، درخت یا کھمبے کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار ریسٹ کی حالت میں ہے۔

موشن (Motion): اگر کوئی شے اپنے اردگرد کی چیزوں کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہو تو اُسے موشن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔



شکل (a)

مثالیں: جب سوار موٹر سائیکل چلا رہا ہو (شکل b) تو مشاہدہ کرنے والا شخص دیکھے گا کہ موٹر سائیکل سوار اپنے اردگرد کی اشیا کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ تب وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار موشن (حرکت) کی حالت میں ہے۔

وضاحت: اشیا کی ریسٹ اور موشن کی حالت مشاہدہ کرنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر چلتی ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھا شخص ڈبے میں موجود دوسرے مسافروں کے لحاظ سے ریسٹ کی حالت میں ہے لیکن ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑے کسی مشاہدہ کرنے والے شخص کے لحاظ سے وہ موشن کی حالت میں ہے۔

سوال نمبر 6: موشن کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثالوں کی مدد سے وضاحت کریں۔

یا مثالوں کی مدد سے موشن کی اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: **موشن کی اقسام:** عام طور پر اجسام کی موشن کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے

www.ilmkidunya.com

(i) ٹرانسلیٹری موشن (ii) روٹیٹری موشن

(iii) وائبریٹری موشن




ٹرانسلیٹری موشن

(i) ٹرانسلیٹری موشن (Translatory Motion): اگر کسی جسم کی موشن اس طرح ہو کہ اس کا ہر ذرہ بالکل ایک جیسی حرکت کرے تو وہ ٹرانسلیٹری موشن کہلاتی ہے۔

مثال: مثال کے طور پر ایک ریل گاڑی یا کار کی موشن ٹرانسلیٹری موشن ہے۔


(ii) روٹیٹری موشن: اگر کسی جسم کا ہر ذرہ ایک نقطہ یا ایکسز کے گرد گھومے تو اس جسم کی موشن روٹیٹری موشن کہلاتی ہے۔



پنکھے کی روٹیٹری موشن

مثالیں: (a) مثال کے طور پر الیکٹرک مشین یا واشنگ مشین ڈرائر کی موشن روٹیٹری موشن ہے۔

(b) لٹو کی موشن بھی روٹیٹری موشن ہے۔



وائبریٹری موشن

(iii) وائبریٹری موشن: اگر کوئی جسم اپنی ریسٹ پوزیشن کے آگے پیچھے اپنی حرکت کو بار بار دہرائے تو ایسی حرکت وائبریٹری موشن کہلاتی ہے۔


مثلاً چلڈرن پارک کے کسی جھولے کی حرکت وائبریٹری موشن کہلاتی ہے۔

سوال نمبر 7: ٹرانسلیٹری موشن کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کی وضاحت کریں۔

جواب: ٹرانسلیٹری موشن تین طرح کی ہو سکتی ہے۔



شکل (b)




شکل (a): بے ترتیب راستہ

(i) لی نیئر موشن: اگر کوئی جسم سیدھی لائن میں حرکت کرے تو اسے لی نیئر موشن کہتے ہیں۔

مثال: لی نیئر موشن کی مثال آزادانہ گرتا ہوا جسم ہے۔

(ii) رینڈم موشن: اگر کوئی جسم بے ترتیب انداز میں حرکت کرے تو اسے رینڈم موشن کہتے ہیں۔

مثال: شہد کی مکھی کی اُڑان۔



سرکلر موشن

(iii) سرکلر موشن: کوئی جسم دائرے میں حرکت کرے تو اسے سرکلر موشن کہتے ہیں۔

مثالیں: (i) اگر کسی ڈوری کے ایک سرے پر بندھے گیند کو گھمائیں تو وہ ایک دائرے میں حرکت کرے گا۔


(b) فیرس وہیل (Ferris Wheel) کی حرکت بھی سرکلر موشن ہے۔

سوال نمبر 8: فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ میں فرق بیان کریں۔

جواب:

فاصلہ	ڈس پلیسمنٹ
(i) فاصلہ اصل میں طے کیے گئے راستہ کی لمبائی ہے۔	(i) ڈس پلیسمنٹ جسم کی حرکت کے دوران ابتدائی پوزیشن سے آخری پوزیشن تک کم سے کم فاصلہ ہے۔
(ii) اسے معلوم کرنے کے لیے دیا گیا فارمولا استعمال کرتے ہیں۔ $S = v \times t$	(ii) اسے معلوم کرنے کے لیے دیا گیا فارمولا استعمال کرتے ہیں۔ $d = v \times t$

www.ilmkidunya.com

(iii) یہ ایک سکیلر مقدار ہے کیونکہ اسے ظاہر کرنے کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔	(iii) یہ ایک ویکٹر مقدار ہے کیونکہ اسے ظاہر کرنے کے لیے عددی قیمت کے ساتھ سمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
(iv) اس کا یونٹ میٹر (m) ہے۔	(iv) اس کا یونٹ میٹر (m) ہوتا ہے۔
مثال: فرض کریں ایک شخص کار کے ذریعے لاہور سے ملتان کے لیے سفر کر رہا ہے۔ ملتان پہنچ کر وہ میٹر کی ریڈنگ دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ اُس نے 320 کلومیٹر فاصلہ طے کیا ہے۔ یہ اس شخص کا اصل میں طے کردہ فاصلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لاہور سے ملتان تک کا کم سے کم فاصلہ نہیں ہے کیونکہ راستے میں کار نے کئی موڑ مڑے ہیں۔ اُس نے ایک سیدھی لائن میں سفر طے نہیں کیا ہے۔	مثال: فرض کریں ایک کار پوزیشن A سے B تک سفر کرتی ہے۔ منحنی لائن کار کا طے کردہ اصل راستہ ہے۔ کار کا طے کردہ کل فاصلہ منحنی لائن AB کی لمبائی کے برابر ہے۔ ڈِس پلیسمنٹ (d)، A سے لے کر B تک سیدھی لائن AB ہے جس کے سرے پر تیر کا نشان بنایا گیا ہے۔ 

سوال نمبر 9: سپیڈ کی تعریف کریں۔ مثالیں دیں۔ اس کا فارمولا اور یونٹ بھی لکھیں۔

جواب: سپیڈ: اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ سپیڈ کہلاتا ہے۔ اکائی وقت ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ ایک دن اور ایک سال بھی ہو سکتا ہے۔

مثالیں: چیتا 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے دوڑتا ہے۔

سیل فش بھی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے تیرتی ہے۔

فارمولا: سپیڈ کو مندرجہ ذیل فارمولا سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{سپیڈ} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{وقت}}$$

$$v = \frac{S}{t}$$

یا $S = vt$

سپیڈ ایک سکیلر مقدار ہے کیونکہ اس کے اظہار کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔

یونٹ: سپیڈ کا SI یونٹ ms^{-1} یا kmh^{-1} ہے۔

لمحاتی سپیڈ اور اوسط سپیڈ (Instantaneous Speed and Average Speeed): یقیناً کسی گاڑی کی سپیڈ تمام سفر کے دوران میں ایکساں (constant) نہیں رہتی۔ اگر سپیڈ میٹر کی ریڈنگ دیکھتے ہیں تو یہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ کسی بھی لمحے کسی گاڑی کی سپیڈ جو اس کا سپیڈ میٹر ظاہر کرتا ہے، اس کی لمحاتی سپیڈ (Instantaneous Speed) کہلاتی ہے۔ عملی طور پر ہم اوسط سپیڈ ہی استعمال کرتے ہیں، جس کی تعریف یوں ہے:

$$\text{اوسط سپیڈ} = \frac{\text{کل طے کردہ فاصلہ}}{\text{کل وقت}}$$

یا $v_{av} = \frac{S}{t}$

سوال نمبر 10: ویری ایبل سپیڈ اور یونیفارم سپیڈ کی تعریف کریں مثالیں بھی دیں۔

جواب: ویری ایبل سپیڈ: ایک جسم ویری ایبل سپیڈ سے حرکت کرتا ہے۔ اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کا طے کردہ فاصلہ غیر مساوی ہو۔ خواہ یہ

www.ilmkidunya.com

وقفے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں۔

مثال: فرض کیا ایک جسم 2 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں طے کرتا ہے اور وہ دوبارہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ جسم مساوی فاصلہ وقت کے غیر مساوی وقفوں میں طے کرتا ہے لہٰذا اس کی سپیڈ ویری ایبل ہے۔


یونیفارم سپیڈ: ایک جسم یونیفارم سپیڈ سے حرکت کرتا ہے اگر وہ وقت کے مساوی وقفوں میں مساوی فاصلہ طے کرے خواہ وہ وقفے کتنے ہی مختص کیوں نہ ہوں۔

مثال: فرض کیا ایک جسم 2 کلومیٹر کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے کرتا ہے اور مزید 2 کلومیٹر کا فاصلہ بھی آدھے گھنٹے میں طے کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جسم مساوی فاصلہ وقت کے مساوی وقفوں میں طے کرتا ہے لہٰذا اس کی سپیڈ یونیفارم ہوتی ہے۔

سوال نمبر 11: ولاسٹی کی تعریف کریں۔ مختصراً وضاحت کریں۔ اس کا فارمولا اور یونٹ لکھیں۔

جواب: ولاسٹی: کسی جسم کی ایک یونٹ ٹائم (ایک سیکنڈ) میں کل ڈس پلیسمنٹ کو ولاسٹی کہتے ہیں۔

وضاحت: اگر کوئی جسم کسی منحنی راستے کے ذریعے نقطہ A سے نقطہ B تک جاتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے تو اس کی کل ڈس پلیسمنٹ d سیدھی لائن AB ہے۔



فارمولا:

$$\text{اوسط ولاسٹی} = \frac{\text{ڈس پلیسمنٹ}}{\text{کل وقت}} \quad \text{یا} \quad V_{av} = \frac{d}{t} \quad \ldots\ldots(i)$$

ویکٹر مقدار: ولاسٹی v ایک ویکٹر مقدار ہے۔ مساوات 1 ظاہر کرتی ہے کہ ولاسٹی کی سمت وہی ہوگی جو کہ ڈس پلیسمنٹ d کی ہے۔

یونٹ: ولاسٹی کا SI یونٹ ms^{-1} یا kmh^{-1} ہے۔

مثال: ایک کار کی مثال لے لیں جو کہ $70\ km\ h^{-1}$ کی سے شمال کی طرف جا رہی ہے۔ سپیڈ اور ولاسٹی میں فرق واضح کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ کار کی سپیڈ جو کہ $70\ km\ h^{-1}$ ہے۔ جو کہ سکیلر مقدار ہے۔ کار کی ولاسٹی ویکٹر مقدار ہے جس کی عددی قیمت $70\ km\ h^{-1}$ ہے اور اس کی سمت شمال کی طرف ہے۔

سوال نمبر 12: یکساں اور غیر یکساں ولاسٹی کی وضاحت کریں۔

جواب: یکساں ولاسٹی: اگر متحرک جسم کی سپیڈ اور سمت تبدیل نہ ہو تو اس کی ولاسٹی یکساں ولاسٹی کہلاتی ہے۔

مثال: یکساں ولاسٹی سے حرکت کرنے والے جسم کی ایک اچھی مثال چھاتہ بردار (Paratrooper) کی نیچے کی طرف موشن ہے۔ جب ایک چھاتہ بردار ہوائی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ چند لمحے آزادانہ نیچے گرتا ہے۔ تب پیراشوٹ کھل جاتا ہے۔ اس مرحلے میں چھاتہ بردار پر نیچے کی طرف عمل کرنے والی فورس آف گریویٹی (Force of Gravity) کو چھاتہ بردار پر لگنے والی اوپر کی طرف ہوا کی مزاحمت متوازن کر دیتی ہے۔ نتیجتاً چھاتہ بردار یکساں ولاسٹی کے ساتھ نیچے حرکت کرتا ہے۔

غیر یکساں ولاسٹی: اگر کسی متحرک جسم کی سپیڈ یا سمت یا پھر دونوں تبدیل ہو تو اس کی ولاسٹی کو متغیر یا غیر یکساں ولاسٹی کہتے ہیں۔

مثال: عملی طور پر کوئی گاڑی اپنے تمام سفر کے دوران سیدھی لائن میں نہیں چلتی۔ اس کی سپیڈ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

سوال نمبر 13: ایکسلریشن کی تعریف کریں۔ ایک مثال دیں۔ اس کا فارمولا اور یونٹ لکھیں۔

جواب: ایکسلریشن: وقت کے ساتھ کسی جسم کی ولاسٹی میں تبدیلی کی شرح کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔

وضاحت: ولاسٹی میں یہ تبدیلی اس کی عددی قیمت یا سمت یا پھر دونوں میں ہے۔ جب کسی شے کی ولاسٹی بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شے ایکسلریشن

www.ilmkidunya.com

کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہے۔


جب کسی شے کی ولاسٹی کم ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شے ولاسٹی اور ایکسلریشن کے مخالف حرکت کر رہی ہے۔

فارمولا: ایکسلریشن کو مندرجہ ذیل فارمولے کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{ایکسلریشن} = \frac{\text{ولاسٹی میں تبدیلی}}{\text{وقت}}$$

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$



اوور ٹیکنگ کرتے ہوئے کار اپنی ولاسٹی کو بڑھاتی ہے

یونٹ: ایکسلریشن کا SI یونٹ میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ (ms^{-2}) ہے۔

ویکٹر مقدار: ولاسٹی کی طرح ایکسلریشن بھی ایک ویکٹر مقدار ہے۔

سوال نمبر 14: یکساں ایکسلریشن اور غیر یکساں ایکسلریشن کی وضاحت کریں۔ نیز مثبت ایکسلریشن اور منفی ایکسلریشن کی تعریف کریں۔

جواب: **یکساں ایکسلریشن:** اگر وقت کے برابر وقفوں میں ولاسٹی میں تبدیلی ایک ہی جتنی ہو تو اس صورت میں ایکسلریشن کو یکساں ایکسلریشن کہتے ہیں۔

غیر یکساں ایکسلریشن: اگر وقت کے برابر وقفوں میں ولاسٹی میں تبدیلی یکساں نہ ہو تو اس صورت میں ایکسلریشن کو غیر یکساں ایکسلریشن کہتے ہیں۔

وضاحت: ولاسٹی میں یہ تبدیلی عددی قیمت یا سمت یا پھر دونوں میں ہو سکتی ہے۔

اگر ایکسلریشن 'a' یکساں ہو تو مساوات یوں ہوگی۔ $v_f = v_i + at$

مثبت ایکسلریشن: اگر ولاسٹی بڑھ رہی ہو ایکسلریشن مثبت ہوگا۔ مثبت ایکسلریشن کی سمت وہی ہوتی ہے جس سمت میں جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے۔

منفی ایکسلریشن: اگر ولاسٹی کم ہو رہی ہو تو ایکسلریشن منفی ہوگا۔ منفی ایکسلریشن، ڈی سیلریشن (Deceleration) یا ریٹارڈیشن (Retardation) بھی کہلاتا ہے۔ منفی ایکسلریشن کی سمت مخالف ہوتی ہے جس سمت میں جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے۔

سوال نمبر 15: مندرجہ ذیل کی تعریف کریں۔

(i) گراف (ii) ویری ایبلز (iii) منحصر متغیر مقدار

(iv) غیر منحصر متغیر مقدار (v) ایکسز (vi) آغاز نقطہ

جواب: (i) **گراف (Graph):** گراف دو طبیعی مقداروں کے تعلق کو تصویری شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ عموماً سیدھی یا گولائی والی لائن کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم ایک ایسے کاغذ پر گراف کھینچتے ہیں جس پر برابر فاصلے سے افقی اور عمودی لائنیں کھینچی ہوتی ہیں۔ گراف پیپر پر عموماً ہر دسویں لائن موٹی ہوتی ہے۔

(ii) **ویری ایبلز (Variables):** وہ مقداریں جن کے مابین گراف بنایا جاتا ہے ویری ایبلز کہلاتی ہیں۔


اقسام: ویری ایبلز کی دو اقسام ہیں۔ (a) منحصر متغیر مقدار (b) غیر منحصر متغیر مقدار

(iii) **منحصر متغیر مقدار (Dependent Variables):** وہ مقدار جو y-ایکسز کے ساتھ لی جاتی ہیں منحصر متغیر مقدار ہوتی ہیں۔

(iv) **غیر منحصر متغیر مقدار (Dependent Variable):** وہ مقدار جو x-ایکسز کے ساتھ لی جاتی ہیں غیر منحصر مقدار کہلاتی ہیں۔

مثال: مثال کے طور پر فاصلہ۔ وقت کے گراف (Distance Time Graph) میں t غیر منحصر اور S اُس پر منحصر متغیر مقدار ہے۔ اس لیے t کو x-ایکسز کے ساتھ اور S کو y-ایکسز کے ساتھ لیا جائے گا۔

www.ilmkidunya.com



(v) ایکسز (Axes): گراف بنانے کے لیے ایک دوسرے پر عموداً دو موٹی لائنیں 'xox اور 'yoy منتخب کر لی جاتی ہیں۔ ان کو ایکسز (Axes) کہا جاتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

(vi) نقطہ آغاز (Origin): جہاں یہ دو ایکسز ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس نقطے کو نقطہ آغاز "O" (origin) کہتے ہیں۔

x-ایکسز کے ساتھ مثبت قیمتیں نقطہ آغاز کے دائیں طرف لی جاتی ہیں جبکہ منفی قیمتیں بائیں طرف لی جاتی ہیں۔

اسی طرح y-ایکسز کے ساتھ مثبت قیمتیں نقطہ آغاز سے اوپر کی طرف اور منفی قیمتیں نیچے کی طرف لے جاتی ہیں۔

سوال نمبر 16: (الف) فاصلہ اور وقت کے مابین گراف کیسے بنایا جاتا ہے؟ اسے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

(ب) فاصلہ اور وقت کے مابین گراف بنائیں جب:

(i) جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہو۔ (ii) جب جسم ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔


(iii) جب جسم منفی ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔ (iv) جب جسم ریسٹ کی حالت میں ہو۔

جواب: (الف) فاصلہ اور وقت کے مابین گراف: فاصلہ اور وقت کے مابین گراف، حرکت کرنے والے جسم کا طے کردہ فاصلہ S اور صرف شدہ وقت t میں تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔

(ب) (i) جب جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہو: مثلاً موٹر وے پر ایک کار سیدھی لائن میں چل رہی ہے۔ فرض کریں کہ اس کے آغاز سے ہر ایک منٹ کے بعد ہم اس کا طے کردہ فاصلہ نوٹ کرتے ہیں اور اسے نیچے دیے گئے ٹیبل میں درج کرتے ہیں۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0

سینٹی میٹر والے گراف پیپر پر گراف بنانے کے لیے درج ذیل ترتیب پر عمل کریں۔



1- وقت 't' x-ایکسز کے ساتھ لیں اور فاصلہ 'S' y-ایکسز کے ساتھ لیں۔

2- مناسب سکیل منتخب کریں۔ (1=1cm منٹ) x-ایکسز کے ساتھ اور (1.2 km = 1cm) y-ایکسز کے ساتھ۔

3- سکیل کے مطابق بڑے خانوں (Divisions) کے بالمقابل x-ایکسز اور y-ایکسز پر قیمتیں درج کریں۔

4- وقت اور فاصلہ کے متعلقہ جوڑوں کو ایک نقطے کی شکل میں گراف پیپر پر ظاہر کریں۔

5- تمام نقاط کو سیدھی لائن کھینچیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔


ٹیبل کے مشاہدہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کار نے وقت کے برابر وقفوں میں برابر فاصلے طے کیے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کار یکساں سپیڈ سے چل رہی ہے۔ لہٰذا وقت اور فاصلہ کے مابین سیدھی لائن کی شکل کا گراف یکساں سپیڈ سے حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔

www.ilmkidunya.com

(ii) جب جسم ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: اب کار کے ایک اور سفر کو زیرِ غور لائیں جو نیچے ٹیبل میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	2.40	0.960	2.160	3.840	6.000


ٹیبل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وقت کے برابر وقفوں میں سپیڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شکل میں بنائے گئے گراف سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ گراف کی لائن اوپر کی طرف کو مڑتی جا رہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جب جسم (کار) ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔



(iii) جب جسم منفی ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: ایک اور سفر دیکھیں۔ اس سفر کے مشاہدات نیچے ٹیبل میں درج ہیں۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	2.0	3.1	4.0	4.6	5.0

گراف لائن نیچے کی طرف مُڑتی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر دفعہ اتنے ہی وقفہ میں طے کردہ فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ ڈی سیلریشن یا منفی ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کی صورت حال ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔




(iv) جب جسم ریسٹ کی حالت میں ہو: اب ایک اور صورت حال ملاحظہ کریں۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

www.ilmkidunya.com

اس صورت حال میں گراف لائن افقی ہے (شکل)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کار کا طے کردہ فاصلہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کار حرکت نہیں کر رہی۔ یہ ریسٹ کی حالت میں ہے۔



سوال نمبر 16: فاصلہ۔وقت گراف کے گریڈیئنٹ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: فاصلہ۔وقت گراف کا گریڈیئنٹ: فاصلہ۔وقت گراف کا گریڈیئنٹ جسم کی اوسط سپیڈ کے برابر ہوتا ہے۔ گریڈیئنٹ کسی لائن کے سلوپ (Slope) کی پیمائش ہے۔

وضاحت: یکساں سپیڈ کا فاصلہ۔وقت کا گراف دوبارہ زیرِغور لائیں۔ اس پر وقت کی کوئی دو قیمتیں t_1 اور t_2 منتخب کریں۔ ان t_1 اور t_2 نقاط سے x۔ ایکسز سے گراف تک غیر مسلسل (dotted) دو عمودی لائنیں کھینچیں۔

یہ لائنیں گراف پر نقاط P اور Q پر ملتی ہیں۔ ان نقاط سے دو افقی لائنیں کھینچیں y۔ ایکسز کو بالترتیب S_1 اور S_2 نقاط پر ملتی ہیں، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس وقت کے دورانیے میں طے کردہ فاصلہ $S_2 - S_1 = S$ وقت کا دورانیہ $t_2 - t_1 = t$


گراف کا سلوپ یا گریڈیئنٹ، مثلث POR کے tangent θ کی پیمائش ہے۔

$$\text{سلوپ} = \frac{RQ}{PR}$$

$$\text{سلوپ} = \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1} = \frac{S}{t}$$

اوسط سپیڈ کی تعریف کے مطابق $v_{av} = \frac{S}{t}$

شکل ظاہر کرتی ہے کہ: گراف لائن کا سلوپ $= \frac{S}{t} = \tan\theta$



www.ilmkidunya.com

لہٰذا، "فاصلہ۔وقت گراف کا گریڈیئنٹ جسم کی اوسط سپیڈ کے برابر ہوتا ہے"۔

سوال نمبر 18: مندرجہ ذیل کے لیے سپیڈ۔وقت گراف کی وضاحت کریں۔


(i) جب جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔ (ii) جب جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔

جواب: سپیڈ وقت گراف میں وقت کو x۔ایکسز کے ساتھ جبکہ سپیڈ کو y۔ایکسز کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔

(i) جب جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: فرض کریں کہ ہم کسی کار کی سپیڈ ہر ایک سیکنڈ کے بعد نوٹ کر سکتے ہیں اور اسے نیچے ٹیبل میں درج کرتے ہیں۔ہم سپیڈ v اور وقت t کے مابین گراف بنا سکتے ہیں۔یہ سپیڈ۔وقت گراف کہلاتا ہے۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
سپیڈ v ($m\ s^{-1}$)	0	8	16	24	32	40


t کو x۔ایکسز کے ساتھ اور v کو y۔ایکسز کے ساتھ لیں۔یہ سکیل منتخب کی جا سکتی ہے۔1 s = 1 cm ، x۔ایکسز کے ساتھ اور 8 ms^{-1} = 1cm ، y۔ایکسز کے ساتھ گراف کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔یہ گراف اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی سیدھی لائن ہے۔اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد سپیڈ اتنی ہی مقدار میں بڑھتی ہے۔یہ یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت ہے۔ٹیبل سے بھی یہی مشاہدہ ہوتا ہے۔



(ii) جب جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو:

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
سپیڈ v ($m\ s^{-1}$)	20	20	20	20	20	20

اس صورت حال میں گراف افقی لائن ہے (شکل)۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ سپیڈ تبدیل نہیں ہو رہی۔یہ یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت ہے۔



www.ilmkidunya.com

سوال نمبر 19: سپیڈ۔وقت گراف کا گریڈیئنٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وضاحت کریں۔

(i) جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔ (ii) جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔

جواب: سپیڈ بمقابلہ وقت گراف کا گریڈیئنٹ جسم کے اوسط ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے۔

گریڈیئنٹ: گریڈیئنٹ کسی لائن کی سلوپ کی پیمائش ہے۔

(i) جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: اب سپیڈ۔وقت کے گراف کو دیکھیں جو شکل (a) میں بنایا گیا ہے۔ وقت t_1 اور t_2 پر بالترتیب ولاسٹی v_1 اور v_2 ہے۔ وقت کے دورانیہ (t_2-t_1) میں سپیڈ میں تبدیلی (v_2-v_1) ہے۔

اس لیے:

$$\text{سلوپ} = \frac{\text{سپیڈ میں تبدیلی}}{\text{کل وقت کا دورانیہ}}$$


یا

$$\text{سلوپ} = \frac{(v_2 - v_1)}{(t_2 - t_1)}$$

$$\text{سلوپ} = \frac{\Delta t}{t}$$

لیکن $\frac{\Delta t}{t} = a$ اوسط ایکسلریشن


لہٰذا ''سپیڈ بمقابلہ گراف کا گریڈیئنٹ جسم کے اوسط ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے''۔



شکل (a)

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک کار یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو اس کا سپیڈ۔وقت گراف ایک سیدھی لائن ہوتی ہے جو وقت کے برابر وقفوں میں ہر دفعہ اتنی ہی بلندی تک اونچی ہوتی جاتی ہے۔

(ii) جب جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: گراف، شکل میں بنایا گیا ہے۔ وقت t_1 پر سپیڈ v_1 اتنی ہی ہے جتنی وقت t_2 پر سپیڈ v_2 ہے۔ لہٰذا سپیڈ میں تبدیلی صفر ہے۔



چونکہ $v_2 - v_1 = 0$ اس لیے $\text{سلوپ} = \frac{(v_2 - v_2)}{(t_2 - t_1)} = 0$

جب کسی جسم کی سپیڈ یکساں ہو تو سپیڈ۔وقت کا گراف ایک افقی لائن ہوتی ہے جو کہ وقت کے ایکسز کے متوازی ہوتی ہے شکل (b)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حرکت کا ایکسلریشن صفر ہے۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جس میں سپیڈ تبدیل نہیں ہوتی۔

سوال نمبر 20: سپیڈ۔وقت گراف کے نیچے رقبہ معلوم کرنے کے لیے مثالوں سے وضاحت کریں۔


جواب: تعریف: سپیڈ۔وقت کے گراف کے نیچے وقت کے ایکسز تک کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔

سپیڈ۔وقت گراف سے کسی جسم کا طے کردہ فاصلہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔

گراف: سپیڈ۔وقت کے گراف میں سپیڈ v کو y۔ایکسز کے ساتھ جبکہ وقت 't' کو x۔ایکسز کے ساتھ لیں گے۔

www.ilmkidunya.com


مثال 1: مثال کے طور پر شکل (a) میں گراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔ وقت کے دورانیہ میں جسم کا طے کردہ فاصلہ مساوات $S = v \times t$ ہے۔



شکل (a)

یہ فاصلہ سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے رقبہ نکال کر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔

گراف کے نیچے رقبہ وقت کے دورانیہ t کے لیے ایک مستطیل کے رقبہ کے برابر ہوگا جس کے اضلاع t اور v ہوں۔ شکل میں رقبہ شیڈ شدہ دکھایا گیا ہے جو کہ $v \times t$ کے برابر ہے۔ لہٰذا سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے وقت کے ایکسز (x۔ایکسز) تک کا رقبہ عددی طور پر وقت کے دورانیہ میں جسم کے طے کردہ فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔



شکل (b)

مثال 2: اب ایک اور گراف کی مثال لیتے ہیں جو شکل (b) میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں جسم کی سپیڈ وقت کے دورانیہ میں یکساں طور پر بڑھتی ہوئی صفر سے v تک جاتی ہے۔

اوسط سپیڈ یہ ہوگی:

$$v_{av} = \frac{0+v}{2} = \frac{1}{2}v$$

طے کردہ فاصلہ = اوسط سپیڈ × وقت کا دورانیہ $= 1/2\ v \times t$

اگر ہم سپیڈ۔ وقت کے گراف کے نیچے رقبہ معلوم کریں تو شکل (b) کے مطابق یہ قائمۃ الزاویہ مثلث OAB کے رقبہ کے برابر ہے جسے شیڈ شدہ دکھایا گیا ہے۔ مثلث کا قاعدہ t کے برابر ہے اور عمود y کے برابر ہے۔

مثلث کا رقبہ $= 1/2$ (عمود × قاعدہ)

$= 1/2\ (v \times t)$

"اسطرح یہ رقبہ عددی طور پر وقت کے دورانیہ میں جسم کے طے کردہ فاصلے کے برابر ہے"۔

سوال نمبر 21: گریویٹی کے تحت حرکت سے متعلق حسابی سوالات حل کرنے کی وضاحت کریں۔ نیز ان مساواتوں میں استعمال ہونے والے چند اہم نکات بیان کریں۔

جواب: گریویٹی کے تحت حرکت سے متعلق حسابی سوالات حل کرنا: اجسام کی حرکت سے متعلق حسابی سوالات حل کرنے کے لیے تین مساوات استعمال کی جاتی ہیں۔

وضاحت: اگر v_i جسم کی ابتدائی ولاسٹی، v_f اس کی آخری ولاسٹی، t وقت کا دورانیہ، S طے کردہ فاصلہ اور 'a' ایکسلریشن ہو تو:

$$v_f = v_i + at \quad \text{_____} \quad (1)$$

$$S = v_i t + \frac{1}{2}at^2 \quad \text{_____} \quad (2)$$

$$2aS = v_f^2 - v_i^2 \quad \text{_____} \quad (3)$$

اہم نکات: جب ان مساوات کو استعمال کیا جاتا ہے تو:

(i) حرکت ہمیشہ سیدھی لائن میں تصور کی جاتی ہے۔ (ii) ایکسلریشن کو یکساں تصور کیا جاتا ہے۔

(iii) ویکٹر مقداروں کی صرف عددی قیمتیں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔

www.ilmkidunya.com

(iv) ابتدائی ولاسٹی کی سمت کو مثبت رکھا جاتا ہے۔ دوسری مقداریں جو ابتدائی ولاسٹی کی سمت میں ہوں، ان کو بھی مثبت رکھا جاتا ہے۔ جو مقداریں، ابتدائی ولاسٹی کی سمت کے مخالف سمت میں ہوں، ان کو منفی رکھا جاتا ہے۔

سوال نمبر22: گریوی ٹیشنل ایکسلریشن کی تعریف کریں؟ گریویٹی کے تحت حرکت کرتے ہوئے اجسام کے لیے حرکت کی مساواتیں لکھیں۔

جواب: گریوی ٹیشنل ایکسلریشن: جب کوئی جسم زمین کی گریویٹی کے زیر اثر آزادانہ نیچے گرتا ہے تو اس پر عمل کرنے والا ایکسلریشن، گریوی ٹیشنل ایکسلریشن ہوتا ہے جسے g سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ گریوی ٹیشنل ایکسلریشن کی سمت ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتی ہے۔

قیمت (Value): اس کی عددی قیمت $9.8ms^{-2}$ ہوتی ہے لیکن آسانی کے لیے ہم g کی عددی قیمت $10ms^{-2}$ استعمال کریں گے۔

گریویٹی کے زیر اثر حرکت کرتے ہوئے اجسام کے لیے حرکت کی مساواتیں: چونکہ آزادانہ گرنے والی اشیا یکساں ایکسلریشن g کے ساتھ نیچے کی طرف سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہیں اس لیے ایسی اشیا پر حرکت کی تینوں مساوات کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ حرکت کی مساوات استعمال کرتے ہوئے ایک ایکسلریشن a کی جگہ g لکھا جاتا ہے۔ اس طرح آزادانہ گرتی ہوئی اشیا کے لیے حرکت کی مساوات یوں لکھی جائیں گی:

$$v_f = v_i + gt \quad \text{_____} \quad (1)$$

$$S = v_i t + \frac{1}{2} gt^2 \quad \text{_____} \quad (2)$$

$$2gS = v_f^2 - v_i^2 \quad \text{_____} \quad (3)$$

اہم اصول: یاد رکھیں کہ ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے:

(i) اگر کوئی شے کسی بلندی سے آزادانہ گرنے کے لیے چھوڑی جاتی ہے تو اس کی ابتدائی ولاسٹی v_i کو صفر رکھا جائے گا۔

(ii) نیچے کی سمت گرتے ہوئے گریوی ٹیشنل ایکسلریشن g کو مثبت رکھا جائے گا۔ دیگر تمام نیچے کی سمت والی مقداریں بھی مثبت رکھی جائیں گی۔ جو مقداریں ایکسلریشن کے مخالف سمت میں ہوں گی انھیں منفی رکھا جائے گا۔

(iii) اگر کوئی شے عموداً اوپر کی طرف پھینکی جائے تو اس کے لیے g کی عددی قیمت منفی ہوگی اور بلند ترین نقطہ پر اس کی آخری ولاسٹی صفر لی جائے گی۔

سوال23: سپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کیا ہے؟ مختصر اوضاحت کریں۔

جواب: سپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی (نظریہ اضافیت) Relativity: 1905ء میں معروف سائنسدان البرٹ آئن سٹائن نے ایک انقلابی تھیوری پیش کی جسے سپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کہتے ہیں جس نے فزکس سے متعلق بہت سے بنیادی نظریات کو بدل دیا۔

روشنی کی سپیڈ: اس تھیوری کے مطابق روشنی کی سپیڈ یونیورسل کونسٹنٹ (Constant) ہے۔

قیمت: اس کی عددی قیمت قریباً $3 \times 10^8 ms^{-1}$ ہے۔ تمام قسم کی حرکات کے لحاظ سے روشنی کی سپیڈ اتنی ہی رہتی ہے۔

یونیورسل سپیڈ لمٹ: کسی بھی ماس رکھنے والی شے کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ کے برابر یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اسے یونیورسل سپیڈ لمٹ (limit) کہا جاتا ہے۔

www.ilmkidunya.com

اہم سوالات

آپ کی معلومات کے لیے

سوال 1: جغرافیائی حوالہ اور کارڈیشن کوارڈی نیٹ سسٹم میں کیا فرق ہے؟

جواب: جغرافیائی سمت کے لیے حوالہ کی لائن شمالاً، جنوباً ہوتی ہے جبکہ کارٹیشن کوآرڈینیٹ سسٹم میں پازیٹو x۔ایکسز کا حوالہ استعمال کیا جاتا ہے۔



سوال 2: سینٹ ہیلنز آتش فشاں پھٹنے سے چٹانیں کتنی سپیڈ سے اُڑی تھیں۔

جواب: 1980ء میں سینٹ ہیلنز آتش فشاں پھٹا تھا تو کئی چٹانیں $400\ kmh^{-1}$ کی سپیڈ سے اُڑی تھیں۔



سوال 3: موٹروے پر ٹریفک جام کی ٹائم لیپس فوٹو میں ولاسٹی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟

جواب: موٹروے ٹریفک جام کی ٹائم لیپس فوٹو میں کاروں کی ولاسٹی سیدھی لائنوں میں ظاہر ہو رہی ہے۔ سفید لائنیں ہیڈ لائٹس اور سرخ لائنیں ان گاڑیوں کی پچھلی لائٹس کی ہیں جو مخالف سمت میں جا رہی ہیں۔



سوال 4: ہوا کی غیر موجودگی میں تمام اشیاء نیچے کی طرف برابر وقت میں ایک جتنا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ کیوں؟


جواب: ہلکے اور بھاری اجسام جب خلا (Vacuum) میں گرتے ہیں تو دونوں ساتھ ساتھ ہی گرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی حرکت پر ہوا کی فرکشن اثر انداز نہیں ہوتی۔

سوال 5: آزادانہ گرنے والے اجسام کا ایکسلریشن کتنا ہوتا ہے؟

جواب: آزادانہ کرنے کا ایکسلریشن g تمام اشیاء کے لیے 10 ms^{-2} ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟






سوال: زمین پر تیز ترین جانور اور مچھلی کونسی ہے؟

جواب: زمین پر تیز ترین دودھ پلانے والا جانور (چیتا) اور تیز ترین مچھلی (سیل فش) دونوں کی ریکارڈ شدہ تیز ترین رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔

دماغ لڑائیے!



سوال: گول گھومتی سڑک پر دوڑتی کار کی سپیڈ یکساں ہوتی ہے۔ لیکن اس کی ولاسٹی ہر لمحہ بدل رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟

جواب: کیونکہ گول گھومتی سڑک پر دوڑتی کار کی سمت ہر لمحہ بدل رہی ہوتی ہے۔


دلچسپ فوٹوگرافی

سوال: آزادانہ نیچے کی طرف گرتے ہوئے سیب کے ایکسلریشن کو کیمرے سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟

جواب: یہ ایک گرتے ہوئے سیب کی تصویر ہے جو کچھ بلندی سے گرایا گیا ہے۔ سب کی تصاویر جس کیمرے سے لی گئیں وہ ایک سیکنڈ میں 60 فلیش لیتا تھا۔ نیچے آتے ہوئے درمیانی بڑھتی ہوئی خالی جگہ سیب کے ایکسلریشن کو ظاہر کرتی ہے۔

www.ilmkidunya.com

مختصر مشق



فاصلہ۔وقت یا گراف تین سائیکل سواروں کی حرکت کو ظاہر کر رہا ہے۔

(1) گراف میں ہر ایک لائن کیا ظاہر کر رہی ہے؟

جواب: ہر لائن سائیکلسٹ کی حرکت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر لائن کی ڈھلوان لائن کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے

(2) کونسے سائیکل سوار نے سے سے زیادہ فاصلہ طے کیا ہے؟

جواب: سائیکلسٹ 'A' سب سے زیادہ فاصلے پر سفر کرتا ہے، کیونکہ اس کی لکیر فاصلے کے محور کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی سلوپ بھی زیادہ ہے۔

(3) کس سائیکل سوار نے سب سے زیادہ سپیڈ سے اور کنے سب سے کم سپیڈ سے فاصلہ طے کیا ہے؟

جواب: سائیکلسٹ 'A' میں سب سے بڑی رفتار ہے۔ سائیکلسٹ 'B' میں مستقل رفتار ہوتی ہے۔ سائیکلسٹ 'C' کی رفتار سب سے کم ہے کیونکہ اس نے کم فاصلہ طے کیا ہے اور اس کی سلوپ بھی کم ہے۔

اہم نکات

- سکیلر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جسے صرف عددی قیمت بتا کر مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔
- ویکٹر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اس کی عددی قیمت کے ساتھ ساتھ اس کی سمت بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔
- بہت سے ویکٹر کو جمع کرنے کے لیے ان کی نمائندہ لائنیں اس طرح کھینچیں کہ ایک کا ہیڈ دوسرے کی ٹیل سے ملے۔ حاصل جمع ویکٹر ایک ایسا ویکٹر ہوگا جو پہلے ویکٹر کی ٹیل سے شروع ہو کر آخری ویکٹر کے ہیڈ تک جاتا ہو۔
- ٹرانسلیٹری موشن، روٹیٹری موشن اور وائبریٹری موشن، موشن کی مختلف اقسام ہیں۔
- کسی جسم کی پوزیشن ایک مقام سے اس کا فاصلہ اور سمت ہے۔
- ابتدائی اور آخری پوزیشن کے درمیان کم از کم فاصلہ اس کی ڈس پلیسمنٹ کہلاتی ہے۔
- ایک سیکنڈ وقت میں کسی جسم کا طے کردہ فاصلہ اس کی سپیڈ کہلاتی ہے۔
- وقت کے لحاظ سے کسی جسم کی ڈس پلیسمنٹ کی شرح اس کی ولاسٹی کہلاتی ہے۔
- اگر کسی متحرک جسم کی سپیڈ اور سمت تبدیل نہ ہو تو اس کی ولاسٹی یکساں کہلاتی ہے۔
- کسی جسم کی ولاسٹی کی تبدیلی کی شرح کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔
- اگر کسی جسم کی ولاسٹی میں تبدیلی کی شرح یکساں ہو تو اس کا ایکسلریشن یکساں کہلاتا ہے۔
- ایسا گراف جو کسی حرکت کرتے جسم کے طے کردہ فاصلہ S اور وقت کا دورانیہ t کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے، وہ فاصلہ۔وقت گراف کہلاتا ہے۔
- سپیڈ-وقت گراف کے نیچے کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔
- فاصلہ۔وقت گراف کا سلوپ یا گریڈیئنٹ کسی جسم کی اوسط سپیڈ کے برابر ہوتا ہے۔
- سپیڈ۔وقت گراف کا سلوپ یا گریڈیئنٹ جسم کے ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے۔
- مندرجہ ذیل حرکت کی تین مساواتیں ہیں:

$$v_f = v_i + at \quad (i) \qquad S = v_i t + \frac{1}{2}at^2 \quad (ii) \qquad 2aS = v_f^2 - v_i^2 \quad (iii)$$

www.ilmkidunya.com

مشقی سوالات

www.ilmkidunya.com

درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

2.1 ڈس پلیسمنٹ اور فاصلہ میں عددی قیمتوں کی نسبت:

(الف) ہمیشہ ایک سے کم ہوتی ہے (ب) ہمیشہ ایک سے بڑھی ہوئی ہے

(ج) ہمیشہ ایک سے بڑی ہوتی ہے (د) ایک کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے

2.2 اگر کوئی جسم ایک مقام کے لحاظ سے اپنی جگہ نہ بدلے تو اس کی حالت کہلائے گی:

(الف) ریسٹ (ب) موشن (ج) یکساں موشن (د) متغیر موشن

2.3 ایک گیند کسی ٹاور پر سے گرایا گیا ہے۔ پہلے ایک سیکنڈ میں اس کا طے کردہ فاصلہ ہوگا:

(الف) 5 m (ب) 10 m (ج) 50 m (د) 100 m


2.4 ایک جسم ریسٹ کی حالت سے یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت شروع کرتے ہوئے 20 سیکنڈ میں $144\ kmh^{-1}$ کی واسٹی پر پہنچ جاتا ہے تب اس کا طے کردہ فاصلہ ہوگا:

(الف) 100 m (ب) 400 m (ج) 1400 m (د) 1440 m

2.5 ایک جسم ریسٹ کی حالت سے یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت شروع کرتا ہے وہ 4 سیکنڈ میں S فاصلہ طے کرتا ہے۔ اگر اس فاصلہ کا ایک چوتھائی فاصلہ طے کرتا ہو تو وہ کتنا وقت لے گا؟

(الف) 1 s (ب) 2 s (ج) 4 s (د) 16 s

2.6 دو اجسام A اور B کے فاصلہ۔ وقت گراف سامنے شکل میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے درست بیان کی نشان دہی کریں۔



(الف) A کی ولاسٹی B کی ولاسٹی سے زیادہ ہے

(ب) A کی ولاسٹی B کی ولاسٹی سے کم ہے

(ج) A کی ولاسٹی B کی ولاسٹی کے برابر ہے

(د) اس ضمن میں گراف کوئی معلومات نہیں دیتا

2.7 سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے کا رقبہ عددی طور پر برابر ہوتا ہے:

(الف) ولاسٹی کے (ب) یکساں ولاسٹی کے (ج) ایکسلریشن کے (د) طے کردہ فاصلہ کے

2.8 سپیڈ۔ وقت گراف کا گریڈیئنٹ برابر ہوتا ہے:


(الف) سپیڈ کے (ب) ولاسٹی کے (ج) ایکسلریشن کے (د) طے کردہ فاصلہ کے

2.9 فاصلہ۔ وقت گراف کا گریڈیئنٹ برابر ہوتا ہے:

(الف) سپیڈ کے (ب) ولاسٹی کے (ج) طے کردہ فاصلہ کے (د) ایکسلریشن کے

2.10 ایک کار $t = 0$ پر $8.5\ kmh^{-1}$ ولاسٹی سے یکساں ایکسلریشن کے ساتھ $t = 9s$ پر $113\ kmh^{-1}$ ولاسٹی تک کی جاتی ہے۔

کون سا گراف کار کی حرکت سب سے بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے؟



جوابات

2.1	د	2.2	الف	2.3	الف	2.4	ب	2.5	ب
2.6	ج	2.7	د	2.8	ج	2.9	الف	2.10	ج

2- مختصر جوابات کے سوالات:

2.1 سکیلر اور ویکٹر مقداروں کی تعریف کریں۔

جواب: سکیلر مقدار: سکیلر ایک ایسی طبعی مقدار ہے جو صرف اس کی عددی مقدار کے ذریعے مکمل طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔

ویکٹر مقدار: ویکٹر ایسی طبعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اس کی عددی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

2.2 سکیلر اور ویکٹر مقداروں کی پانچ پانچ مثالیں دیں۔

جواب: سکیلر مقداروں کی مثالیں:

(i) ماس (ii) لمبائی (iii) وقت (iv) سپیڈ (v) ورک

ویکٹر مقداروں کی مثالیں:

(i) ولاسٹی (ii) ڈس پلیسمنٹ (iii) فورس (iv) مومینٹم (v) ٹارک

2.3 ویکٹرز کی جمع کا ہیڈ ٹو۔ ٹیل رول بیان کریں۔

جواب: دو سے زیادہ ویکٹرز کو جمع کرنے کے لیے ان کی نمائندہ لائنیں اس طرح کھینچیں کہ ایک ویکٹر کا ہیڈ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ جڑے اُن کا حاصل ویکٹر ایک ایسا ویکٹر ہوگا جو کہ پہلے ویکٹر کی ٹیل سے شروع ہو کر آخری ویکٹر کے ہیڈ تک جائے گا۔ اس طریقے کو ہیڈ ٹو ٹیل رول کہتے ہیں۔

2.4 فاصلہ۔ وقت گراف اور سپیڈ۔ وقت گراف کیا ہیں؟

جواب: فاصلہ۔ وقت گراف:

فاصلہ اور وقت کے مابین گراف، حرکت کرنے والے جسم کا طے کردہ فاصلہ 's' اور صرف شدہ وقت 't' میں تعلق ظاہر کرتا ہے۔

سپیڈ۔ وقت گراف: سپیڈ اور وقت کے مابین گراف، حرکت کرنے والے جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے اور سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے وقت کے ایکسز تک کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔

www.ilmkidunya.com

2.5 زمین پر قریب سے گرنے والے تمام اجسام کا یکساں ایکسلریشن ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بھاری جسم، ہلکے جسم کی نسبت زیادہ تیزی سے گرتا ہے؟

جواب: اگر ہوا کی رزسٹنس کو نظر انداز کر دیا جائے تو زمین کی سطح کے قریب سے گرنے والے تمام اجسام کا ایکسلریشن ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر ہوا کی موجودگی میں مختلف اجسام نیچے کی طرف گرتے ہیں تو ان کا ایکسلریشن مختلف ہوتا ہے یعنی بھاری اجسام ہلکے اجسام کی نسبت تیزی سے گرتے ہیں۔

2.6 ویکٹر مقدار میں بعض اوقات سکیلر انداز میں لکھ دی جاتی ہیں (یعنی جلی حروف میں نہیں) پھر ان کی سمت کیسے ظاہر کی جاتی ہے؟

جواب: جب ویکٹر مقداریں سکیلر انداز میں لکھی جاتی ہیں (یعنی جلی حروف میں نہیں)، تو ان کی سمت کو مثبت یا منفی علامت سے، خاص قسم کے زاویوں سے یا الفاظ، علامتوں یا حوالہ جات کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

2.7 ایک جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔ کیا اس کی ولاسٹی بھی یکساں ہوگی؟ وجہ بیان کریں۔

جواب: اگر ایک جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ جسم یکساں ولاسٹی کے ساتھ بھی حرکت کرے۔

وجہ: سپیڈ ایک سکیلر مقدار ہے جو صرف عددی قیمت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ولاسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے جو کسی جسم کی حرکت کو عددی قیمت اور سمت سے ظاہر کرتے ہیں۔

2.8 کیا کسی جسم کا ایکسٹریشن ہوگا؟ جب کہ وہ حرکت کر رہا ہو؟

(الف) یکساں ولاسٹی کے ساتھ (ب) یکساں سپیڈ کے ساتھ

جواب: (الف) اگر جسم یکساں ولاسٹی کے ساتھ حرکت کر رہا ہو تو جسم کا ایکسلریشن صفر ہوگا کیونکہ ولاسٹی میں تبدیلی کی شرح کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔

(ب) اگر جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو تو جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سرکلر ٹریک (دائروی راستے) پر حرکت کرتا ہے کیونکہ سرکلر ٹریک پر جسم کی حرکت کی سمت ہر لمحہ بدلتی ہے۔

3- تعمیری فکر کے سوالات

2.1 فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ کی عددی قیمتیں برابر بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی۔ اس بیان کی وضاحت کریں۔

جواب: فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ کی عددی قیمتیں برابر نہیں ہو سکتیں کیونکہ فاصلہ کل سفر کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ڈس پلیسمنٹ دو پوائنٹس کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے۔

فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ صرف اس صورت میں برابر ہو سکتے ہیں جب خط مستقیم میں ایک ہی سمت میں جسم حرکت کر رہا ہو۔

2.2 جب بندوق سے ایک گولی داغی جاتی ہے تو جس ولاسٹی سے گولی نالی سے نکلتی ہے اُسے بندوق کی مزل ولاسٹی (Murale Velocity) کہا جاتا ہے۔ لمبی تالی والی ایک بندوق کی مزل ولاسٹی ایک چھوٹی ٹالی والی بندوق کی منزل ولاسٹی سے کم ہوتی ہے۔ کس بندوق میں گولی کا ایکسلریشن زیادہ ہوگا؟ اپنے جواب کو ثابت کریں۔

جواب: چھوٹی نالی والی بندوق میں گولی کا ایکسلریشن زیادہ ہوگا۔

وجہ: کیونکہ چھوٹی نالی والی بندوق کی گولی کی مزل ولاسٹی بڑی نالی والی بندوق کی گولی کی مزل ولاسٹی سے زیادہ ہوتی ہے۔


2.3 ایک مکمل ٹرپ (trip) کے لیے اوسط ولاسٹی نکالی گئی۔ اس کی قیمت مثبت نکلی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پورے ٹرپ کے دوران میں کسی لمحے اس کی لمحاتی ولاسٹی منفی رہی ہو؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

جواب: جی ہاں ایسا ممکن ہے کہ پورے ٹرپ کے دوران میں کسی لمحے اس کی لمحاتی ولاسٹی منفی رہی ہو۔

www.ilmkidunya.com


وجہ:
- اوسط ولاسٹی کل ڈس پلیسمنٹ پر منحصر ہے جبکہ لمحاتی ولاسٹی کسی ایک لمحے کی ولائی کو ظاہر کرتی ہے۔
- اگر ٹرپ کے دوران جسم عارضی طور پر ریورس مڑتا ہے تو اس لمحے جسم کی لمحاتی ولاسٹی منفی ہوگی چاہے اس کا ڈس پلیسمنٹ مثبت ہی کیوں نہ ہو۔

2.4 ایک ذرہ ولاسٹی v کے ساتھ عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا۔ یہ وقت کے دورانیہ T میں زمین پر واپس آ گیا۔ نیچے دیے گئے گرافس میں سے کون سا گراف اس حرکت کا صحیح اظہار کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔



جواب: گراف (الف) اس حرکت کا صحیح اظہار کرتا ہے۔ اوپر جاتے ہوئے جسم کی ولاسٹی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے بلند ترین مقام پر صفر ہو جاتی ہے۔ پھر ولاسٹی مخالف سمت میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حتی کہ زمین تک پہنچ جائے گا۔ گراف کے نیچے کا رقبہ ڈس پلیسمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کہ صفر ہے جب جسم زمین پر واپس آ جاتا ہے۔

2.5 نیچے دی گئی شکل دیکھ سائیکلسٹ کے سفر کا فاصلہ۔ وقت گراف ہے۔ اس میں (a)، (b) اور (c) قطعوں کے درمیان میں ولاسٹی معلوم کریں۔



جواب: قطع (a) کے لیے ولاسٹی:

$\Delta d = 2\text{ km} - 0\text{ km} = 2\text{ km}$

$\Delta t = 6\text{ min} - 0\text{ min} = 6\text{ min}$

ولاسٹی = ?

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

$$v = \frac{2}{6} = 0.33\text{ km/min}$$

قطع (b) کے لیے ولاسٹی:

$\Delta d = 2\text{ km} - 2\text{ km} = 0\text{ km}$

$\Delta t = 10\text{ min} - 6\text{ min} = 4\text{ min}$

ولاسٹی = ?

www.ilmkidunya.com

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

$$v = \frac{0}{4} = 0 \text{ km/min}$$

قطع (c) کے لیے ولاسٹی:

$\Delta d = 0 \text{ km} - 2 \text{ km} = -2 \text{ km}$

$\Delta t = 20 \text{ min} - 10 \text{ km} = 10 \text{ min}$

ولاسٹی = ?

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{-2}{10}$$

$$v = -0.5 \text{ km/min}$$

2.6 کیا ممکن ہے کہ کسی جسم کی ولائی (وقت کے کسی ایک لمحے کے لیے صفر ہو لیکن اس کا ایکسلریشن صفر نہ ہو؟ اگر ہاں تو کسی ایک ایسی صورت حال کی مثال دیں۔

جواب: جی ہاں! ایسا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر عمودی اوپر پھینکا گیا بال بلند ترین مقام پر صفر ولاسٹی رکھتا ہے۔ مگر گریویٹی کی وجہ سے اس کا ایکسلریشن برقرار رہتا ہے۔ ($9.8 ms^{-2}$ نیچے کی طرف)

4- تفصیلی سوالات

2.1 کسی ویکٹر کو گرافیکل (Graphically) طریقے سے کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 3

2.2 درج ذیل کے مابین فرق واضح کریں: (i) ریسٹ اور موشن (ii) سپیڈ اور ولاسٹی

جواب: (i) جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 5 (ii) جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 9 اور 11

2.3 موشن کی مختلف اقسام بیان کریں۔ مثالیں بھی دیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 6 اور 7

2.4 فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ کے درمیان فرق واضح کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 8

2.5 فاصلہ۔ وقت گراف کا گریڈیئنٹ اور سپیڈ۔ وقت گراف کا گریڈیئنٹ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ڈایاگرام بنا کر وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 17 اور 19

2.6 ثابت کریں کہ سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے رقبہ کسی جسم کے طے کردہ فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 20

2.7 گریویٹی کے زیر اثر حرکت کرنے والی اشیا کے لیے حرکت کی مساوات کیسے استعمال کی جا سکتی ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 22

حسابی سوالات

2.1 مندرجہ ذیل ویکٹرز کی نمائندہ لائنیں کھینچیں۔

(الف) ایک 400 ms^{-1} ولاسٹی x۔ ایکسز کے ساتھ 60^o کا زاویہ بناتی ہے۔

www.ilmkidunya.com

(ب) ایک 50 N ولاسٹی x-ایکسز کے ساتھ 120^o کا زاویہ بناتی ہے۔

حل:


حل:

(الف) فرض کیا: سکیل

$100\ ms^{-1} = 1\ cm$

$400\ ms^{-1} = 4\ cm$

$\theta = 60^o$




(ب) فرض کیا: سکیل

$10\ N = 1\ cm$

$50\ N = 5\ cm$

$\theta = 120^o$



2.2 ایک کار $72\ kmh^{-1}$ کی اوسط سپیڈ سے چل رہی ہے۔ یہ 360km کا فاصلہ کتنے وقت میں طے کرے گی؟

حل:

معلوم:

فاصلہ $= d = 360km$

سپیڈ $= v = 72km/h$

مطلوب:

وقت $= t = ?$

حل:

فارمولا: فاصلہ = ولاسٹی × وقت

$$d = v \times t$$

یا $$t = \frac{d}{v}$$

$$t = \frac{360\,km}{72\ kmh^{-1}} = 5 \text{ گھنٹے}$$

جواب: کار کو 360 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 5 گھنٹے لگیں گے۔

2.3 ایک ٹرک ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ 50 سیکنڈ میں $90\ kmh^{-1}$ کی ولاسٹی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا اوسط ایکسلریشن معلوم کریں۔

معلوم:

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 0\ ms^{-1}$

آخری ولاسٹی $= v_f = 90\ ms^{-1}$

$$v_f = \frac{90 \times 1000}{3600} ms^{-1}$$

$$v_f = 25\ ms^{-1}$$

$t = 50$ سیکنڈ

www.ilmkidunya.com

مطلوب: اوسط ایکسلریشن $= a_{av} = ?$

حل:

ولاسٹی میں تبدیلی

فارمولا: ایکسلریشن $=$ وقت

$$a_{av} = \frac{v_i - v_f}{t}$$

$$a_{av} = \frac{25\,ms^{-1} - 0}{50s}$$

$$a_{av} = 0.5\ ms^{-2}$$

جواب: ٹرک کا اوسط ایکسلریشن $0.5\ ms^{-2}$ ہے۔

2.4 ایک کار $5ms^{-1}$ کی ولاسٹی سے چلتی ہوئی ٹریفک کے گرین سگنل سے گزری ہے۔ تب یہ $1.5ms^{-2}$ ایکسلریشن سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ 5 سیکنڈ کے بعد کار کی ولاسٹی کتنی ہوگی؟

معلوم: ڈیٹا:

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 5\ ms^{-1}$

ایکسلریشن $= a = 1.5\ ms^{-2}$

وقت $= t = 5\ s$

مطلوب: آخری ولاسٹی $= v_f = ?$

حل:

فارمولا:

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f = 5\ ms^{-1} + 1.5\ ms^{-2} \times 5s$$

$$v_f = 12.5\ ms^{-1}$$

جواب: 5 سیکنڈ کے بعد کار کی ولاسٹی $12.5\ ms^{-1}$ ہے۔

2.5 ایک موٹر سائیکل ابتدائی طور پر $18\ kmh^{-1}$ کی ولاسٹی سے حرکت کرتے ہوئے $2ms^{-2}$ کے یکساں ایکسلریشن سے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ موٹر سائیکل 10 سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

معلوم:

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 18\ kmh^{-1} = \frac{18 \times 1000\ ms^{-1}}{3600} = 5ms^{-1}$

ایکسلریشن $= a = 2\ ms^{-1}$

وقت $= t = 10\ s$

فاصلہ $= S = ?$

www.ilmkidunya.com

حل:

فارمولا: $S = v_i t + \frac{1}{2}at^2$

$S = v_i t + \frac{1}{2}at^2$

$S = (5ms^{-1})(10s) + \frac{1}{2}(2ms^{-2})(10s)^2$

$S = 50\ m + 100\ m$

$S = 150\ m$

جواب: موٹر سائیکل 10 سیکنڈ میں 150 میٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔

2.6 ایک ویگن سڑک پر $54\ kmh^{-1}$ کی ولاسٹی سے دوڑ رہی ہے۔ تب یکدم بریکیں لگاتی ہے اور رکنے سے پہلے 25m کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ویگن کا ایکسلریشن معلوم کریں۔

معلوم:

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 54\ kmh^{-1}$

$= \frac{54 \times 1000}{60 \times 60s}\ ms^{-1} = 15ms^{-1}$

آخری ولاسٹی $= v_f = 0\ ms^{-1}$

فاصلہ $= S = 25\ m$

مطلوب: ایکسلریشن $= a = ?$

حل:

فارمولا: $2aS = v_f^2 - v_i^2$

لہٰذا $a = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2S}$

$\frac{(0)^2 - (15ms^{-1})^2}{2 \times 25m} = -4.5ms^{-2}$

جواب: ویگن کا ایکسلریشن $4.5\ ms^{-2}$ ہے (منفی کی علامت ڈی سلریشن کو ظاہر کرتی ہے)

2.7 ایک پتھر 45m کی بلندی سے گرایا گیا ہے۔ یہ زمین تک پہنچنے میں کتنا وقت لے گا؟ زمین پر ٹکرانے سے ذرا پہلے اس کی ولاسٹی کتنی ہوگی؟

معلوم:

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 0\ ms^{-1}$

بلندی $= h = 45m$

گریویٹیشنل ایکسلریشن $= g = 10\ ms^{-2}$

مطلوب:

وقت $= t = ?$

آخری ولاسٹی $= v_f = ?$

www.ilmkidunya.com

حل: فارمولا:

$$S = v_i t + \frac{1}{2} gt^2$$

$$v_f = v_i + gt$$

(i) زمین تک پہنچنے کا وقت:

$$S = v_i t + \frac{1}{2} gt^2$$

$$45m = 0 + \frac{1}{2} (10)\, t^2$$

$$t^2 = \frac{45 \times 2}{10} = 9$$

طرفین کا جذر لینے سے

$$\sqrt{t^2} = \sqrt{9}$$

$$t = 3s$$

(ii) زمین پر گرانے سے ذرا پہلے پتھر کی ولاسٹی:

$$v_f = v_i + gt$$
$$v_f = 0 + (10\ ms^{-2}) \times (3s)$$
$$v_f = 30\ ms^{-1}$$

جواب: (i) پتھر کو زمین تک پہنچنے میں 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔

(ii) زمین پر گرانے سے ذرا پہلے پتھر کی ولاسٹی $30\ ms^{-1}$ ہے۔

2.8 ایک کار $20ms^{-1}$ کی اوسط ولاسٹی سے 10km کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تب یہ ایک متبادل راستے (diversion) سے اُسی سمت میں $4ms^{-1}$ کی اوسط ولاسٹی سے اگلے 0.8km تک چلتی ہے۔ کار کے کل سفر کے لیے اوسط ولاسٹی معلوم کریں۔

حل:

پہلا مرحلہ: سفر کے دوران پہلے حصے کا فاصلہ طے کرنے کا وقت:

فاصلہ = 10 km = 10000 m

اوسط ولاسٹی = $20ms^{-1}$

$$\text{وقت} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{اوسط ولاسٹی}}$$

$$\text{وقت} = \frac{10000\,m}{25\,ms} = 500s$$

دوسرا مرحلہ: سفر کے دوران دوسرے مرحلے کا فاصلہ طے کرنے کا وقت:

فاصلہ = 0.8 km = 800 m

اوسط ولاسٹی = $4ms^{-1}$

$$\text{وقت} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{اوسط ولاسٹی}}$$

www.ilmkidunya.com

$$\text{وقت} = \frac{800\,\text{m}}{4\,\text{ms}} = 200\,\text{s}$$

تیسرا مرحلہ: کل فاصلہ اور کل وقت:

$$\text{کل فاصلہ} = d = 10000\ \text{m} + 800\ \text{m}$$

$$= d = 10800\ \text{m}$$

$$\text{کل وقت} = t = 500\ \text{s} + 200\ \text{s}$$

$$t = 700\ \text{s}$$

چوتھا مرحلہ: کل سفر کے لیے اوسط ولاسٹی:

$$\text{اوسط ولاسٹی} = \frac{\text{کل فاصلہ}}{\text{کل وقت}}$$

$$v_{av} = \frac{10800\,\text{m}}{700\,\text{s}} = 15.42\,\text{ms}^{-1}$$

$$v_{av} = 15.4\ \text{ms}^{-1}$$

جواب: کار کے کل سفر کے لیے اوسط ولاسٹی $15.4\ \text{ms}^{-1}$ ہوگی۔

2.9 ایک گیند کسی ٹاور پر سے گرایا جاتا ہے۔ گیند 5 سیکنڈ میں زمین پر پہنچتا ہے ٹاور کی بلندی اور زمین سے ٹکراتے وقت اس کی ولاسٹی معلوم کریں۔

معلوم:

$$\text{ابتدائی ولاسٹی} = v_i = 0\ \text{ms}^{-1}$$

$$\text{وقت} = t = 5\text{s}$$

$$\text{گریویٹیشنل ایکسلریشن} = g = 10\ \text{ms}^{-2}$$

مطلوب:

(a) ٹاور کی بلندی $= h = ?$

(b) آخری ولاسٹی $= v_f = ?$

حل: فارمولا: حرکت کی مساوات میں استعمال کرنے سے

$$h = v_i t + \frac{1}{2} gt^2$$

$$v_f = v_i + gt$$

(a) ٹاور کی بلندی

$$h = v_i t + \frac{1}{2} gt^2$$

$$h = 0 \times 5\text{s} + \frac{1}{2} \times (10\ \text{ms}^{-2}) \times (5\ \text{s})^2$$

$$h = 125\ \text{m}$$

(b) گیند کی آخری ولاسٹی

$$v_f = v_i + gt$$

$$v_f = 0 + (10\ \text{ms}^{-2}) \times (5\text{s})$$

$$v_f = 50\ \text{ms}^{-1}$$

www.ilmkidunya.com

جواب: پس ٹاور کی بلندی 125 m ہے اور گیند کی آخری ولاسٹی $50\ ms^{-1}$ ہے۔

2.10 ایک کرکٹ بال کو ایسے ہٹ لگائی گئی کہ وہ ہوا میں سیدھا اوپر کی طرف چلا گیا۔ ایک مشاہدہ کرنے والے نے نوٹ کیا کہ اپنے بلند ترین نقطے تک پہنچے میں اسے 3 سیکنڈ لگے۔ گیند کی ابتدائی ولاسٹی کیا تھی؟ اگر گیند زمین سے 1 m اوپر سے ہٹ کیا گیا ہو۔ تو یہ زمین سے کتنی بلندی تک گیا؟

معلوم:

$$\text{آخری ولاسٹی} = v_f = 0\ ms^{-1}$$

$$\text{وقت} = t = 3s$$

$$\text{گریویٹیشنل ایکسلریشن} = g = 10\ ms^{-2}$$

مطلوب:

$$\text{ابتدائی ولاسٹی} = v_i = ?$$

$$\text{بلندی} = h = ?$$

$$\text{کل بلندی} = ?$$

حل:

فارمولے: حرکت کی مساواتیں استعمال کرتے ہوئے:

$$v_f = v_i + gt$$

$$2gh = v_f^2 - v_i^2$$

حل:

(a) گیند کی ابتدائی ولاسٹی

$$v_f = v_i + gt$$

$$v_f = v_i - gt$$

$$v_i = 0 - (-10\ ms^{-2}) \times (3s)$$

$$v_i = 30\ ms^{-1}$$

(b) بلند ترین مقام

$$2gh = v_f^2 - v_i^2$$

$$2 \times (-10\ ms^{-2}) \times h = 0 - (30\ ms^{-1})^2$$

$$h = \frac{-900}{-20} = 45m$$

(c) زمین سے کل بلندی $45m + 1m = 46\ m$ ہے۔

جواب: (a) گیند کی ابتدائی ولاسٹی $30\ ms^{-1}$ ہے۔


(b) اگر بال کو 1 میٹر کی بلندی سے اوپر ہٹ کیا گیا تو یہ زمین سے 46 میٹر کی بلندی تک گیا۔

www.ilmkidunya.com

مثالیں

مثال 2.1: نمائندہ لائن کھینچ کر ولاسٹی ویکٹر v ظاہر کریں کہ $300\ ms^{-1}$ ولاسٹی شمال سے مشرق کی طرف 60^o کا زاویہ بنا رہی ہے۔

حل:



(i) ایک دوسرے پر عموداً دو لائنیں کھینچیں جو کہ شمال جنوب، مشرق اور مغرب کی نشان دہی کریں۔


(ii) ایک مناسب سکیل کا انتخاب کریں۔ اگر $100\ ms^{-1} = 1\ cm$ تو $300\ ms^{-1}$ کو 3cm لمبی لائن ظاہر کرے گی۔

(iii) 3 cm لمبی لائن OP، شمال سے مشرق کی طرف 60^o کا زاویہ بناتی ہوئی کھینچیں۔

(iv) لائن کے سرے پر تیر کا نشان لگائیں۔ OP ویکٹر v ہے۔

مثال 2.2: ایک فورس ویکٹر F کی نمائندہ لائن کھینچیں جس کی عددی قیمت 350 N ہے اور x۔ ایکسز کے ساتھ 60^o کا زاویہ بناتا ہے۔

حل:



(i) افقی اور عمودی لائنیں کھینچ کر x۔ ایکسز اور y۔ ایکسز بنائیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

(ii) سکیل: اگر 100 N = 1cm تو 350N = 3.5cm

(iii) 3.5cm لمبی لائن OQ، x۔ ایکسز کے ساتھ 60^o کا زاویہ بناتی ہوئی کھینچیں۔

(iv) لائن OQ کے سرے پر تیر کا نشان بنا میں۔ OQ فورس ویکٹر F ہے۔

مثال 2.3: ایک عقاب 300 m فاصلے سے زمین کی طرف غوطہ لگاتا ہے۔ اگر اس کی اوسط سپیڈ $60\ ms^{-1}$ ہو تو یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے کتنا وقت لگے گا؟

حل:

کل طے کردہ فاصلہ $= S = 300\ m$

اوسط سپیڈ $= v_{av} = 60\ m\ s^{-1}$

کل وقت (جو لگے گا) $= t = ?$

فارمولا: یہ مساوات استعمال کرتے ہوئے $v_{av} = \frac{S}{t}$ یا $t = \frac{S}{v_{av}}$

قیمتیں درج کرنے سے $t = 300\ m / 60\ m\ s^{-1} = 5\ s$

مثال 2.4: ایک ہوائی جہاز رن وے پر ریسٹ کی پوزیشن سے دوڑنا شروع کرتا ہے، جیسا کہ نیچے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ رن وے پر وہ کسی ایکسلریشن سے حرکت کرتے ہوئے 200 سیکنڈ میں $252\ km\ h^{-1}$ کی ولاسٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کا اوسط ایکسلریشن معلوم کریں۔



www.ilmkidunya.com

حل:

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 0$

آخری ولاسٹی $= v_f = 252\ km\ h^{-1}$

$$= \frac{252 \times 10^3 m}{60 \times 60 s} = 70 ms^{-1}$$

وقت کا دورانیہ $= t = 20\ s$

اوسط ایکسلریشن $= a_{av} = ?$

فارمولا: یہ فارمولا استعمال کرتے ہوئے

$$a_{av} = \frac{v_f - v_i}{t}$$

قیمتیں درج کرنے سے

$$a_{av} = \frac{70 ms^{-1} - 0}{20 s}$$

$$a_{av} = 3.5\ ms^{-2}$$

مثال 2.5: لوہے کا ایک گولا کسی ٹاور پر سے گرایا گیا ہے۔ یہ زمین پر 4 سیکنڈ میں پہنچتا ہے۔

(a) ٹاور کی بلندی معلوم کیجیے۔ (b) گولے کی زمین سے ٹکراتے ہوئے ولاسٹی معلوم کیجیے۔

حل: آزادانہ گرنے والی شے کے لیے

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 0$

ایکسلریشن $= g = 10\ ms^{-2}$

وقت $= t = 4s$

بلندی (فاصلہ) $= S = h = ?$

آخری ولاسٹی $= v_f = ?$

(a) فارمولا: حرکت کی دوسری مساوات کے مطابق

$$S = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

قیمتیں درج کرنے سے

$$h = 0 \times 4s + \frac{1}{2} \times (10 ms^{-2}) \times (4)^2 s^2$$

$$h = 80\ m$$

(b) فارمولا: حرکت کی پہلی مساوات کے مطابق

$$v_f = v_i + gt$$

$$v_f = 0 + (10\ ms^{-2}) \times (4s) = 40\ ms^{-1}$$

مثال 2.6: ایک تیر جب کمان سے عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا۔ تیر جب کمان سے نکلا تو اس کی ولاسٹی $30\ ms^{-1}$ تھی۔ بلند ترین مقام تک پہنچنے کے لیے اس کا وقت معلوم کریں۔ یہ بھی معلوم کریں کہ تیر زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی ایک پہنچا؟

حل: یہاں ایکسلریشن منفی لیا جائے گا کیوں کہ تیر اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔

www.ilmkidunya.com

ابتدائی ولاسٹی $= v_i = 30\ ms^{-1}$

آخری ولاسٹی $= v_f = 0$

ایکسلریشن $= g = -10\ ms^{-2}$

وقت $= t = ?$

بلندی $= S = h = ?$

فارمولا: حرکت کی پہلی مساوات کے مطابق

$$v_f = v_i + gt$$

$$t = \frac{v_f - v_i}{g}$$

قیمتیں درج کرنے سے:

$$t = \frac{0 - 30ms^{-1}}{-10ms^{2}} = 3s$$

فارمولا: حرکت کی تیسری مساوات کے مطابق:

$$2gS = v_f^2 - v_i^2$$

$$S = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2g}$$

قیمتیں درج کرنے سے

$$h = \frac{0 - (30)^2 m^2 s^2}{2 \times (-10ms^{-2})} = 45m$$

کثیر الانتخابی معروضی سوالات

درست جواب کا انتخاب کریں۔

-1 ایکسلریشن کا یونٹ ہے:

(الف) ms^{-1} (ب) ms^{-2} (ج) Nm (د) kgm^{-1}

-2 ایکسلریشن کا یونٹ کونسا ہے:

(الف) kmh^{-2} (ب) kmh^{-1} (ج) ms^{-1} (د) kms^{-1}

-3 دائروی راستے کے ساتھ کسی جسم کی موشن کہلاتی ہے۔

(الف) سرکلر موشن (ب) ریکٹلینئر حرکت (ج) ٹرانسلیٹری موشن (د) روٹیٹری موشن

-4 ان میں سے ولاسٹی کا یونٹ کونسا ہے:

(الف) ms^{-1} (ب) ms^{-2} (ج) m (د) $m^{-2}s^{-2}$

-5 سیل فش کی سپیڈ ہے:

(الف) $160kmh^{-1}$ (ب) $110kmh^{-1}$ (ج) $300kmh^{-1}$ (د) $450kmh^{-1}$

www.ilmkidunya.com

-6 ڈس پلیسمنٹ کا فارمولا ہے:

(الف) $d = v \times t$ (ب) $S = v \times t$ (ج) $S = -v \times t$ (د) $d = v \times t^2$

-7 فاصلے کا SI یونٹ ہے۔

(الف) m^2 (ب) ms^{-1} (ج) m (د) ms^{-2}

-8 دو پوائنٹس کے درمیان راستے کی لمبائی کو کہا جاتا ہے:

(الف) فاصلہ (ب) ڈس پلیسمنٹ (ج) سپیڈ (د) ولاسٹی

-9 ولاسٹی میں وقت کے لحاظ سے تبدیلی کی شرح ہے:

(الف) ایکسلریشن (ب) ولاسٹی (ج) سپیڈ (د) فاسلہ

-10 منفی ایکسلریشن کو یہ بھی کہتے:

(الف) ایکسلریشن (ب) ولاسٹی (ج) ڈی سلریشن (د) ب اور ج دونوں

-11 وقت اور ولاسٹی کا حاصل ضرب ہے:

(الف) ماس (ب) فورس (ج) ایکسلریشن (د) ڈس پلیسمنٹ

-12 ایک کار ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے یہ 60s کے بعد $40\ ms^{-2}$ کی سپیڈ حاصل کرتی ہے۔ اس دوران کار کے ذریعے طے کردہ فاصلہ ہے:

(الف) 2400m (ب) 2000m (ج) 2060m (د) 1900m

-13 یونٹ ٹائم میں کسی جسم کا طے کردہ فاصلہ کہلاتا ہے:

(الف) ولاسٹی (ب) سپیڈ (ج) یکساں سپیڈ (د) غیر یکساں ولاسٹی

-14 چیتے کی سپیڈ ہے:

(الف) $300kmh^{-1}$ (ب) $200kmh^{-1}$ (ج) $110kmh^{-1}$ (د) $90kmh^{-1}$

-15 ایک جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ دائرے میں حرکت کرتا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان ایکسلریشن کے لیے درست ہے؟

(الف) اس میں کوئی ایکسلریشن نہیں ہے۔ (ب) اس کا منفی ایکسلریشن دائرے کے مماس کی طرف ہے

(ج) اس کا ایکسلریشن دائرے کے مرکز کی طرف ہے (د) اس کا ایکسلریشن دائرے کے مرکز سے دور ہوتا ہے

-16 اگر کسی جسم کی ولاسٹی صفر ہو مگر پھر بھی ایکسلریٹ ہو رہی ہو، جسم کی حرکت کے متعلق کیا کہیں گے؟

(الف) یہ آرام کی حالت میں ہے (ب) یہ سیدھی لائن کے ساتھ یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے

(ج) یہ سمت تبدیل کر رہا ہے (د) یہ سپیڈ تبدیل کر رہی ہے لیکن ولاسٹی صفر ہے

-17 ایک شے کا ڈس پلیسمنٹ۔ وقت گراف $2ms^{-1}$ کی ڈھلوان کے ساتھ سیدھی لائن ہے یہ ڈھلوان کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟

(الف) جسم کا ڈس پلیسمنٹ (ب) جسم کا ایکسلریشن

(ج) جسم کی ولاسٹی (د) جسم کی سپیڈ

www.ilmkidunya.com

-18 g کی قیمت ہے:

(الف) $8.8ms^{-2}$ (ب) $7.8ms^{-2}$ (ج) $9.8ms^{-2}$ (د) $6.8ms^{-2}$

-19 ایک جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ سیدھی لائن میں حرکت کرتا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان اس کی رفتار کے بارے میں ٹھیک/درست ہے۔

(الف) ولاسٹی یکساں ہے (ب) ولاسٹی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے

(ج) ولاسٹی وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ (د) ولاسٹی تبدیل نہیں ہوتی

-20 ایک جسم اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ جب جسم اوپر جاتا ہے تو اس کی ولاسٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

(الف) یہ پہلے جیسی رہتی ہے

(ب) یہ کم ہوتی ہے جیسے جیسے اوپر جاتی ہے اور اوپر پہنچ کر صفر ہو جاتی ہے

(ج) یہ بڑھتی ہے جیسے اوپر جاتی ہے (د) بلند ترین مقام پر اس کی سمت بدل جاتی ہے۔

-21 نیچے کی طرف گرنے والا جسم ایک مثال ہے:

(الف) لینئر موشن (ب) روٹیٹری موشن (ج) سرکلر موشن (د) ٹرانسلیٹری موشن

-22 فیرس وہیل میں سوار کی حرکت مثال ہے:

(الف) روٹیٹری موشن (ب) سرکلر موشن (ج) لینئر موشن (د) رینڈم موشن

-23 روشنی کی سپیڈ کیا ہے؟

(الف) $2 \times 10^8 ms^{-1}$ (ب) $1 \times 10^8 ms^{-1}$ (ج) $3 \times 10^8 ms^{-1}$ (د) $4 \times 10^8 ms^{-1}$

-24 _____ ایک ویکٹر مقدار ہے۔

(الف) ڈس پلیسمنٹ (ب) ماس (ج) وقت (د) لمبائی

-25 ایک سکیلر مقدار نہیں ہے:

(الف) سپیڈ (ب) انرجی (ج) وقت (د) ایکسلریشن

-26 براؤنین حرکت اس کی ایک مثال ہے:

(الف) رینڈم موشن (ب) سرکلر موشن (ج) لیئر موشن (د) وائبریٹری موشن

-27 کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کی حرکت کو کہتے ہیں:

(الف) سرکلر موشن (ب) روٹیٹری موشن (ج) رینڈم موشن (د) لنیئر موشن

-28 ڈس پلیسمنٹ ایک ویکٹر مقدار ہے۔ ان میں سے کون سا بیان ڈس پلیسمنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے؟

(الف) ہمیشہ سے کیے گئے فاصلے کے برابر ہوتے ہیں (ب) یہ ابتدائی اور آخری پوزیشن کے درمیان کم ترین راستہ ہے

(ج) یہ کبھی صفر نہیں ہو سکتا (د) یہ ہمیشہ طے کیے گئے فاصلے سے زیادہ ہوتا ہے

-29 ایک کار 100 میٹر شمال کی طرف پھر 100 میٹر مشرق کی طرف سفر کرتی ہے ڈس پلیسمنٹ کی کیا قیمت ہے؟

(الف) 100m (ب) 200m (ج) 141.4m (د) 0m

www.ilmkidunya.com

-30 ایک پتھر اونچائی سے پھینکا گیا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان درست ہے اگر پتھر گر رہا ہو تو؟

(الف) پتھر کی سپیڈ گریویٹیشنل ایکسلریشن کی وجہ سے زیادہ ہے (ب) پتھر کی سپیڈ یکساں رہے گی

(ج) پتھر کا ایکسلریشن وقت کے ساتھ کم ہو رہا ہے؟ (د) پتھر کی ولاسٹی ہوا کی مزاحمت کی وجہ سے کم ہو رہی ہے

-31 دو نقطہ جہاں دو ایکسز ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، کہلاتا ہے:

(الف) گراف (ب) متغیر (ج) نقطہ آغاز (د) سلوپ

-32 فاصلہ۔وقت گراف کا سلوپ ہے:

(الاف) فورس (ب) ڈس پلیسمنٹ (ج) فاصلہ (د) سپیڈ

-33 ایک جسم آزادانہ گر رہا ہے۔ اس کے ایکسلریشن کی سمت کیا ہے؟

(الف) اوپر کی طرف (ب) نیچے کی طرف (ج) صفر (د) افقی

-34 ولاسٹی ٹائم گراف کے نیچے کا رقبہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟

(الف) ایکسلریشن (ب) ڈس پلیسمنٹ (ج) سپیڈ (د) وقت

-35 اس شے کا ایکسلریشن کیا ہوگا جو ریسٹ کی حالت میں ہے اور دیے گئے وقت میں ریسٹ کی حالت میں ہی رہتا ہے؟

(الف) صفر (ب) یکساں (ج) بڑھ رہا ہے (د) کم ہو رہا ہے

-36 $v_f^2 - v_i^2 =$

(الف) at (ب) $2aS$ (ج) v_{ave} (د) $\frac{\Delta v}{Ov_i}$

-37 $v_f = v_i +$ _____

(الف) $2as$ (ب) v_{ave} (ج) at (د) $v_i t$

-38 ایک کار 0m/s کی ابتدائی ولاسٹی سے مخصوص فاصلہ 5 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ اگر کار کی آخری ولاسٹی 20m/s ہو تو 5 سیکنڈ کے بعد کار کا ایکسلریشن کیا ہوگا؟

(الف) $4m/s^2$ (ب) $2m/s^2$ (ج) $1m/s^2$ (د) $5m/s^2$

-39 ایک جسم یکساں ولاسٹی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ تو اس میں سے کونسی لائن درست ہے؟

(الف) جسم کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے (ب) جسم کی ولاسٹی مسلسل تبدیل ہو رہی ہے

(ج) جسم کا ایکسلریشن صفر ہے (د) جسم کا ڈس پلیسمنٹ تبدیل نہیں ہو رہا

-40 ایک جسم یکساں ایکسلریشن سے حرکت کر رہا ہے۔ اس میں سے کون سا بیان ڈس پلیسمنٹ کے لیے درست ہے؟

(الف) جسم کی ولاسٹی یکساں شرح سے بڑھ رہی ہے (ب) ولاسٹی ایک جیسی بہتی ہے

(ج) ڈس پلیسمنٹ یکساں رہتا ہے (د) ایکسلریشن صفر ہے

-41 ایک گاڑی $20ms^{-1}$ کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ یہ سپیڈ kmh^{-1} میں ہے:

(الف) $36kmh^{-1}$ (ب) $72kmh^{-1}$ (ج) $80kmh^{-1}$ (د) $45kmh^{-1}$

www.ilmkidunya.com

42- ایک جسم ____ رکھتا ہے اگر یہ وقت کے یکساں وقفوں میں یکساں ڈس پلیسمنٹ طے کرے خواہ یہ وقفے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں۔

(الف) یونیفارم ولاسٹی (ب) یونیفارم سپیڈ (ج) غیر یکساں سپیڈ (د) غیر یکساں ولاسٹی

جوابات

1	ب	2	الف	3	الف	4	الف	5	ب	6	الف	7	ج
8	الف	9	الف	10	د	11	د	12	الف	13	ب	14	ج
15	ج	16	د	17	ج	18	ج	19	ب	20	ب	21	الف
22	ب	23	ج	24	الف	25	الف	26	د	27	الف	28	ب
29	ج	30	الف	31	ج	32	د	33	د	34	ب	35	الف
36	ب	37	ج	38	الف	39	الف	40	ج	41	الف	42	الف

کثیر الانتخابی مختصر سوالات

مختصر سوالات کے جواب دیں۔

1- موشن کی تعریف کریں۔

جواب: موشن: اگر کوئی شے اپنے اردگرد کی چیزوں کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہو تو اسے موشن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔

مثال: جب سوار موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو مشاہدہ کرنے والا شخص دیکھے گا کہ موٹر سائیکل سوار اپنے اردگرد کی اشیا کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ جب وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار موشن کی حالت میں ہے۔

2- موشن کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔

جواب: عام طور پر اجسام کی موشن کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(i) ٹرانسلیٹری موشن (ii) روٹیٹری موشن (iii) وائبریٹری موشن

3- ٹرانسلیٹری موشن کی اقسام بیان کریں۔

جواب: ٹرانسلیٹری موشن تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ (i) لینیئر موشن (ii) رینڈم موشن (iii) سرکلر موشن

4- سکیلر کی تعریف کریں مثال بھی دیں۔

جواب: سکیلر ایک طبیعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر ظاہر کرنے کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔

مثالیں: ماس، فاصلہ، لمبائی، وقت، سپیڈ، انرجی اور ٹمپریچر سکیلر مقداریں ہیں۔

5- مثال کی مدد سے ویکٹر کی تعریف کریں۔

جواب: ویکٹر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر ظاہر کرنے کے لیے عددی قیمت کے ساتھ سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

مثالیں: ڈس پلیسمنٹ، ولاسٹی، ایکسٹریشن فورس اور وزن۔

6- مثال کی مدد سے ریسٹ کی تعریف کریں۔

جواب: ریسٹ: اگر کئی شے اپنے اردگرد کے حوالے سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو یہ ریسٹ کی حالت میں کہلاتی ہے۔

www.ilmkidunya.com

مثال: فرض کریں کہ ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر کھڑا ہے۔ کوئی شخص اسے دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اردگرد کی اشیا مثلاً قریبی عمارت، درخت یا کھنے کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار ریسٹ کی حالت میں ہے۔

-7 سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے کا رقبہ کس کے برابر ہوتا ہے؟

جواب سپیڈ۔ گراف کے نیچے وقت کے ایکسز تک کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔

-8 یکساں ایکسلریشن کی صورت میں حرکت کی مساواتیں لکھیں۔

جواب: (i) $v_f = v_i + at$ (ii) $S = v_i t + \frac{1}{2} at^2$ (iii) $2aS = v_f^2 - v_i^2$

-9 یکساں ولاسٹی کی تعریف کریں۔

جواب: کسی جسم کی ولاسٹی یکساں ہوتی ہے اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کا ڈس پلیسمنٹ یونیفارم ہو۔ خواہ وقت کے یہ وقفے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں۔

-10 فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ میں فرق بیان کریں۔

جواب: فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ میں فرق:

فاصلہ	ڈس پلیسمنٹ
• دو پوائنٹس کے درمیان راستہ کی لمبائی ان کے درمیان فاصلہ کہلاتی ہے۔	• دو پوائنٹس کے درمیان کم سے کم فاصلہ ڈس پلیسمنٹ کہلاتا ہے۔
• فاصلہ ایک سکیلر مقدار ہے۔	• ڈس پلیسمنٹ ایک ویکٹر مقدار ہے۔
• فاصلہ کو 'S' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔	• ڈی پلیسمنٹ کو d سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
• $S = v \times t$	• $d = v \times t$

-11 سپیڈ اور ولاسٹی میں فرق واضح کریں۔

جواب: سپیڈ اور ولائی میں فرق:

سپیڈ	ولاسٹی
• کسی جسم کے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ کو اس کی سپیڈ کہتے ہیں۔	• کسی جسم کا اکائی وقت میں کسی خاص سمت میں طے کردہ فاصلہ کو اس کی ولاسٹی کہتے ہیں۔
• سپیڈ ایک سکیلر مقدار ہے۔	• ولاسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے۔
• سپیڈ کا فارمولا ہے: $v = \frac{S}{t}$	• ولاسٹی کا فارمولا ہے: $v = \frac{d}{t}$

-12 ٹرمینل ولاسٹی کی تعریف کریں۔

جواب: جب کوئی جسم ہوا میں سے ہوتا ہوا زمین کی طرف گرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس جسم کا وزن اور ہوا کا دباؤ آپس میں برابر ہو کر ایک دوسرے کے اثر کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں اب جسم جس ولاسٹی سے نیچے آئے گا وہ اس کی ٹرمینل ولاسٹی کہلائے گی۔

-13 فاصلہ سکیلر مقدار ڈس پلیسمنٹ ویکٹر مقدار کیوں ہوتی ہے؟

جواب: فاصلہ سکیلر مقدار ہوتی ہے کیونکہ اس کے اظہار کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ڈس پلیسمنٹ ایک ویکٹر مقدار ہے کیونکہ

www.ilmkidunya.com

اس کے اظہار کے لیے عددی قیمت کے ساتھ سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

-14 پوزیٹیو اور نیگیٹیو ایکسلریشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: **پوزیٹیو ایکسلریشن:** کسی جسم کا ایکسلریشن پوزیٹیو ہوتا ہے اگر وقت کے ساتھ اس کی ولاسٹی بڑھ رہی ہو۔ پوزیٹیو ایکسلریشن کی سمت وہی ہوتی ہے جس میں جسم بغیر سمت تبدیل کیے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔

نیگیٹیو ایکسلریشن: کسی جسم کا ایکسلریشن نیگیٹیو ہوتا ہے۔ اگر وقت کے ساتھ اس کی ولاسٹی کم ہو رہی ہو۔ نیگیٹیو ایکسلریشن کی سمت کے مخالف ہوتی ہے جس میں جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے۔

-15 ایک عقاب 600m فاصلے سے زمین کی طرف غوطہ لگاتا ہے اگر اس کی اوسط سپیڈ $60ms^{-1}$ ہو تو یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے کتنا وقت لگے گا؟

جواب:

فاصلہ $= S = 600m$

اوسط $= v_{av} = 60ms^{-1}$

کل وقت $= t = ?$

مساوات استعمال کرتے ہوئے

$$v_{av} = \frac{S}{t}$$

قیمتیں درج کرنے سے

$$t = \frac{600}{60}$$

$$\boxed{t = 10\ s}$$

-16 گراف سے کیا مراد ہے؟

جواب: گراف مختلف مقداروں کے درمیان تعلق کے تصویری اظہار کا طریقہ ہے۔

-17 کس صورت میں گراف لائن افقی ہوتا ہے؟

جواب: اگر کوئی جسم ریسٹ کی حالت میں ہو تو گراف کی لائن افقی صورت میں ہوتی ہے۔

-18 کیا یکساں سپیڈ سے حرکت کرنے والے جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے؟

جواب: جی ہاں کو کونسٹنٹ سپیڈ سے حرکت کرنے والے جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سرکلر ٹریک پر حرکت کرتا ہے کیونکہ سرکلر ٹریک پر جسم کی حرکت کی سمت ہر لمحہ بدلتی ہے۔

-19 سپیڈ۔ وقت گراف کا گریڈیئنٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟

جواب: سپیڈ بمقابلہ وقت گراف کا گریڈیئنٹ جسم کے اوسط ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے۔

-20 $36\ kmh^{-1}$ کو ms^{-1} میں تبدیل کریں۔

جواب:

$$v = 36kmh^{-1} = \frac{36\times1000}{3600}ms^{-1}$$

$$v = 10\ ms^{-1}$$

www.ilmkidunya.com

-21 گریوی ٹیشن کے زیر اثر حرکت کرتے ہوئے اجسام کی موشن کی مساواتیں لکھیں۔

جواب: $v_f = v_i + gt$ (i)

$h = v_i t + \frac{1}{2} at^2$ (ii)

$2gh = v_f^2 - v_i^2$ (iii)

-22 کسی ایسے جسم کی مثال دیجیے جو بیک وقت ریسٹ اور موشن میں ہو۔

جواب: بس میں بیٹھا ہوا مسافر بس میں موجود دوسرے مسافروں اور چیزوں کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے لیکن بس کے باہر موجود کسی دوسرے شخص کے لحاظ سے بس میں موجود تمام مسافر موشن کی حالت میں ہے۔

www.ilmkidunya.com