

تجزی FACTORIZATION

تجزی

- ◀ مسئلہ باقی اور مسئلہ تجزی
- ◀ تین درجے والی کثیررقعی کی تجزی

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
◀ درج ذیل قسم کے جملوں کی تجزی کر سکیں۔

- I قسم $kx + ky + kz,$
- II قسم $ax + ay + bx + by,$
- III قسم $a^2 \pm 2ab + b^2,$
- IV قسم $a^2 - b^2,$
- V قسم $(a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2,$
- VI قسم $a^4 + a^2b^2 + b^4$ or $a^4 + 4b^4,$
- VII قسم $x^2 + px + q,$
- VIII قسم $ax^2 + bx + c,$
- IX قسم $\begin{cases} a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \\ a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3, \end{cases}$
- X قسم $a^3 \pm b^3,$

- ◀ مسئلہ باقی کا بیان اور اطلاق
- ◀ بغیر تقسیم کیے کسی کثیررقعی کو ایک درجی کثیررقعی سے تقسیم کرنے کے بعد جو باقی بچا معلوم کر سکیں۔
- ◀ کسی کثیررقعی میں صفر معلوم کر سکیں۔
- ◀ مسئلہ تجزی کا بیان اور مثالوں سے اس کی شناخت کر سکیں۔
- ◀ مسئلہ تجزی کے استعمال سے تین درجے والی کثیررقعی کی تجزی معلوم کر سکیں۔

2.1 جملوں کی تجزیہ: FACTORIZATION OF EXPRESSIONS

ایک درجہ کی کثیر رقمی: Linear Polynomials

ایسی کثیر رقمی جس کا درجہ '1' ہو، ایک درجہ کی کثیر رقمی کہلاتی ہے۔ مثلاً $2x - 5$ ، $x + 3$ وغیرہ۔ ایک درجہ کی کثیر رقمی کی عمومی شکل $ax + b$ ہے جبکہ a ، b حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ۔

دو درجہ کی کثیر رقمی: Quadratic Polynomials

ایسی کثیر رقمی جس کا درجہ '2' ہو، دو درجہ کی کثیر رقمی کہلاتی ہے۔ مثلاً $3x^2 + 5x - 2$ ، $4x^2 - 3x + 1$ وغیرہ۔ دو درجہ کی کثیر رقمی کی عمومی شکل $ax^2 + bx + c$ ہے۔ جبکہ a ، b ، c حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ۔

تین درجہ والی کثیر رقمی: Cubic Polynomials

ایسی کثیر رقمی جس کا درجہ '3' ہو، تین درجے والی کثیر رقمی کہلاتی ہے۔ مثلاً $x^3 - 3x^2 + 5x + 2$ ، $4x^3 + 5x^2 - 2$ وغیرہ۔ تین درجے والی کثیر رقمی کی عمومی شکل $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ہوتی ہے۔ جبکہ a ، b ، c ، d حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ۔

اگر $P(x)$ کوئی کثیر رقمی ہو اور a ، b ، c کوئی حقیقی اعداد ہوں جبکہ $P(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ $(x-a)$ ، $(x-b)$ ، $(x-c)$ ہر ایک $P(x)$ کا ایک درجہ کی جزو ضربی ہے۔

کسی بھی کثیر رقمی کو ایک درجہ کی کثیر رقموں کے حاصل ضرب یا اس کثیر رقمی کے درجہ سے کم درجہ والی کثیر رقموں کے حاصل ضرب کی صورت میں لکھنے کے عمل کو تجزیہ کرنا کہتے ہیں

ہم جانتے ہیں کہ $15 = 3 \times 5$ میں 15 کے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں۔ اس طرح $ax + ay = a(x + y)$ میں a ، $(x + y)$ ، $ax + ay + az = a(x + y + z)$ اور $ax + ay + az$ کے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں۔

کسی جملے کو اس کے اجزائے ضربی کے حاصل ضرب کی صورت میں لکھنے کے عمل کو تجزیہ کرنا کہتے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے جملوں کی تجزیہ کرتے ہیں۔

$kx + ky + kz$ کی شکل کے جملوں کی اجزائے ضربی

درج ذیل مثالوں سے اس قسم کے جملوں کی اجزائے ضربی کی وضاحت ہوگی۔

مثال 1:-

درج ذیل کے اجزائے ضربی بنائیے۔

(i) $3x + 12y$

(ii) $x^2 + xy$

(iii) $ad + dc + df$

(iv) $2pq + 6p^2q - 4p^3q$

حل:

(i) $3x + 12y = 3(x + 4y)$

(ii) $x^2 + xy = x(x + y)$

(iii) $ad + dc + df = d(a + c + f)$

(iv) $2pq + 6p^2q - 4p^3q = 2pq(1 + 3p - 2p^2)$

$ax + ay + bx + by$ کی قسم کے جملوں کی اجزائے ضربی

درج ذیل مثالوں سے اس قسم کے جملوں کی اجزائے ضربی کی وضاحت ہوگی۔

مثال 2:-

درج ذیل جملوں کی اجزائے ضربی کیجیے۔

(i) $2ax + bx + 6ay + 3by$

(ii) $2yx + 18y^2 - 3zx + 27zy$

(iii) $5ym + 15yn + 2zm + 6zn$

حل:

(i) $2ax + bx + 6ay + 3by$

$= x(2a + b) + 3y(2a + b)$

$= (2a + b)(x + 3y)$

$(2a + b)(x + 3y) = 2ax + bx + 6ay + 3by$ ہم پڑتال کرتے ہیں۔

(ii) $2yx + 18y^2 + 3zx + 27zy$

(iii) $5ym + 15yn + 2zm + 6zn$

$= 2y(x + 9y) + 3z(x + 9y)$

$= 5y(m + 3n) + 2z(m + 3n)$

$= (2y + 3z)(x + 9y)$

$= (5y + 2z)(m + 3n)$

$a^2 \pm 2ab + b^2$ کی شکل کے جملوں کی اجزائے ضربی

(i) $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ ہم جانتے ہیں کہ

(ii) $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

(i) اور (ii) کی بائیں جانب کے جملے مکمل مربع کہلاتے ہیں۔ یہ فارمولے، کچھ جملوں کی تجزی کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ درج ذیل مثالیں ایسے جملوں کی تجزی کی وضاحت کریں گی۔

مثال 3:-

درج ذیل کی تجزی کریں۔

(i) $x^2 + 6x + 9$ (ii) $t^2 - 12t + 36$

(i) $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2(3)(x) + 3^2$
 $= (x + 3)^2$

(ii) $t^2 - 12t + 36 = t^2 - 2(6)(t) + 6^2$
 $= (t - 6)^2$

حل:

$a^2 - b^2$ کی قسم کے جملوں کی تجزی معلوم کرنا۔

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ یہ دو مربعوں کا فرق کہلاتا ہے۔

درج ذیل مثالیں ایسے جملوں کی تجزی کی وضاحت کریں گی۔

مثال 4:-

درج ذیل کی تجزی کریں۔

(i) $k^2 - 81$ (ii) $9a^2 - (b + c)^2$

(i) $k^2 - 81 = k^2 - 9^2$
 $= (k + 9)(k - 9)$

(ii) $9a^2 - (b + c)^2 = (3a)^2 - (b + c)^2$
 $= [3a + (b + c)][3a - (b + c)]$
 $= [3a + b + c][3a - b - c]$

حل:

مثال 5:- تجزی کیجیے۔ $36d^2 - 1$

حل:

$$\begin{aligned} 36d^2 - 1 &= (6d)^2 - (1)^2 \\ &= (6d + 1)(6d - 1) \end{aligned}$$

مشق 2.1

تجزی کیجیے۔

1- $3a(x + y) - 7b(x + y)$

2- $ax + ay - x^2 - xy$

3- $a^3 + a - 3a^2 - 3$

4- $x^3 + y - xy - x$

5- $3ax + 6ay - 8by - 4bx$

6- $2a^2 - bc - 2ab + ac$

7- $a(a - b + c) - bc$

8- $8 - 4a - 2a^3 + a^4$

9- $16x^2 - 24xa + 9a^2$

10- $1 - 14x + 49x^2$

11- $20x^2 + 5 - 20x$

12- $2a^3b + 2ab^3 - 4a^2b^2$

13- $x^2 + x + \frac{1}{4}$

14- $x^2 + \frac{1}{x^2} - 2$

15- $5x^3 - 30x^2 + 45x$

16- $a^2 + b^2 + 2ab + 2bc + 2ac$

(i) $(a^2 + 2ab + b^2) - c^2$

(ii) $(a^2 - 2ab + b^2) - c^2$ کی قسم کے جملوں کی اجزائے ضربی

ان جملوں کی تجزی کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہوگی۔

مثال 1:-

تجزی کیجیے۔ $x^2 + 2xy + y^2 - 4z^2$

حل:

$$\begin{aligned} &(x^2 + 2xy + y^2) - 4z^2 \\ &= (x + y)^2 - (2z)^2 \\ &= (x + y - 2z)(x + y + 2z) \end{aligned}$$

مثال 2:-

اجزائے ضربی کی صورت میں لکھیے۔ $c^2 + 6bc + 9b^2 - 16x^2$

حل:

$$\begin{aligned} & (c^2 + 6bc + 9b^2) - 16x^2 \\ &= (c + 3b)^2 - (4x)^2 \\ &= (c + 3b + 4x)(c + 3b - 4x) \end{aligned}$$

مثال 3:-

تجزی کیجیے۔

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & a^2 - 2ab + b^2 - 9c^2 \\ \text{(ii)} \quad & x^2 - 6xy + 9y^2 - 4z^2 \end{aligned}$$

حل:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad a^2 - 2ab + b^2 - 9c^2 &= a^2 - 2ab + b^2 - 9c^2 \\ &= (a - b)^2 - (3c)^2 \\ &= (a - b - 3c)(a - b + 3c) \\ \text{(ii)} \quad x^2 - 6xy + 9y^2 - 4z^2 &= x^2 - 2(3)xy + 9y^2 - 4z^2 \\ &= (x - 3y)^2 - (2z)^2 \\ &= (x - 3y - 2z)(x - 3y + 2z) \end{aligned}$$

$$\text{(i)} \quad a^4 + a^2b^2 + b^4$$

$$\text{(ii)} \quad a^4 + 4b^4 \quad \text{کی شکل کے جملوں کی تجزی}$$

مثال 4:-

تجزی کیجیے۔ $x^4 + x^2 + 1$

حل:

$$\begin{aligned} x^4 + x^2 + 1 &= x^4 + x^2 + 1 + x^2 - x^2 \\ &= (x^4 + 2x^2 + 1) - x^2 \\ &= (x^2 + 1)^2 - x^2 \\ &= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) \end{aligned}$$

مثال 5:-

تجزی کیجیے۔ $x^4 + 64$

$$\begin{aligned}
 x^4 + 64 &= (x^2)^2 + 8^2 + 2(8)x^2 - 2(8)x^2 \\
 &= (x^2 + 8)^2 - 16x^2 \\
 &= (x^2 + 8)^2 - (4x)^2 \\
 &= (x^2 + 8 + 4x)(x^2 + 8 - 4x)
 \end{aligned}$$

مثال 6:-

اجزائے ضربی لکھیے۔ $x^4 + x^2y^2 + y^4$

$$\begin{aligned}
 x^4 + x^2y^2 + y^4 &= (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) - x^2y^2 \\
 &= (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2 \\
 &= (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy)
 \end{aligned}$$

مشق 2.2

جز و ضربی بنائیے۔

1. $x^2 + 2xy + y^2 - a^2$

2. $4a^2 + 4ab + b^2 - 9c^2$

3. $x^2 + 6ax + 9a^2 - 16b^2$

4. $y^2 - c^2 + 2cx - x^2$

5. $x^2 + y^2 + 2xy - 4x^2y^2$

6. $a^2 - 4ab + 4b^2 - 9a^2c^2$

7. $x^2 - 2xy + y^2 - a^2 + 2ab - b^2$

8. $y^4 + 4$

9. $z^4 + 64y^4$

10. $x^4 + 324$

11. $z^4 - z^2 + 16$

12. $4x^4 - 5x^2y^2 + y^4$

$x^2 + px + q$ کی شکل کے جملوں کی تجزی

$$x^2 + px + q = (x + r)(x + s) \quad \text{فرض کیا}$$

$$x^2 + px + q = x^2 + (r + s)x + rs \quad \text{تب}$$

دونوں اطراف ایک جیسی رقموں کے عددی سروں کا موازنہ کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$r + s = p \quad \text{اور} \quad rs = q$$

پس $x^2 + px + q$ کی اجزائے ضربی لکھنے کے لیے ہمیں دو نمبروں 'r' اور 's' کی قیمت معلوم کرنا ہے۔ اس طرح کہ

$$-rs = q \quad \text{اور} \quad r + s = p$$

درج ذیل مثالیں اس طرح کے جملوں کی تجزی کی وضاحت ہوگی۔

مثال:-

تجزی کیجیے۔

$$(i) x^2 + 7x + 12 \quad (ii) x^2 + 4x - 21 \quad (iii) x^2 - 5x - 14$$

حل:

(i) $x^2 + 7x + 12$ کی تجزی کرنے کے لیے ہمیں 'r' اور 's' کی قیمتیں معلوم کرنا ہوں گی۔ جبکہ

$$r + s = 7 \quad \text{اور} \quad rs = 12$$

$$4 + 3 = 7 \quad \text{اور} \quad 4 \times 3 = 12 \quad \text{صاف ظاہر ہے کہ}$$

$$\therefore x^2 + 7x + 12 = x^2 + 4x + 3x + 12$$

$$= x(x + 4) + 3(x + 4)$$

$$= (x + 4)(x + 3)$$

(ii) $x^2 + 4x - 21$ کی تجزی کرنے کے لیے ہمیں 'r' اور 's' کی قیمتیں معلوم کرنا ہوں گی جبکہ

$$r + s = 4 \quad \text{اور} \quad rs = -21$$

$$7 + (-3) = 4 \quad \text{اور} \quad 7(-3) = -21 \quad \text{صاف ظاہر ہے کہ}$$

$$\therefore x^2 + 4x - 21 = x^2 + 7x - 3x - 21$$

$$= x(x + 7) - 3(x + 7)$$

$$= (x + 7)(x - 3)$$

(iii) $x^2 - 5x - 14$ کی اجزائے ضربی معلوم کرنے کے لیے 'r' اور 's' کی قیمتیں معلوم کرنا ہوگی جبکہ

$$r + s = -5 \quad \text{اور} \quad rs = -14$$

$$-7 + 2 = -5 \quad \text{اور} \quad -7 \times 2 = -14 \quad \text{صاف ظاہر ہے کہ}$$

$$\therefore x^2 - 5x - 14 = x^2 - 7x + 2x - 14$$

$$= x(x-7) + 2(x-7)$$

$$= (x-7)(x+2)$$

شکل کے جملوں کی اجزائے ضربی معلوم کرنا۔ $ax^2 + bx + c, a \neq 0$

$ax^2 + bx + c$ کے شکل کے جملے کی تجزی کرنے کے لیے اعداد 'p' اور 'q' اس طرح سے معلوم کرتے ہیں۔

کہ $p + q = b$ اور $pq = ac$ جبکہ a, b, c مستقل مقداریں اور $a \neq 0$ ۔

مندرجہ ذیل مثالیں اس طرح کے جملوں کی تجزی کی وضاحت کریں گی۔

مثال :- تجزی کیجیے۔

$$(i) 6x^2 + 7x - 3 \quad (ii) \sqrt{3}x^2 + 11x + 6\sqrt{3}$$

حل :

$$(i) 6x^2 + 7x - 3 \text{ دیا گیا جملہ}$$

$$ax^2 + bx + c, ac = 6 \times (-3) = -18$$

$$\therefore 6x^2 + 7x - 3 = 6x^2 + 9x - 2x - 3$$

$$= 3x(2x + 3) - 1(2x + 3)$$

$$= (2x + 3)(3x - 1)$$

$$(ii) \sqrt{3}x^2 + 11x + 6\sqrt{3}; ac = \sqrt{3} \times 6\sqrt{3} = 18$$

$$9 + 2 = 11 \text{ صاف ظاہر ہے۔}$$

$$\therefore \sqrt{3}x^2 + 11x + 6\sqrt{3} = \sqrt{3}x^2 + 9x + 2x + 6\sqrt{3}$$

$$= \sqrt{3}x[x + 3\sqrt{3}] + 2[x + 3\sqrt{3}]$$

$$= (\sqrt{3}x + 2)(x + 3\sqrt{3})$$

$6 \times (-3) = -18$
ممكن جز
$18 \times (-1) = -18$
$(-18) \times (1) = -18$
$6 \times (-3) = -18$
$-6 \times 3 = -18$
$-9 \times 2 = -18$
$9 \times (-2) = -18$
منتخب شدہ جز
$9 \times (-2) = -18$

مشق 2.3

اجزائے ضربی بنائیے۔

1. $x^2 + 9x + 20$

2. $x^2 + 5x - 14$

3. $x^2 + 5x - 6$

4. $x^2 - 7x + 12$

5. $x^2 - x - 156$

6. $x^2 - x - 2$

7. $x^2 - 9x - 90$

8. $a^2 - 12a - 85$

9. $98 - 7x - x^2$

10. $y^2 - 11y - 152$

11. $2x^2 + 3x + 1$

12. $3x^2 + 5x + 2$

13. $2x^2 - x - 1$

14. $6x^2 + 7x - 3$

15. $2 - 3x - 2x^2$

16. $8 + 6x - 5x^2$

17. $3u^2 - 10u + 8$

18. $10x^2 - 7x - 12$

19. $5x^2 - 32x + 12$

20. $4\sqrt{3}x^2 + 5x - 2\sqrt{3}$

$$\left\{ \begin{array}{l} a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \end{array} \right\}$$

(i) $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ ہم جانتے ہیں کہ

(ii) $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

درج ذیل مثالیں اس قسم کے جملوں کی تجزی کی وضاحت کریں گی۔

مثال:- تجزی کیجیے۔ (i) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ (ii) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

(i) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x)^3 + 3(2)(x)^2 + 3(2)^2x + (2)^3$
 $= (x+2)^3$

(ii) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = (x)^3 - 3(2)(x)^2 + 3(2)^2x - (2)^3$
 $= (x-2)^3$

\$a^3 \pm b^3\$ کی قسم کے جملوں کی تجزی

ہمیں معلوم ہے کہ

$$(i) \quad a^3 + b^3 = (a+b) (a^2 - ab + b^2)$$

$$(ii) \quad a^3 - b^3 = (a-b) (a^2 + ab + b^2)$$

مندرجہ ذیل مثالوں سے اس قسم کے جملوں کی وضاحت کریں گی۔

مثال 1:

تجزی کیجیے۔

$$(i) \quad x^3 + 27 \quad (ii) \quad 8a^3 - 125b^3 \quad (iii) \quad x^6 - y^6 \quad (iv) \quad a^3 - b^3 - a + b$$

حل:

$$\begin{aligned} (i) \quad x^3 + 27 &= x^3 + 3^3 \\ &= (x+3) (x^2 - 3x + 9) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad 8a^3 - 125b^3 &= (2a)^3 - (5b)^3 \\ &= (2a-5b) [(2a)^2 + (2a) \times (5b) + (5b)^2] \\ &= (2a-5b) [4a^2 + 10ab + 25b^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (iii) \quad x^6 - y^6 &= (x^3)^2 - (y^3)^2 \\ &= (x^3 + y^3) (x^3 - y^3) \\ &= (x+y) (x^2 - xy + y^2) (x-y) (x^2 + xy + y^2) \\ &= (x+y) (x-y) (x^2 - xy + y^2) (x^2 + xy + y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (iv) \quad a^3 - b^3 - a + b &= (a^3 - b^3) - (a - b) \\ &= (a-b) (a^2 + ab + b^2) - (a-b) \\ &= (a-b) [a^2 + ab + b^2 - 1] \end{aligned}$$

یاد رکھیے:

(i) $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$

(ii) $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

(iii) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$

(iv) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3$

(v) $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$

(vi) $(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$

مشق 2.4

تجربہ کیجیے۔

1. $8x^3 - y^3$

2. $27x^3 + 1$

3. $1 - 343x^3$

4. $a^3b^3 + 512$

5. $27 - 1000y^3$

6. $27x^3 - 64y^3$

7. $x^3y^3 + z^3$

8. $216P^3 - 343$

9. $8x^3 - \frac{1}{27}$

10. $a^3 + b^3 + a + b$

11. $a - b - a^3 + b^3$

12. $x - 8xy^3$

13. $x^{12} - y^{12}$

14. $1 - \frac{64p^3}{q^3}$

15. $1 + 64U^3$

16. $8x^3 - 6x - 9y + 27y^3$

17. $z^3 + 125$

18. $x^9 + y^9$

19. $m^6 - n^6$

20. $64x^7 - xa^6$

21. $x^3 - 27a^3$

22. $x^3 + 27a^3$

2.2 مسئلہ باقی اور مسئلہ تجزی:

REMAINDER THEOREM AND FACTOR THEOREM

ایک تفاعل (function) کو درج ذیل مساوات سے متعارف کرایا گیا ہے۔

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

جس میں 'n' ایک غیر منفی صحیح عدد ہے اور تمام عددی سر، مستقل مقداریں ہیں۔ ایسا تفاعل درجہ 'n' کی کثیررتبی کہلاتا ہے۔

مثلاً (i) $P(x) = a_1 x + a_0$ (ایک درجہ کثیررتبی تفاعل ہے) $a_1 \neq 0$

(ii) $P(x) = 3x^2 + 5x + 11$ (دو درجہ کثیررتبی تفاعل ہے)

(iii) $P(x) = 7x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 5x + 6$ (5 درجہ کثیررتبی تفاعل ہے)

(iv) $P(x) = 5x^5 + \frac{7}{x} + 6 = 5x^2 + 7x^{-1} + 6$ (یہ تفاعل کثیررتبی نہیں ہے)

مثال :-

$P(x) = 2x^4 + 3x^3 - x - 5$ کو $x + 2$ سے تقسیم کیجیے۔

حل:

	$2x^3 - x^2 + 2x - 5$	← حاصل قسمت			
تقسیم کنندہ	$\rightarrow x + 2$	$\left \begin{array}{r} 2x^4 + 3x^3 - x - 5 \\ \underline{\pm 2x^4 \pm 4x^3} \\ -x^3 - x - 5 \\ \underline{\mp x^3 \mp 2x^2} \\ 2x^2 - x - 5 \\ \underline{\pm 2x^2 \pm 4x} \\ -5x - 5 \\ \underline{\mp 5x \mp 10} \\ 5 \end{array} \right.$	← مقوم علیہ	$\leftarrow$	باقی

یاد رکھیے کہ: باقی + حاصل قسمت $\times$ تقسیم کنندہ = مقوم علیہ

2.2.1 مسئلہ باقی The Remainder Theorem

اگر کسی کثیر رقمی $P(x)$ کو $x - a$ پر تقسیم کرنے سے R باقی بچے تو $P(a) = R$

یا

اگر کثیر رقمی $P(x)$ جس کا درجہ $n \geq 1$ ہو تو $x - a$ سے تقسیم کیا جائے جبکہ 'a' ایک مستقل مقدار ہو تو باقی $P(a)$ ہوتا ہے۔ جبکہ اس میں x رکھنے والی رقم نہ بچے۔

مثال 1:-

اگر $P(x) = 4x^4 + 10x^3 + 19x + 5$ کو $x+3$ پر تقسیم کیا جائے تو باقی معلوم کریں۔

$$P(x) = 4x^4 + 10x^3 + 19x + 5$$

حل:

$$x - a = x + 3 \Rightarrow a = -3$$

$$P(-3) = 4(-3)^4 + 10(-3)^3 + 19(-3) + 5 \quad \text{لہذا}$$

$$= 4 \times 81 - 10 \times 27 - 57 + 5$$

$$= 324 - 270 - 57 + 5$$

$$= -3 + 5$$

$$P(-3) = 2 \quad \text{پس}$$

$$\boxed{R = 2}$$

مثال 2:-

اگر $P(x) = 5x^4 + 14x^3 + 3x^2 - 5x - 3$ کو $x - 1$ سے تقسیم کیا جائے تو باقی معلوم کریں۔

$$P(x) = 5x^4 + 14x^3 + 3x^2 - 5x - 3$$

حل:

$$x - a = x - 1 \Rightarrow a = 1$$

$$P(1) = 5(1)^4 + 14(1)^3 + 3(1)^2 - 5(1) - 3 \quad \text{لہذا}$$

$$= 5 + 14 + 3 - 5 - 3$$

$$= 14$$

$$P(1) = 14 \quad \text{پس}$$

$$\boxed{R = 14}$$

2.2.2 تقسیم کے بغیر باقی معلوم کرنا Finding Remainder Without Dividing

درج ذیل مثالوں میں ہم بغیر تقسیم کے باقی نکالنا سیکھتے ہیں۔ جبکہ کسی کثیررقمی کو ایک درجی کثیررقمی سے تقسیم کیا جائے۔

مثال 1:-

مسئلہ باقی کا استعمال کرتے ہوئے باقی معلوم کریں جبکہ پہلی کثیررقمی کو دوسری کثیررقمی سے تقسیم کیا جائے۔

(i) $x^2 + 3x + 7, x + 1$

(ii) $x^3 - 2x^2 + 3x + 3, x - 3$

$P(x) = x^2 + 3x + 7$

(i) فرض کیا

چونکہ $x + 1 =$ تقسیم کنندہ

$x - a = x + 1 \Rightarrow a = -1$ لہذا

مسئلہ باقی کی رو سے

$R = P(-1)$

$P(-1) = (-1)^2 + 3(-1) + 7$

$= 1 - 3 + 7$ اب

$R = 5$

(ii) فرض کیا $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 3$

$x - a = x - 3 \Rightarrow a = 3$

$R = P(3)$

اب $P(3) = (3)^3 - 2(3)^2 + 3(3) + 3$

$= 27 - 18 + 9 + 3$

$R = 21$

مثال 2:-

جب $x^4 + 2x^3 + kx^2 + 3$ کو $x - 2$ سے تقسیم کیا جاتا ہے تو باقی بچتا ہے 'k' کی قیمت معلوم کریں۔

فرض کیا $P(x) = x^4 + 2x^3 + kx^2 + 3$

چونکہ $x - 2 =$ تقسیم کنندہ

لہذا $x - a = x - 2 \Rightarrow a = 2$

$$P(2) = (2)^4 + 2(2)^3 + k(2)^2 + 3$$

$$= 16 + 16 + 4k + 3 = 35 + 4k$$

بہاؤیہ پالیٹیکٹ... سید یارانی شیڈول... (دیکھو) $P(2) = 1$...

$$1 = 35 + 4k \Rightarrow 4k = -34 \Rightarrow k = \frac{-17}{2}$$

2.2.3 **Zeros of a Polynomial** **کثیر رقمی کے صفر**

$$x - x, x + x, x^2 - x \quad (ii) \quad 1 + x, x + x, x + x \quad (i)$$

اگر $P(x) = x - a_1$ اور $Q(x) = x - a_2$ کوئی سی یک درجہ کثیر رقمیاں ہوں اس طرح کہ $P(a_1) = 0$ اور $Q(a_2) = 0$ تو a_1, a_2 بالترتیب $P(x)$ اور $Q(x)$ کے صفر کہلاتے ہیں۔

$$1 - x = 0 \Leftrightarrow 1 + x = 0 - x$$

2.2.4 **The Factor Theorem** **مسئلہ تجزیہ**

$$(1-x) = 0$$

اگر کثیر رقمی $P(x)$ کے لیے $P(a) = 0$ ہو تو $P(x) = (x - a)Q(x)$ کا جزو ضربی ہوتا ہے۔

اس کے برعکس اگر $P(x) = (x - a)Q(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $P(a) = 0$ کا صفر ہوگا۔

مثال 1:-

$$(ii) \quad x^3 - 4x^2 + 4x - 1 = (x-1)Q(x)$$

مسئلہ تجزیہ سے معلوم کریں کہ پہلی کثیر رقمی دوسری کثیر رقمی کا جزو ضربی ہے یا نہیں؟

$$x - 1, \quad x^2 + 4x - 5 \quad (i) \quad Q(x) = 0$$

$$P(x) = x^2 + 4x - 5 = (x-1)Q(x) \quad \text{فرض کیا}$$

حل:

$$x + \frac{0}{x} = \frac{81 - 75}{x - 1} \quad \text{اور}$$

$$\Rightarrow a = 1$$

$$P(1) = 1^2 + 4(1) - 5$$

$$1 + 4 - 5 = 0 \Rightarrow 1 + 4 - 5 = 0$$

$$x^3 - 4x^2 + 4x - 1 = (x-1)Q(x) \quad \text{یا}$$

$$= 0$$

$$P(1) = 0 \quad \text{چونکہ}$$

لہذا مسئلہ تجزیہ کی رو سے $x - 1$ ، $x^2 + 4x - 5$ کا جزو ضربی ہے۔

مثال 2:- مسئلہ تجزی کے استعمال سے ثابت کیجیے کہ $P(x) = x^{25} + 1$ ، $x + 1$ کا جزو ضربی ہے۔

حل: قیمت درج کرنے سے پتا چلتا ہے کہ -1 ، $P(x)$ کا صفر ہے۔

$$P(x) = x^{25} + 1$$

$$\begin{aligned} P(-1) &= (-1)^{25} + 1 \quad \therefore (-1) \text{ طاق} = -1 \\ &= -1 + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

چونکہ -1 ، $P(x) = x^{25} + 1$ کا صفر ہے۔

$$x - (-1) = x + 1 \quad \text{لہذا ایک درجی کثیررتی}$$

مسئلہ تجزی کی رو سے کثیررتی $x^{25} + 1$ کا جزو ضربی ہے۔

مثال 3:- مسئلہ تجزی استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $4x^7 - 2x^6 + x^2 + 2x + 5$ ، $x - 1$ کا جزو ضربی نہیں ہے۔

حل: فرض کیا کہ $P(x) = 4x^7 - 2x^6 + x^2 + 2x + 5$

$$x - a = x - 1 \Rightarrow a = 1$$

$$\begin{aligned} P(1) &= 4(1)^7 - 2(1)^6 + 1^2 + 2(1) + 5 \\ &= 4 - 2 + 1 + 2 + 5 \\ &= 10 \neq 0 \end{aligned}$$

پس $4x^7 - 2x^6 + x^2 + 2x + 5$ ، $x - 1$ کا جزو ضربی نہیں ہے۔

مثال 4:- مسئلہ تجزی کے استعمال سے ثابت کریں کہ $2x^5 - 5x^2 - x + 4$ ، $x + 1$ کا جزو ضربی نہیں ہے۔

حل: چونکہ $P(x) = 2x^5 - 5x^2 - x + 4$

$$x - a = x + 1 \Rightarrow a = -1$$

$$\begin{aligned} P(-1) &= 2(-1)^5 - 5(-1)^2 - (-1) + 4 \\ &= -2 - 5 + 1 + 4 \end{aligned}$$

$$P(-1) = -2 \neq 0$$

پس $2x^5 - 5x^2 - x + 4$ ، $x + 1$ کا جزو ضربی نہیں ہے۔

2.3 تین درجہ کثیررتبی کی تجزی کرنا: FACTORIZING A CUBIC POLYNOMIAL

کسی تین درجہ کثیررتبی کی تجزی سمجھنے کے لیے ہم درج ذیل مثالوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔

مثال 1:- درج ذیل کی تجزی کیجیے۔ $x^3 - x^2 - 10x + 10; x - 1$

حل:

$$P(x) = x^3 - x^2 - 10(x) + 10; x - 1$$

$$x - a = x - 1 \Rightarrow a = 1$$

$$P(1) = 1^3 - 1^2 - 10 + 10$$

$$= 0 \quad \text{لہذا } x - 1, P(x) \text{ کا } \sqrt{\text{ضرب}} \text{ ہے۔}$$

$$x^2 - 10$$

$$x - 1 \overline{) x^3 - x^2 - 10x - 10} \quad \text{اب}$$

$$\underline{\pm x^3 \mp x^2}$$

$$-10x + 10$$

$$\underline{\mp 10x \pm 10}$$

$$0$$

$$P(x) = \text{تقسیم کنندہ} \times \text{حاصل قسمت}$$

$$x^3 - x^2 - 10x + 10 = (x^2 - 10)(x - 1) \quad \text{پس}$$

مثال 2:- $x^3 - 8$ کی تجزی کیجیے جبکہ $x - 2$ ضربی ہو۔

حل:

$$P(x) = x^3 - 8, x - a = x - 2 \Rightarrow a = 2$$

$$P(2) = 2^3 - 8 = 8 - 8$$

$$= 0 \quad \text{پس } x - 2, P(x) \text{ کا } \sqrt{\text{ضرب}} \text{ ہے۔}$$

$$x^2 + 2x + 4$$

$$x - 2 \overline{) x^3 - 8} \quad \text{اب}$$

$$\underline{\pm x^3 \mp 2x^2}$$

$$2x^2 - 8$$

$$\underline{\pm 2x^2 \mp 4x}$$

$$4x - 8$$

$$\text{پس } P(x) = x^3 - 8$$

$$= (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

$$\underline{\pm 4x \mp 8}$$

$$0$$

مشق 2.5

I- دی گئی قیمت کے لیے کثیررتی کی قیمت معلوم کریں۔

1. $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 7x - 7$; $P(2)$
2. $P(x) = x^4 - 10x^2 + 25x - 2$; $P(-4)$
3. $P(x) = x^4 + 5x^3 - 13x^2 - 30$; $P(-1)$
4. $P(x) = x^5 - 10x^3 + 7x + 6$; $P(3)$
5. $P(x) = x^4 + 4x^3 - 9x^2 + 19x + 6$; $P(-2)$

II- تقسیم کیے بغیر معلوم کریں کہ دوسری کثیررتی، پہلی کثیررتی کا جزو ضربی ہے یا نہیں۔

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 6. $x^{18} - 1$; $x + 1$ | 7. $x^{18} - 1$; $x - 1$ |
| 8. $x^9 - 2^9$; $x + 2$ | 9. $x^9 + 2^9$; $x - 2$ |
| 10. $3x^4 - 2x^3 + 5x - 6$; $x - 1$ | 11. $5x^6 - 7x^3 - 6x + x$; $x - 1$ |
| 12. $3x^3 - 7x^2 - 8x + 2$; $x + 1$ | 13. $5x^8 - 2x^5 + 3x^3 + 6x + 2$; $x + 1$ |
| 14. $6x^3 + 2x^2 - x + 9$; $x - 1$ | 15. $4x^3 - 3x^2 - 8x + 4$; $x - 2$ |
| 16. $5x^3 + 3x^2 - x + 1$; $x + 1$ | 17. $2y^3 - 8y^2 + y - 4$; $y - 4$ |
| 18. $z^3 - 5z^2 - 4z - 4$; $z + 2$ | |

III- حل کریں۔

19. اگر $P(x) = x^3 - kx^2 + 3x + 5$ کو $x - 1$ پر تقسیم کرنے سے 8 باقی بچتا ہو تو 'k' کی قیمت معلوم کریں۔
20. اگر $P(x) = 3x^3 + kx - 26$ کو $x - 2$ پر تقسیم کرنے سے 0 باقی بچتا ہو تو 'k' کی قیمت معلوم کریں۔

جائزہ مشق-2

I- درست جوابات پر دائرہ لگائیے۔

1. ایک درجی کثیررقعی کا درجہ ہوتا ہے۔

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) 3

2. درجہ کثیررقعی کا درجہ ہوتا ہے۔

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) 3

3. درجہ کثیررقعی کا درجہ ہوتا ہے۔

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) 3

II- صحیح جواب پر دائرہ لگائیے۔

4. $(x+3)^2 - 4$ کی تجزی ہے۔

(a) $(x+1)(x+5)$

(c) $(x+1)(x-5)$

(b) $(x-1)(x+5)$

(d) $(x-1)(x-5)$

5. $x^4 - 16$ کی تجزی ہے۔

(a) $(x+2)(x-2)(x^2+4)$

(c) $(x-2)(x+2)(x^2+4)$

(b) $(x-4)(x+4)(x^2+4)$

(d) $(x-2)(x+4)$

6. $x^3 - y^3$ کی تجزی ہے۔

(a) $(x-y)(x^2+xy+y^2)$

(c) $(x-y)(x^2-xy+y^2)$

(b) $(x-y)(x^2+xy+y^2)$

(d) $(x+y)(x^2+xy+y^2)$

7. $a^4 - 1$ کی تجزی ہے۔

(a) $(a-1)(a+1)(a^2+1)$

(c) $(a+1)(a^2-1)$

(b) $(a-1)(a^2+1)(a+1)$

(d) $(a^2+1)(a+1)$

III- صحیح جواب پر دائرہ لگائیے۔

8. اگر کثیررقعی $P(x)$ جس کا درجہ $n \geq 1$ ہے کہ کثیررقعی $x-a$ سے تقسیم کیا جائے، جبکہ a ایک مستقل مقدار ہے۔ تو $P(a)$ کی قیمت ہوگی۔

(a) 1

(c) 1

(b) a

(d) a

9. اگر $P(x) = x - a$ کا Z وضرب ہو تو

(a) 0

(b) 1

(c) a (d) $-a$

10. اگر $P(x) = x^2 + 5x + 1$ ہو تو $P(1)$ ہوگا

(a) 5

(b) -5

(c) 7 (d) 0

$$x^3 + x^2 + x + 1 \pm (x^3 + x^2 + x + 1) = 0$$

II- خالی جگہوں کو پُر کیجیے $(x^3 + x^2 + x + 1) \pm (x^3 + x^2 + x + 1) = 0$

1. ایک درجی کثیررتبی کا درجہ ہوتا ہے $x + 1$

$$x^3 + x^2 + x + 1 \pm (x^3 + x^2 + x + 1) = 0$$

2. دو درجی کثیررتبی کا درجہ ہوتا ہے

3. $n - x$ کے ساتھ $1 \leq n$ جہاں $P(x)$ کے بقایا

$$P(n) = 0$$

4. $x^2 - 9$ کی تجزی $(x - 3)(x + 3)$ ہے

5. $(x + 2)^2 - 1$ کی تجزی

6. $x^3 + 8$ کی تجزی

7. $x^3 - 8$ کی تجزی

8. اگر $P(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ ہو تو $P(1) =$

9. اگر $P(x) = x^3 + 3x^2 - 3x + 1$ ہو تو $P(-2) =$

10. اگر $P(x) = x^3 - a^3$ ہو تو $P(a) =$

خلاصہ SUMMARY

ایک درجہ کی کثیررتی: ایسی کثیررتی جس کا درجہ "1" ہو ایک درجہ کی کثیررتی کہلاتی ہے۔
 دو درجہ کی کثیررتی: ایسی کثیررتی جس کا درجہ "2" ہو دو درجہ کی کثیررتی کہلاتی ہے۔
 سہ درجہ کی کثیررتی: ایسی کثیررتی جس کا درجہ "3" ہو سہ درجہ کی کثیررتی کہلاتی ہے۔
 درجہ ذیل قسم کی کثیررتیوں کی تجزی کرنا۔

$$kx + ky + kz, ax + ay + bx + by, a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2, (a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2, a^4 + a^2b^2 + b^4 \text{ یا } a^4 + 4b^4,$$

$$x^2 + px + q, ax^2 + bx + c,$$

$$a^3 + 3a^2bx + 3ab^2 + b^3, a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3,$$

$$a^3 \pm b^3.$$

مسئلہ باقی: اگر $P(x)$ کثیررتی جس کا درجہ $n \geq 1$ ہو تو کثیررتی ' $x-a$ ' سے تقسیم کیا جائے جبکہ ' a ' کوئی مستقل ہے،
 تو باقی $P(a)$ ہوگا۔

مسئلہ تجزی: اگر کثیررتی $P(x)$ کو ' $x-a$ ' سے تقسیم کیا جائے کہ $P(a) = 0$ تو ' $x-a$ '، $P(x)$ کا جزو ضربی ہوتا ہے۔