

دوروزی مسافرت ہے مصلحتی ہے روزمرہ زندگی کے مسائل حل

— ۱۱۱ —

سر خنجه سرتهد لاله كز تار و تنه « قوت استج » ➤

الحمد لله رب العالمين

مذہب، عقائد، مذاہب، مذہبی عقائد، مذہبی عقائد

۱۰۸

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

 $\diamond \frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ α_2, β_2

وہی ہے جس نے

جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے،

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”

سورۃ الاحزاب ۱۰۰ آیت

(۴) ہم، کہتے ہیں، اسی پر ہی، اور، اس میں،

[illegible]

بجائے کہ ۱۳۱۳ء، جو مغل ۱۱۱۱ء

۱- هر چه بیشتر در مورد خداوند بدانیم، بیشتر به او نزدیک شویم.

[illegible]

۱۰

[illegible]

تہذیب و تمدن کی تاریخ

۱۹۱۰

[illegible]

بہارِ مستقیمہ کے لئے اس کی دعا ہے

- ستر کر مچھو کر رکھیں۔

و در دو بی نظایر $(b^2 - 4ac)$ ک برقی کنده $+c$

Student Learning Outcomes (SLOs)

www.ck12.org

211

تجارت



$$(III) \quad 0 = \zeta + x_6 - \tau x \quad (VI) \quad 1 - x_9 = \tau x_6$$

چند

20.1. (iv) جسکی صورت مساوی کے لئے کسی نوعیت کے مساوی کر کے حاصل کر کے تصدیق کرنا۔

iv. $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, اور a, b, c کے

iii. اگر $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ، تو

ii. اگر $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, تو

i. $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, اگر

۱- اہل بیت علیہ السلام - ۲- اہل بیت علیہ السلام - ۳- اہل بیت علیہ السلام

$$b^2 - 4ac = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})x_1 + (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})x_2 + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac. \text{ (nature of roots)} \text{ اگر } \Delta > 0, \text{ تو دو حقیقی و متمایز roots ہوں گے، اگر } \Delta = 0, \text{ تو دو حقیقی و مساوی roots ہوں گے، اگر } \Delta < 0, \text{ تو دو غیر حقیقی roots ہوں گے۔}$$

20.1. (iii) ذریعہ کے ذریعہ (roots) کے ذریعہ (iii) 20.1.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (5)^2 - 4(2)(-4) = 25 + 32 = 57$$

۱۰

$$c = -4, b = 5, a = 2 \quad \text{OK}$$

$$\therefore 2x^2 + 5x - 4 = 0$$

مثلاً $2x^2 + 5x - 4 = 0$

$$0 \neq v, c + xq + xv$$

۴- مساویات $b^2 - 4ac$ (complex) (Real) کی حقیقی اور کیمیائی

$$b^2 - 4ac \geq 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

20.1. (iii) دی گئی صورت میں مساویاتی کنیدہ مضبوط کرنا۔

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$D \subset \mathbb{R}^n \text{ is a domain, } \Delta u = 0 \text{ in } D, u = 0 \text{ on } \partial D, \text{ then } u \equiv 0 \text{ in } D.$$

دور درازی کا خزانہ

۱۔ مولانا شبیر حسین قادری، اہل حق اور اہل حقہ کے

$$x^q + x^{q^2} + \dots + x^{q^{n-1}} = 0 \quad (0 \neq v) \text{ } \square$$

20.1 (i) $b^2 - 4ac \geq 0$, $a \neq 0$, $ax^2 + bx + c = 0$ has real roots.

Nature of the Roots of a Quadratic Equation: "درستی مساوی کر کے دو کئی نوعیت" 20.1



$$\Rightarrow \begin{aligned} x &= \frac{3}{1} \\ x &= \frac{3}{1} \\ 3x - 1 &= 0 \\ 3x - 1 &= 0 \\ (3x)^2 - 2(3x)(1) + (1)^2 &= 0 \\ 9x^2 - 6x + 1 &= 0 \end{aligned}$$

چندال

$$\Rightarrow \begin{aligned} \Delta &= 0, \\ \Delta &= 36 - 36 \\ \Delta &= (6)^2 - 4(9)(1) \\ \Delta &= b^2 - 4ac \\ c &= 1, b = -6, a = 9, \\ 9x^2 - 6x + 1 &= 0 \\ 9x^2 - 6x - 1 &= 0 \quad (iv) \end{aligned}$$

طی

$$\begin{aligned} x &= \frac{-3 \pm \sqrt{61}}{2} \\ x &= \frac{9 \pm \sqrt{81 - 20}}{2} \\ x^2 - 9x + 5 &= 0, \end{aligned}$$

چندال

$$\Rightarrow \begin{aligned} \Delta &= 61 > 0, \\ \Delta &= 81 - 20 \\ \Delta &= (-9)^2 - 4(1)(5) \\ \Delta &= b^2 - 4ac \\ c &= 5, b = -9, a = 1 \\ x^2 - 9x + 5 &= 0, \quad (iii) \end{aligned}$$

طی

$$\begin{aligned} x &= \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 20}}{2} \\ x &= \frac{-3 \pm \sqrt{11}}{2} \\ (x)^2 &= -1 \end{aligned}$$

چندال

$$\Rightarrow \begin{aligned} \Delta &= -11 < 0, \\ \Delta &= 9 - 20 \\ \Delta &= (3)^2 - 4(5)(1) \\ \Delta &= b^2 - 4ac \\ a &= 5, b = 3, c = 1 \\ 5x^2 + 3x + 1 &= 0, \quad (iii) \end{aligned}$$

طی

$$\begin{aligned} x &= -7 \quad \text{or} \quad x = 2 \\ x + 7 &= 0 \quad \text{or} \quad (x - 2) = 0 \\ x(x + 7) - 2(x + 7) &= 0 \\ x^2 + 7x - 2x - 14 &= 0 \\ x^2 + 5x - 14 &= 0 \end{aligned}$$

چندال

$$\Rightarrow \begin{aligned} \Delta &= 81 = (9)^2 > 0, \\ \Delta &= 25 + 56 \\ \Delta &= (5)^2 - 4(1)(-14) \\ \Delta &= b^2 - 4ac \\ a &= 1, b = 5, c = -14 \\ x^2 + 5x - 14 &= 0 \quad (i) \end{aligned}$$


طی

شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں

شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں

شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں

شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں
شش تصدیق ہوتی ہیں



ساوی روئیں کے لئے

$$\therefore \Delta = (5)^2 - 4(3)(p) = 25 - 12p, \\ \Delta = b^2 - 4ac \\ c = p^2, \text{ اور } b = 5, a = 3, \\ 3x^2 + 5x + p = 0$$

یا

(iii) مشترک ہوئے

(ii) باہمی

(i) مساوی

کی کسی قیمت کے لئے مساوی $3x^2 + 5x + p = 0$ کے لئے

یا

مندرجہ ذیل مثالیں دو دو کی مساویات مجموعی یا مطابقت کی قیمت معلوم کرنے میں مدد کریں۔

20.1. (v) دو دو کی مساویات کی قیمت معلوم کریں۔ جب اس کے لئے دو قیمت دی گئی ہو۔

نہیں روئیں یا نہیں ہیں۔

جو کہ Δ معلوم کر لیں

$$\begin{aligned} \Delta &= B^2 - 4AC \\ &= (3a^2 + b^2 - ab)^2 - 4(abc^2)(3a^2 + b^2 - ab) \\ &= (3a^2 + b^2)^2 - 2(3a^2 + b^2)(2ab) + (2ab)^2 \\ &= c^2 \left[(3a^2 + b^2)^2 - 2(3a^2 + b^2)(2ab) + (2ab)^2 \right] \\ &= c^2 \left[(3a^2 + b^2)^2 - 4ab(3a^2 + b^2) + 4a^2b^2 \right] \\ &= c^2 (3a^2 + b^2)^2 - 4abc^2(3a^2 + b^2 - ab) \\ &= c^2 (3a^2 + b^2)^2 - 4abc^2(3a^2 + b^2 - ab) \\ &= c^2 (3a^2 + b^2)^2 - 4abc^2(3a^2 + b^2 - ab) \end{aligned}$$


$$C = 3a^2 + b^2 - ab \text{ اور } B = c(3a^2 + b^2), A = abc^2,$$

$$abc^2x^2 + c(3a^2 + b^2)x + 3a^2 + b^2 - ab = 0$$

یا

نہیں روئیں یا نہیں ہیں۔

یا



$$(a+c-b)(x^2+2cx+a)=0, \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (\text{ii})$$

$$(l-m)x^2 + (m+n-l)x - n = 0, \forall l, m, n \in \mathbb{R} \text{ and } l \neq m \quad (\text{i})$$

5. ثابت کریں کہ مندرجہ ذیل دو درجی مساوات کے رولز باطنی ہیں

$$2nx^2 + 2(l+m+n)x + (l+m) = 0, \forall l, m, n \in \mathbb{R} \text{ and } n \neq 0 \quad (\text{ii})$$

$$x^2 - 2x \left(k + \frac{1}{k} \right) x + 3 = 0, \forall k \in \mathbb{R} - \{0\} \quad (\text{i})$$

4. ثابت کریں کہ مندرجہ ذیل دو درجی مساوات کے رولز حقیقی ہیں۔

$$9x^2 + mx + 16 = 0 \quad (\text{ii})$$

$$m \neq -1 \quad (\text{نیز شرط}) \quad (m+1)x^2 + 2(m+3)x + (2m+3) = 0, \quad (\text{i})$$

3. مندرجہ ذیل اقلہ درجی مساوات میں قیمت معلوم کریں جو رولز کو مساوی بناتے ہیں

$$x^2 + 1 = kx \quad (\text{viii}) \quad (k-2)x^2 = 4x + (k+2) \quad (\text{vii})$$

$$9x^2 + kx - 16 = 0 \quad (\text{vi}) \quad x^2 + kx + 4 = 0 \quad (\text{v})$$

$$(k-1)x^2 - 4x + 2 = 0 \quad (\text{iv}) \quad x^2 + kx + 2 = 0 \quad (\text{iii})$$

$$x^2 + k = 4 \quad (\text{iii}) \quad x^2 - 3x + k = 0 \quad (\text{i})$$

$$\Delta > 0 \text{ لے کر } \Delta = 0 \text{ لے کر اور نتیجہ حاصل ہے } \Delta > 0 \quad (\text{اشارہ})$$

2. کئی قیمتیں معلوم کریں جو رولز کو مساوی بناتے ہیں۔ (i) اقلہ قیمتیں (ii) مختلف حقیقی حل

$$3x^2 + 9 = 0 \quad (\text{viii}) \quad 3x^2 + 6 = 5x \quad (\text{vii})$$

$$24x^2 + 12x + 36 = 0 \quad (\text{v}) \quad 1 + 6x + 9x^2 = 0 \quad (\text{iv})$$

$$x^2 = 6x \quad (\text{iii}) \quad x^2 + 5x - 6 = 0 \quad (\text{i})$$

1. مندرجہ ذیل تبدلہ (Discriminant) مندرجہ ذیل دو درجی مساوات کے رولز کو مساوی بناتے ہیں

EXERCISE 20.1 مشق

مندرجہ ذیل دو درجی مساوات کے رولز حقیقی ہیں

$$\Rightarrow p > 12 \text{ or } p < -12$$

$$\Rightarrow \pm p > 12 \Rightarrow p > 12 \text{ اور } -p > 12$$

$$\Rightarrow p^2 > 144 \Rightarrow \sqrt{p^2} > \sqrt{144} \Rightarrow |p| > 12$$

$$\therefore p^2 - 144 > 0$$

$$\Delta > 0$$

$$\therefore \Delta = (-p)^2 - 4(2)(18) = p^2 - 144$$


$$\Delta = b^2 - 4ac$$


$$c = 18 \text{ اور } b = -p, a = 2,$$

$$2x^2 - px + 18 = 0,$$

حل

چال 3. p کی کئی قیمتیں لے کر مساوی بناتے ہیں $2x^2 - px + 18 = 0$ کے رولز حقیقی اور غیر مساوی ہیں





6. p اور q کی کس قیمتوں کے لیے دو درجی مساوات $x^2 + (2p-4)x - (3q+5) = 0$ کے روٹس ختم ہو جائیں گے
7. ثابت کریں کہ دی گئی دو درجی مساوات $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$ کے روٹس حقیقی ہیں اور وہ مساوی نہیں ہو سکتے جب تک $a = b = c$.

20.2 اکائی کے مکعب روٹس اور ان کی خصوصیات

20.2. (i) اکائی کے مکعب روٹس معلوم کرنا

فرض کریں x اکائی کا مکعب روٹ ہے

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[3]{1} \quad \text{یا} \quad x = (1)^{1/3} \\ x^3 &= 1 \\ \Rightarrow (x)^3 - (1)^3 &= 0 \\ \Rightarrow (x-1)(x^2+x+1) &= 0, \quad [a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)] \\ x-1 &= 0 \quad \text{یعنی} \\ \Rightarrow x &= 1 \\ x^2+x+1 &= 0, \quad \text{یا} \\ a=b=c=1, \quad \text{یہاں} \end{aligned}$$

دو درجی مساوات کی مدد سے ہمارے پاس

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{(1)^2 - 4(1)(1)}}{2(1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-1 \times 3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}, \quad (i^2 = -1)$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \quad \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$$

لہذا اکائی کے مکعب روٹس

$$1, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \quad \text{اور} \quad \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$$

20.2. (ii) اکائی کے کمپلیکس مکعب روٹس ω اور ω^2 (Complex cube roots) جیسے ω اور ω^2 کی پہچان کرنا۔

دو کمپلیکس مکعب روٹس ہیں

$$\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \quad \text{اور} \quad \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{آئیں ہم فرض کرتے ہیں} \quad \omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \quad \text{تو} \quad \omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \quad \text{اس لیے اکائی کے مکعب روٹس} \quad 1, \omega, \omega^2 \text{ ہیں}$$

20.2. (iii) اکائی کے مکعب روٹس کی خصوصیات کی تصدیق کرنا اکائی کے مکعب روٹ کی خصوصیات ہیں۔

(i) ہر اکائی کا مکعب کمپلیکس روٹ دوسرے کا مرآع ہوتا ہے۔

تصدیق

$$\text{اگر} \quad \omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \quad \text{اکائی کا ایک کمپلیکس روٹ ہے۔}$$



$$\therefore \omega^2 = \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{1-2i\sqrt{3}+3i^2}{4} = \frac{1-2i\sqrt{3}+3(-1)}{4} \quad \text{اب}$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{-2-2i\sqrt{3}}{4} = \frac{2(-1-i\sqrt{3})}{4} \quad (\because i^2 = -1)$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Now } (\omega^2)^2 = \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{1+2i\sqrt{3}+3i^2}{4} = \frac{1+2i\sqrt{3}+3(-1)}{4} \quad (\because i^2 = -1)$$

$$\Rightarrow (\omega^2)^2 = \frac{-2+2i\sqrt{3}}{4} = \frac{2(-1+i\sqrt{3})}{4} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow (\omega^2)^2 = \omega. \quad \text{ہر اکائی کا مکعب کمپلیکس روٹ دوسرے کا مرہلہ بنتا ہے۔}$$

پس تصدیق ہوا۔

(ii) اکائی کے تین مکعب روٹس کا مجموعہ صفر ہوتا ہے یعنی $1 + \omega + \omega^2 = 0$

$$\text{L.H.S} = 1 + \omega + \omega^2$$

پڑتا ہے

$$= 1 + \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right) + \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right), \quad \omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \text{ اور } \omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \quad \text{جبکہ}$$

$$= \frac{2-1+i\sqrt{3}-1-i\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{2-2}{2} = \frac{0}{2} = 0 = \text{R.H.S.}$$

پس تصدیق ہوا

(iii) اکائی کے تین مکعب روٹس کا حاصل ضرب "1" ہوتا ہے

پڑتا ہے

$$\text{L.H.S} = \omega \cdot \omega^2 \cdot 1$$

$$= 1 \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= \frac{1-i^2 3}{4}$$


$$= \frac{1-(-1)(3)}{4}, \quad (i^2 = -1)$$

$$= \frac{1+3}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$= \text{R.H.S}$$

$$1 \cdot \omega \cdot \omega^2 = 1 \quad \text{یعنی} \quad \omega^3 = 1$$

پس تصدیق ہوا



(iv) ہر اکائی مکعب کمپلیکس روٹ دوسرے کا معکوس (Reciprocal) ہوتا ہے
 $\omega^3 = 1$, پڑتال

$\Rightarrow \omega \cdot \omega^2 = 1$,
 $\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{\omega}$ یا $\omega = \frac{1}{\omega^2}$.
 ثبوت: ایک کمپلیکس روٹ ω ہے۔
 ہر اکائی کا مکعب کمپلیکس روٹ دوسرے کا معکوس (reciprocal) ہوتا ہے۔

(v) ہر ω^3 کی لازمی طاقت اکائی ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \therefore \omega^3 &= 1, \\ \therefore (\omega^3)^m &= 1, \quad \forall m \in \mathbb{Z}. \\ \Rightarrow \omega^{3m} &= 1. \end{aligned}$$

پس ثابت ہو

20.2. (iv) اکائی کے مکعب روٹس کی خصوصیات استعمال کرتے ہوئے سوالات حل کرنا۔

اکائی کے مکعب روٹ سے متعلق سوالات مندرجہ ذیل ہے۔

مثال 27. کے مکعب روٹس (Cube roots) معلوم کریں۔


حل فرض کریں 27- کا مکعب روٹ x ہے۔

$\therefore x = (-27)^{\frac{1}{3}}$ یعنی

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^3 &= -27 \quad \text{دونوں اطراف مکعب کرنے سے ہمارے پاس} \\ \Rightarrow x^3 + 27 &= 0 \\ \Rightarrow (x)^3 + (3)^3 &= 0 \\ \Rightarrow (x+3)(x^2 - 3x + 9) &= 0, \quad [a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^3)] \\ x+3 &= 0 \Rightarrow x = -3, \\ x^2 - 3x + 9 &= 0 \\ c = 9, \text{ اور } b = -3, a &= 1 \end{aligned}$$

اب

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ \therefore x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(9)}}{2(1)} \\ \Rightarrow x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{9 - 36}}{2} \\ \Rightarrow x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{-27}}{2} \\ \Rightarrow x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{-1 \times 27}}{2} \\ \Rightarrow x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{i^2 \times 27}}{2} \quad (\because i^2 = -1) \end{aligned}$$



مثال 4. ثابت کریں

$$(x+y+z)(x+y\omega+z\omega^2)(x+y\omega^2+z\omega) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz,$$

جکہ ω^2 اور ω اکائی کے کمپلیکس مکعب روٹس ہیں

L.H.S = $(x+y+z)(x+y\omega+z\omega^2)(x+y\omega^2+z\omega)$ ثبوت

$$\begin{aligned} &= (x+y+z) \left[(x+y\omega+z\omega^2)(x+y\omega^2+z\omega) \right] \\ &= (x+y+z) \left[x^2 + xy\omega^2 + xz\omega + xy\omega + y^2\omega^3 + yz\omega^2 + xz\omega^2 + yz\omega^4 + z^2\omega^3 \right] \\ &= (x+y+z) \left[x^2 + y^2(1) + z^2(1) + xy(\omega^2 + \omega) + yz(\omega^2 + \omega^4) + zx(\omega + \omega^2) \right] \\ &= (x+y+z) \left[x^2 + y^2 + z^2 + xy(-1) + yz(-1) + zx(-1) \right], \\ &= (x+y+z) \left[x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \right] \quad \left(\because \omega^3 = 1, \omega^2 + \omega = -1 \right. \\ &= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz. \quad \left. \text{and } \omega^2 + \omega^4 = \omega + \omega^2 = -1 \right) \\ &= \text{R.H.S} \end{aligned}$$

پس ثابت ہوا

مشق 20.2 EXERCISE

1. تمام مکعب روٹس معلوم کریں

216 (iii)

-125 (ii)

64 (i)

2. مندرجہ ذیل کو حل کریں۔

$(1-\omega+\omega^2)(1+\omega-\omega^2)$ (ii)

$(1+\omega^2)^4$ (i)

$(-1+\sqrt{-3})^4 + (-1-\sqrt{-3})^4$ (iv)

$(2+5\omega+2\omega^2)^6$ (iii)

3. ثابت کریں

$(1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega^4)(1+\omega^8) = (\omega+\omega^2)^4$ (i)

$(a+b)(a\omega+b\omega^2)(a\omega^2+b\omega) = a^3+b^3$ (ii)

$(a+\omega b+\omega^2 c)(a+\omega^2 b+\omega c) = a^2+b^2+c^2-ab-ba-ca$ (iii)

$\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right)^9 + \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right)^9 - 2 = 0$ (iv)

$(1+\omega-\omega^2)^3 - (1-\omega+\omega^2)^3 = 0$ (v)

20.3. دو درجی مساوات کے روٹس اور عددی سر
20.3. (i) دو درجی مساوات کے روٹس اور عددی سر کے درمیان تعلق معلوم کرنا۔

فرض کریں $ax^2+bx+c=0, a \neq 0$ کے دو روٹس کو α اور β سے ظاہر کرتے ہیں

تو $\alpha = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ اور $\beta = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$



$$\therefore \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a} \quad (1)$$

$$\alpha\beta = \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)$$

$$\Rightarrow \alpha\beta = \frac{(-b)^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \quad (2)$$

لہذا (1) روٹس کے مجموعہ کو ظاہر کرتی ہے $-\frac{b}{a}$ کا عددی سر

اور (2) روٹس کے حاصل ضرب کو ظاہر کرتی ہے $\frac{c}{a}$ کا عددی سر
اس طرح ہمارے پاس اہم نتیجہ ہے۔
اگر α اور β مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کے روٹس ہیں

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{تو}$$

20.3. (ii) دی گئی مساوات کو حل کئے بغیر ان کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کرنا۔

مثال حل کئے بغیر مندرجہ ذیل پر مساوات کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کریں۔

$$3(5x^2 + 1) = 17x \quad (ii) \quad 4x^2 + 6x + 1 = 0 \quad (i)$$

$$3(5x^2 + 1) = 17x \quad \text{حل: (ii)}$$

$$15x^2 - 17x + 3 = 0 \quad \text{یہاں}$$

$$c = 3 \text{ اور } b = -17 \text{ اور } a = 15,$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ اور } \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} \text{ اور } \alpha + \beta = -\frac{(-17)}{15}$$

$$\alpha + \beta = \frac{17}{15} \text{ اور } \alpha\beta = \frac{1}{5}$$

حل: (i)

$$4x^2 + 6x + 1 = 0$$

$$c = 1 \quad b = 6 \quad a = 4, \quad \text{یہاں}$$


$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ اور } \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta = \frac{1}{4} \text{ اور } \alpha + \beta = -\frac{6}{4}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = -\frac{3}{2} \text{ اور } \alpha\beta = \frac{1}{4}$$

20.3. (iii) دی گئی مساوات میں نامعلوم کی قیمت معلوم کرنا جب کہ

- (a) روٹس کا مجموعہ روٹس کے حاصل ضرب کے برابر ہو۔
- (b) روٹس کے مربعوں کا مجموعہ دیئے گئے عدد کے برابر ہو۔
- (c) روٹس میں دیئے گئے عدد کا فرق ہو۔



(d) روٹس دیئے گئے تعلق کی تصدیق کرتے ہو (مثلاً) $2\alpha + 5\beta = 7$ جبکہ α اور β دی گئی مساوات کے روٹس ہیں)
 (e) روٹس کو مجموعہ اور حاصل ضرب دیئے گئے عدد کے برابر ہو۔ اوپر دی گئیں تمام شرائط کی وضاحت مثالوں کی جاسکتی ہے
 (a) روٹس کا مجموعہ روٹس کے حاصل ضرب کے برابر ہو۔
 مثال 1: k کی قیمتیں معلوم کریں۔ اگر $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ کے روٹس کا مجموعہ روٹس کے حاصل ضرب کے برابر ہو۔

حل فرض کریں α اور β مساوات $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ کے روٹس ہیں

$$c = 5 \quad b = -3k \quad a = 6 \quad \text{یہاں}$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3k)}{6} = \frac{3k}{6} \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{5}{6} \quad \text{اب}$$

دیا گیا ہے

روٹس کا مجموعہ = روٹس کے حاصل ضرب

$$\alpha + \beta = \alpha\beta$$

$$\frac{3k}{6} = \frac{5}{6} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{5}{3}$$

∴

مثال 2: P کی قیمت معلوم کریں۔ اگر مساوات $2x^2 + (8-4p)x + 3p = 0$ کے روٹس کا مجموعہ، روٹس کے حاصل ضرب کے دو گناہ کے برابر ہے۔

حل فرض کریں α اور β مساوات $2x^2 + (8-4p)x + 3p = 0$ کے روٹس ہیں

$$c = 3p \quad b = 8-4p \quad a = 2,$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(8-4p)}{2} = 2p-4 \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{3p}{2}$$

دی گئی شرط کے مطابق

$$\alpha + \beta = 2(\alpha\beta)$$

$$2p-4 = 2\left(\frac{3p}{2}\right) = 3p \quad \text{یعنی}$$

$$\Rightarrow \quad p = -4.$$

(b) روٹس کے مربعوں کا مجموعہ دیئے گئے عدد کے برابر ہو۔

مثال 3: k معلوم کریں اگر مساوات $2x^2 + 3kx + k^2 = 0$ کے روٹس کے مربعوں کا مجموعہ 5 ہے

حل فرض کریں α اور β مساوات $2x^2 + 3kx + k^2 = 0$ کے روٹس ہیں

$$c = k^2 \quad b = 3k \quad a = 2, \quad \text{یہاں}$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{3k}{2} \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{k^2}{2} \quad \text{اب}$$

دی گئی شرط کے مطابق

$$\alpha^2 + \beta^2 = 5$$



$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 5 \quad \because [a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab] \\
 &\Rightarrow \left(\frac{-3k}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{k^2}{2}\right) = 5 \\
 &\Rightarrow \frac{9k^2}{4} - k^2 = 5 \\
 &\Rightarrow \frac{9k^2 - 4k^2}{4} = 5 \\
 &\Rightarrow \frac{5k^2}{4} = 5 \times 4 \\
 &\Rightarrow k^2 = 4 \\
 &\Rightarrow k = \pm 2
 \end{aligned}$$

(c) روٹس میں دیئے گئے عدد کا فرق ہو

مثال 4: p معلوم کریں مساوات $x^2 - px + 8 = 0$ کے روٹس میں فرق 2 ہے

حل فرض کریں α اور β مساوات $x^2 - px + 8 = 0$ کے روٹس ہیں

یہاں $a = 1$, $b = -p$ اور $c = 8$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-p)}{1} = p \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{8}{1} = 8 \quad \text{اب}$$

دی گئی شرط کے مطابق $\alpha - \beta = 2$
دونوں اطراف مربع کرنے سے ہمارے پاس
 $(\alpha - \beta)^2 = 4$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4 \quad \left[\because (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab \right] \\
 &\Rightarrow p^2 - 4(8) = 4 \\
 &\Rightarrow p^2 - 32 = 4 \\
 &\Rightarrow p^2 = 36 \\
 &\Rightarrow p = \pm 6
 \end{aligned}$$

(d) روٹس دیئے گئے تعلق کے تصدیق کرتے ہو (مثلاً، $2\alpha + 5\beta = 7$ جبکہ α اور β دی گئی مساوات کے روٹس ہیں)

مثال 5: k معلوم کریں اگر α اور β مساوات $x^2 - 5x + k = 0$ کے روٹس ہیں شرط $2\alpha + 5\beta = 7$ کی تصدیق کریں۔

حل دی گئی مساوات، $x^2 - 5x + k = 0$

یہاں $a = 1$, $b = -5$ اور $c = k$


فرض کریں α اور β دی گئی مساوات کے روٹس ہیں

$$\therefore \alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{اور} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \text{جبکہ}$$

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{(-5)}{1} = 5$$

$$\Rightarrow \alpha = 5 - \beta \quad (i)$$

$$\alpha\beta = \frac{k}{1} = k \quad \text{اور}$$



$$\Rightarrow \alpha\beta = k \quad (ii)$$

دیا گیا ہے

$$\therefore 2\alpha + 5\beta = 7$$

$$\therefore 2(5 - \beta) + 5\beta = 7 \quad \text{یعنی}$$

$$\Rightarrow 10 - 2\beta + 5\beta = 7$$

$$\Rightarrow 3\beta = -3$$

$$\Rightarrow \beta = -1$$

$\therefore$ مساوات (i) سے ہمیں پاس ہے

$$\alpha = 5 - (-1) = 5 + 1 = 6,$$

k کی قیمت معلوم کرنے کے لیے α اور β کے قیمتیں مساوات (2) میں رکھنے سے ہمیں جلد

$$k = 6(-1) = -6$$

$$\Rightarrow k = -6$$

(e) روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب دیئے گئے عدد کے برابر ہو

مثال 6: k معلوم کریں اور مساوات $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔

حل فرض کریں α اور β مساوات $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ کے روٹس ہیں تو

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3k)}{6} = \frac{k}{2} \quad (i)$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{5}{6} \quad \text{اور} \quad (ii)$$

دی گئی شرط کے مطابق کہ روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب $\frac{5}{6}$ کے برابر ہیں

$$\alpha + \beta = \alpha\beta = \frac{5}{6} \quad \text{یعنی}$$

$$\frac{k}{2} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow k = \frac{5}{3},$$

بس $k = \frac{5}{3}$ پر دی گئی مساوات کے روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل ضرب طور $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔



مشتق 20.3 EXERCISE

1. حل کئے بغیر مندرجہ ذیل مساواتوں کے روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل ضرب معلوم کریں۔

$$2x^2 - 3x - 4 = 0 \quad (ii)$$

$$x^2 - x - 1 = 0 \quad (i)$$

$$7x^2 - 5kx + 7k = 0 \quad (iv)$$

$$x^2 - \frac{3}{4}a^2 = ax \quad (iii)$$

2. m کی قیمت معلوم کریں اگر

(i) مساوات $x^2 + (3m - 7)x + 5m = 0$ کے روٹس کا مجموعہ اس کے روٹس کے حاصل ضرب کا $\frac{3}{2}$ گنا ہے

(ii) مساوات $2x^2 - 3x + 4m = 0$ کے روٹس کا مجموعہ اس کے روٹس کے حاصل ضرب کا 6 گنا ہے۔

3. p کی قیمت معلوم کریں اگر

(i) مساوات $x^2 - px + 6 = 0$ کے روٹس کے روٹس کے مربعوں کا مجموعہ 13 کے برابر ہے۔

(ii) مساوات $x^2 - 2px + (2p - 3) = 0$ کے روٹس کے مربعوں کا مجموعہ 6 ہے

4. m کی قیمت معلوم کریں اگر

(i) مساوات $x^2 - 5x + 2m = 0$ کے روٹس میں 1 کا فرق ہے۔

(ii) مساوات $x^2 - 8x + m + 2 = 0$ کے روٹس میں 2 کا فرق ہے۔

5. k کی قیمت معلوم کریں اگر

(i) مساوات $5x^2 - 7x + k - 2 = 0$ کے روٹس تعلق $2\alpha + 5\beta = 1$ کی تصدیق کرتے ہیں۔

(ii) مساوات $3x^2 - 2x + 7k + 2 = 0$ کے روٹس تعلق $7\alpha - 3\beta = 18$ کی تصدیق کرتے ہیں۔

6. p کی قیمت معلوم کریں اگر مندرجہ ذیل مساواتوں کے روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل ضرب برابر ہیں۔

(i) $(2p + 3)x^2 + (7p - 5)x + (3p - 10) = 0$ (ii) $4x^2 - (5p + 3)x + 17 - 9p = 0$

20.4 دو درجی مساوات کے روٹس کے سمیٹرک تفاعل دو درجی مساوات کے روٹس کے سمیٹرک تفاعل کی تعریف

فرض کریں α اور β دو درجی مساوات کے روٹس ہیں α اور β کا تفاعل f سمیٹرک تفاعل کہہ تا ہے کہ جب α اور β کو آپس میں


تبدیل کیا جائے تو تفاعل تبدیل نہیں ہو ویسا ہی رہتا ہے۔ یعنی $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$

$\alpha + \beta$ اور (α, β) کے پرائمری سمیٹرک تفاعل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

نوٹ کریں کہ $\alpha - \beta \neq \beta - \alpha$ لہذا $\alpha - \beta$ روٹس کا سمیٹرک تفاعل نہیں ہے۔

روٹس کے سمیٹرک کے تفاعل کی قیمت دو درجی مساوات کے عددی سروں کی صورت میں $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ اور $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$

کی جاسکتی ہے $\alpha + \beta$ اور $\alpha\beta$ کی



صورت میں بیان کرتے ہوئے سمیٹرک تفاعل کی مثالیں نیچے دی گئی ہیں۔

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \quad \text{➤}$$

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) \quad \text{➤}$$

$$\alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2\alpha^2\beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta - 2(\alpha\beta)^2 \quad \text{➤}$$

مثال $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta$ کی قیمت معلوم کریں جب کہ $\alpha=2$ اور $\beta=3$ اور ثابت کریں کہ یہ α اور β کا سمیٹرک تفاعل ہے جبکہ α اور β دو درجی مساوات کے روٹس ہیں۔

حل فرض کریں $f(\alpha, \beta) = \alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta$

دیا گیا ہے $\alpha=2$ اور $\beta=3$

$$\therefore f(2, 3) = 2^2 + 3^2 + (2)(3) = 4 + 9 + 6 = 19,$$

اب

$$f(\beta, \alpha) = \beta^2 + \alpha^2 + \beta\alpha = \alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = f(\alpha, \beta)$$

$$\therefore f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$$

$$\therefore f \text{ سمیٹرک تفاعل ہے}$$

دیا گیا اظہار یہ روٹس α اور β کا سمیٹرک تفاعل ہے پس ثابت ہوا

20.4 (ii) سمیٹرک تفاعل کو گرافیکلی (Graphically) ظاہر کریں۔

20.4.1 میں ہم پہلے ہی دو درجی مساوات کے روٹس کے سمیٹرک تفاعل کی وضاحت کر چکے ہیں۔ جیسے

$$\alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^2 + \beta^2, \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta, \alpha^3 + \beta^3$$

جب ایک سمیٹرک تفاعل کو مستقل کے مساوی ہوتا ہے $c \in \mathbb{R}$ ہمیں ایسا سمیٹرک مساوات حاصل ہوتی ہے۔

اور سمیٹرک مساوات کے روٹس ہوں لکھے جاسکتے ہیں $f(\alpha, \beta) = c$

ہر مساوات کو گرافیکلی (Graphically) ظاہر کیا جاسکتا ہے بطور تمام نقاط کا سیٹ $G(f)$ کی وضاحت کی گئی ہے۔


$$G(f) = \{(\alpha, \beta) \mid f(\alpha, \beta) = c \wedge \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

مثال سمیٹرک مساوات $\alpha^2 + \beta^2 = 9$ گرافیکلی (Graphically) ظاہر کریں اور گراف بنائیں۔

حل دیا گیا ہے کہ

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = 9$$

$\Rightarrow \beta = \pm\sqrt{9 - \alpha^2}$
گراف بنانے کے لیے ہم کچھ نقاط لیتے ہیں α کی مختلف قیمتیں رکھنے سے β کے قیمتیں ملتی ہیں۔



α	0	1	2	3	-1	-2	-3
β	± 3	± 2.828	± 2.2360	0	± 2.828	± 2.2360	0

لہذا سمیٹرک تفاعل $\alpha^2 + \beta^2 = 9$ دائرے کو ظاہر کرتا ہے جب $c=9$ کے برابر ہوتا ہے۔



20.4. (iii) دو درجی مساوات کے روٹس کے سمیٹرک تفاعل کو اس کے عددی سروی کی لحاظ سے حل کرنا

فرض کریں کہ α اور β دو درجی مساوات کے روٹس ہیں

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 \quad (i)$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad (ii)$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad (iii)$$

اوپر مساوات (ii) اور (iii) دو درجی مساوات (i) کے پرائمری سمیٹرک تفاعل کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال 1: اگر α, β مساوات $x^2 - px + q = 0$ کے روٹس ہیں۔ α اور β کی قیمت معلوم کریں۔

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} \quad (ii) \quad \alpha^2 + \beta^2 \quad (i)$$

حل: α اور β کے روٹس ہیں $x^2 - px + q = 0$

$$c = q, b = -p, a = 1,$$

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-p)}{1} = p$$

$$\text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{q}{1} = q \quad \text{اور}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \quad \text{یہاں}$$


$$= (p)^2 - 2q$$

$$= p^2 - 2q$$

$$(\because \alpha + \beta = p \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = q)$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad & \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} \\ &= \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} \\ &= \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta} \\ &= \frac{p^2 - 2q}{q} \end{aligned}$$

$$(\because \alpha + \beta = p \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = q)$$



EXERCISE 20.4 مشق

1. اگر α, β دو درجی مساوات کے روٹس ہیں مندرجہ ذیل سمیٹرک تفاعل کو $\alpha + \beta$ اور $\alpha\beta$ کی صورت بیان کریں۔

$$\begin{array}{lll} \alpha^2\beta^{-1} + \beta^2\alpha^{-1} & \text{(iii)} & (\alpha + \beta)^3 \quad \text{(ii)} \quad (\alpha - \beta)^2 \quad \text{(i)} \\ \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\right)^2 & \text{(vi)} & \frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3} \quad \text{(v)} \quad \alpha^3\beta + \alpha\beta^3 \quad \text{(iv)} \end{array}$$

2. اگر α, β مساوات $2x^2 - 3x + 7 = 0$ کے روٹس ہیں۔ مندرجہ ذیل سمیٹرک تفاعل کی قیمت معلوم کریں

$$\frac{1}{\alpha\alpha+1} + \frac{1}{\alpha\beta+1} \quad \text{(iii)} \quad \frac{\alpha}{\beta^2} + \frac{\beta}{\alpha^2} \quad \text{(ii)} \quad \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)^2 \quad \text{(i)}$$

3. اگر α, β مساوات $px^2 + qx + q = 0, p \neq 0$ کے روٹس ہیں تو $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$ کی قیمت معلوم کریں

4. سمیٹرک تفاعل $\alpha + \beta = 8$ کو گرافیکل (Graphically) ظاہر کریں جب کہ α اور β دو درجی مساوات کے روٹس ہیں

20.5 دو درجی مساوات کی تشکیل

20.5(i) کا یہ تشکیل دینا، $0 = (\text{روٹس کا حاصل ضرب}) + x(\text{روٹس کا مجموعہ}) - x^2$ گئے روٹس سے دو درجی مساوات تشکیل دینا۔

فرض کریں α, β دو درجی مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کے روٹس ہیں۔

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ اور } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ تو}$$

اب مساوات (i) کو دوبارہ لکھیں جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \text{بشرطیکہ } a \neq 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - (\text{روٹس کا مجموعہ}) + (\text{روٹس کی حاصل ضرب}) = 0$$

جبکہ $\frac{c}{a}$ اور $-\frac{b}{a}$ بالترتیب روٹس کے مجموعہ اور روٹس کے حاصل ضرب کو ظاہر کرتے ہیں

یعنی اب اس کو واضح طور پر یوں لکھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے

$x^2 - Sx + P = 0$ جبکہ S اور P بالترتیب دی گئی دو درجی مساوات کے روٹ کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل ضرب کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال: مساوات تشکیل دیں جس کے روٹس ہیں

$$\text{(i)} \quad -\frac{4}{5}, \frac{3}{7} \quad \text{(ii)} \quad 7 \pm 2\sqrt{5}$$



حل (i) فرض کریں $\beta = \frac{3}{7}$ اور $\alpha = -\frac{4}{5}$

$$\therefore S = \alpha + \beta = -\frac{4}{5} + \frac{3}{7} = \frac{-28+15}{35} = \frac{-13}{35}$$

$$P = \alpha\beta = \left(-\frac{4}{5}\right)\left(\frac{3}{7}\right) = \frac{-12}{35} \quad \text{اور}$$

جب روٹس معلوم ہیں تو مساوات ہوگی
 $x^2 - Sx + P = 0$

$$\text{i.e., } x^2 - \left(\frac{-13}{35}\right)x + \left(\frac{-12}{35}\right) = 0 \quad \text{یعنی}$$

$$\Rightarrow 35x^2 + 13x - 12 = 0.$$

مطلوبہ مساوات ہے

حل (ii) فرض کریں $\beta = 7 - 2\sqrt{5}$ اور $\alpha = 7 + 2\sqrt{5}$

$$\therefore S = \alpha + \beta = 7 + 2\sqrt{5} + 7 - 2\sqrt{5} = 14$$

$$P = \alpha\beta = (7 + 2\sqrt{5})(7 - 2\sqrt{5}) = 49 - 20 = 29 \quad \text{اور}$$

جب روٹس معلوم ہیں تو مساوات ہوگی

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 14x + 29 = 0, \quad \text{مطلوبہ مساوات ہے}$$

20.5.(ii) دو درجی مساوات تشکیل دیں جن کے روٹس کی اقسام یہ ہیں

- (a) $2\alpha + 1, 2\beta + 1$ (b) α^2, β^2 (c) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$
 (d) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (e) $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

جبکہ β, α دو درجی مساوات کے روٹس ہیں


مثال: اگر β, α دو درجی مساوات $x^2 - 5x + 6 = 0$ کے روٹس ہیں۔ مساوات تشکیل دیں جس کے روٹس ہیں

- (i) $2\alpha + 1, 2\beta + 1$ (ii) α^2, β^2 (iii) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$
 (iv) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (v) $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

حل (i): چونکہ β, α مساوات $x^2 - 5x + 6 = 0$ کے روٹس ہیں $c = 6$ اور $b = -5, a = 1$

$$\therefore \alpha\beta = -\frac{c}{a} = \frac{6}{1} = 6, \text{ اور } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-5)}{1} = 5 \quad \text{یہاں}$$

مطلوبہ مساوات کے روٹس $2\alpha + 1$ اور $2\beta + 1$ ہیں
 اب ہم روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل ضرب معلوم کرتے ہیں



$$S = (2\alpha + 1) + (2\beta + 1)$$

$$S = 2(\alpha + \beta) + 2$$

$$S = 2(5) + 2 \quad (\because \alpha + \beta = 5)$$

$$S = 10 + 2 = 12$$

$$P = (2\alpha + 1)(2\beta + 1) \quad \text{یہاں}$$

$$P = 4\alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 1$$

$$P = 4(6) + 2(5) + 1 \quad (\because \alpha\beta = 6 \text{ \& } \alpha + \beta = 5)$$

$$P = 24 + 10 + 1 = 35$$

$$x^2 + 12x + 35 = 0 \quad \text{مطلوبہ مساوات ہے}$$

حل (ii): مطلوبہ مساوات کے روٹس α^2 اور β^2 ہیں

$$S = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (5)^2 - 2(6) = 25 - 12 = 13, (\because \alpha + \beta = 5 \text{ and } \alpha\beta = 6)$$

$$P = \alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = (6)^2 = 36 \quad \text{اور}$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - 13x + 36 = 0,$$

مطلوبہ مساوات ہے

حل (iii): مطلوبہ مساوات کے روٹس $\frac{1}{\beta}$ اور $\frac{1}{\alpha}$ ہیں

$$S = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{5}{6}, \quad (\because \alpha\beta = 6 \text{ اور } \alpha + \beta = 5)$$

$$P = \left(\frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{6} \quad \text{اور}$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 5x + 1 = 0, \quad \text{لہذا}$$

مطلوبہ مساوات ہے

حل (iv): مطلوبہ مساوات کے روٹس $\frac{\beta}{\alpha}$ اور $\frac{\alpha}{\beta}$ ہیں

$$S = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{25 - 2(6)}{6} = \frac{25 - 12}{6} = \frac{13}{6},$$

$$P = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta} = \frac{6}{6} = 1 \quad \text{اور}$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - \frac{13}{6}x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 13x + 6 = 0,$$

مطلوبہ مساوات ہے



حل (v) مطلوبہ مساوات کے روٹس $\alpha + \beta$ اور $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= (\alpha + \beta) + \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \\ &= (\alpha + \beta) + \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} \right) \\ &= (\alpha + \beta) \left(1 + \frac{1}{\alpha\beta} \right) \\ &= 5 \left(1 + \frac{1}{6} \right) = 5 \left(\frac{7}{6} \right) = \frac{35}{6} \quad (\because \alpha\beta = 6 \text{ اور } \alpha + \beta = 5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= (\alpha + \beta) \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \\ &= (\alpha + \beta) \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} \right) = \frac{(\alpha + \beta)^2}{\alpha\beta} = \frac{25}{6} \quad (\because \alpha\beta = 6 \text{ اور } \alpha + \beta = 5) \end{aligned}$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - \frac{35}{6}x + \frac{25}{6} = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 35x + 25 = 0, \quad \text{مطلوبہ مساوات ہے}$$

(iii) 20.5. α, β کی قیمت معلوم کریں جبکہ $\frac{1}{\alpha}$ اور $\frac{1}{\beta}$ مساوات کے روٹس ہیں

مثال: اگر $\frac{1}{\alpha}$ اور $\frac{1}{\beta}$ مساوات $x^2 - 6x + 8 = 0$ کے روٹس ہیں اور α اور β کی قیمت معلوم کریں

حل: چونکہ $\frac{1}{\alpha}$ اور $\frac{1}{\beta}$ مساوات $x^2 - 6x + 8 = 0$ کے روٹس ہیں

$$\begin{aligned} \text{یہاں } c = 8 \text{ اور } b = -6, a = 1 \\ \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{-6}{1} \right) = 6, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = 6$$


$$\Rightarrow \alpha + \beta = 6\alpha\beta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{\beta} = \frac{c}{a} = \frac{8}{1} = 8 \quad \text{اور}$$

$$\Rightarrow \alpha\beta = \frac{1}{8} \quad \text{(ii)}$$

مساوات (i) سے

$$\beta = 6 \left(\frac{1}{8} \right) - \alpha = \frac{3 - 4\alpha}{4} \quad \text{(iii)}$$



مساوات (ii) میں β کی قیمت رکھنے سے

$$\begin{aligned} \alpha \left(\frac{3-4\alpha}{4} \right) &= \frac{1}{8} \\ \Rightarrow \frac{8\alpha}{4} (3-4\alpha) - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 2\alpha(3-4\alpha) - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 6\alpha - 8\alpha^2 - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 8\alpha^2 - 6\alpha + 1 &= 0 \\ \Rightarrow 8\alpha^2 - 4\alpha - 2\alpha + 1 &= 0 \\ \Rightarrow 4\alpha(2\alpha-1) - 1(2\alpha-1) &= 0 \\ \Rightarrow (2\alpha-1)(4\alpha-1) &= 0 \\ 2\alpha-1 &= 0 \quad \text{یا} \quad 4\alpha-1=0 \\ \Rightarrow \alpha &= \frac{1}{2} \quad \text{یا} \quad \alpha = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

مساوات (iii) ہمارے پاس

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{3-4\left(\frac{1}{2}\right)}{4} = \frac{1}{4} \quad \text{or} \quad \beta = \frac{3-4\left(\frac{1}{4}\right)}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \\ \beta &= \frac{1}{2} \text{ اور } \alpha = \frac{1}{4} \quad \text{یا} \quad \beta = \frac{1}{4} \text{ اور } \alpha = \frac{1}{2} \quad \text{لہذا} \end{aligned}$$

مشق 20.5

1. مساوات تشکیل دیں جس روٹس ہے

(i) $-2, 3$ (ii) ω, ω^2 (iii) $2+i, 2-i$ (iv) $2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}$

2. اگر α اور β مساوات $6x^2 - 3x + 1 = 0$ کے روٹس ہیں۔ مساوات تشکیل دیں جس روٹس ہے

(i) $2\alpha+1, 2\beta+1$ (ii) α^2, β^2 (iii) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$
(iv) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (v) $\alpha+\beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

3. مساوات معلوم کریں جس کے روٹس مساوات $px^2 - qx + r = 0, p \neq 0$ کے روٹس کے معکوس ہیں

4. مساوات معلوم کریں جس کے روٹس مساوات $x^2 - px + q = 0$ کے روٹس کے دوگنا ہیں

5. مساوات معلوم کریں جس کے روٹس مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس کے 2 زیادہ ہو

6. شرط معلوم کریں کہ مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کا ایک روٹ ہو سکتا ہے

(i) دوسرے کا تین گنا (ii) دوسرے کا بھی معکوس
(iii) دوسرے کا مربع (iv) دوسرے کا ضربی معکوس



20.6 اعلیٰ درجے کی مساوات کو دو درجی شکل تک کم کرنا

20.6.(a) مکعب مساوات کو حل کریں اگر مساوات کا ایک روٹ دیا گیا ہو

فرض کریں $a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$ مکعب مساوات ہے اور اس روٹ α ہے
فرض کریں کہ $f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$ کا ایک روٹ α ہے تو:

$$f(x) = 0$$

جبکہ $f(x) = (x - \alpha) \cdot f_1(x)$ دو درجی اظہاریہ ہے

مثال: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ کو حل کریں اگر اس مساوات کا ایک روٹ 1 ہے

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

پیدا گیا ہے کہ ایک روٹ 1 ہے

یعنی $x = 1$ ضرب دیندہ جز ہے

ترکیبی تقسیم کے طریقے سے

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -6 & 11 & -6 \\ & \downarrow & 1 & -5 & 6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array} \quad \text{باقی}$$

نیچے ہمارے پاس دو درجی مساوات ہے

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 2) - 3(x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0$$

$$\text{i.e., } x - 2 = 0 \quad \text{or} \quad x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = 2 \quad \text{or} \quad x = 3$$

$$\{1, 2, 3\} = \text{حل سیٹ}$$

20.6.(b) چار درجی (Biquadratic) مساوات حل کرنا اگر مساوات کے دو حقیقی روٹس دیئے گئے ہوں

فرض کریں $a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0, a_0 \neq 0$ چار درجی مساوات ہے اور α اور β اس کے دو

روٹس ہیں

اگر $f(x) = 0$ کے دو روٹس α اور β ہیں تو

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdot f_1(x)$$

جبکہ $f_1(x)$ دو درجی اظہاریہ ہے

مثال: چار درجی مساوات $x^4 - 9x^3 + 19x^2 + 9x - 20 = 0$ کے بقیہ دو روٹس معلوم کریں اگر اس کے دو روٹس 5 اور 1

حل: دی گئی چار درجی مساوات $x^4 - 9x^3 + 19x^2 + 9x - 20 = 0$ ہے جس کے روٹس 1 اور 5 دیئے گئے ہیں یعنی ضرب

دہندہ 5 اور 1 ہیں

طریقہ ترکیبی تقسیم سے ہمیں ملا

اس طرح ہمارے پاس دو درجی مساوات ہے

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + x - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 4) + 1(x - 4) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0$$


$$\Rightarrow x - 4 = 0 \quad \text{یا} \quad x + 1 = 0 \quad \text{یعنی}$$

$$\Rightarrow x = 4 \quad \Rightarrow x = -1$$

اس لیے بقیہ دو روٹس 4 اور -1 ہیں

$$\begin{array}{r|rrrr} 5 & 1 & -9 & 19 & 9 & -20 \\ & \downarrow & 5 & -20 & -5 & 20 \\ \hline & 1 & -4 & -1 & 4 & 0 \end{array} \quad \text{باقی}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ & \downarrow & 1 & -3 & -4 & 0 \\ \hline & 1 & -3 & -4 & 0 & 0 \end{array} \quad \text{باقی}$$



مشق 20.6

1. مکعب مساوات کے بقایا دو روٹس معلوم کریں جبکہ اس کا ایک روٹ دیا گیا ہے
 $x = 1$ اور $2x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$ (i)
 $x = 3$ اور $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$ (ii)
 $x = 2$ اور $x^3 - 28x + 48 = 0$ (iii)
2. چار درجی مساوات کے بقایا دو روٹس معلوم کریں۔ جب کہ اس کے دو روٹس دیئے گئے ہیں
 $x = 1, -\frac{1}{2}$ اور $12x^4 - 8x^3 - 7x^2 + 2x + 1 = 0$ (i)
 $x = 1, -1$ اور $x^4 + 4x^2 - 5 = 0$ (ii)
 $x = 3, -4$ اور $x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24 = 0$ (iii)
3. m کی قیمت معلوم کریں اور مساوات $2x^3 - 3mx^2 + 9 = 0$ کے بقایا روٹس معلوم کریں اگر ایک روٹ 3 ہے
4. اگر مساوات $x^3 - 3ax^2 - x + 6 = 0$ کا ایک روٹ 1 ہے تو a کی قیمت معلوم کریں اور اس کے بقایا روٹس بھی معلوم کریں
5. a اور b کی قیمت معلوم کریں اگر مساوات $x^4 - ax^2 + bx + 252 = 0$ دو روٹس 6 اور -2 ہیں۔ اس کے بقایا دو روٹس بھی معلوم کریں

20.7 ہمزا مساواتیں (Simultaneous Equations):

دو یا دو سے زیادہ مساوات ایک ساتھ جائیں تو اسے ہمزا مساواتوں کا نظام کہتے ہیں۔ دونوں معلوم تغیرات کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہمیں مساواتوں کے ایک جوڑے کی ضرورت ہے

تمام مترتیب جوڑوں (x, y) کا سیٹ جو مساواتوں کے نظام کی تسلی کرتے ہیں نظام کا حل سیٹ کہلاتے ہیں

20.7.(i)(a) دو متغیرات والی دو مساواتوں کو حل کرنا جب ایک مساوات یک درجی اور دوسری دو درجی ہو

مساوات کے نظام کو حل کرنے کا مکمل طریقہ جب ایک مساوات ایک درجی دوسری دو درجی ہو مثالوں کی حل کر کے بھی دکھایا گیا ہے

مثال 1: $2x + y = 10$ اور $4x^2 + y^2 = 68$ مساواتوں کے نظام کو حل کریں

حل:

$$2x + y = 10 \quad (i)$$

$$4x^2 + y^2 = 68 \quad (ii)$$

مساوات (i) سے

$$y = 10 - 2x \quad (iii)$$

y کی قیمت کو مساوات (ii) میں رکھنے سے

$$4x^2 + (10 - 2x)^2 = 68$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 100 - 40x + 4x^2 - 68 = 0$$

$$\Rightarrow 8x^2 - 40x + 32 = 0$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow x^2 - 5x + 4 &= 0 \\ x^2 - 4x - x + 4 &= 0 \\ (x-4)(x-1) &= 0 \\ \Rightarrow x-4=0 &\quad \text{یا} \quad x-1=0 \\ \Rightarrow x=4 &\quad \text{یا} \quad x=1 \end{aligned}$$

x کی ان قیمتوں کو مساوات (iii) میں رکھنے سے

جب $x=4$ تو $y=10-2(4)=2$

جب $x=1$ تو $y=10-2(1)=8$

بہس حل سیٹ $\{(4,2), (1,8)\}$ ہے

مثال 2: $3x-2y=7$ اور $xy=20$ مساواتوں کا نظام حل کریں


$$\begin{aligned} 3x-2y &= 7 & (i) \\ xy &= 20 & (ii) \text{ اور} \\ \text{مساوات (i) سے ہمارے پاس} \\ x &= \frac{7+2y}{3} & (iii) \\ x \text{ کی قیمت کو مساوات (ii) میں رکھنے سے} \\ \left(\frac{7+2y}{3}\right)y &= 20 \\ \Rightarrow 7y+2y^2 &= 20 \times 3 = 60 \\ \Rightarrow 2y^2+7y-60 &= 0 \\ \Rightarrow 2y^2-8y+15y-60 &= 0 \\ \Rightarrow 2y(y-4)+15(y-4) &= 0 \\ \Rightarrow (y-4)(2y+15) &= 0 \\ 2y+15=0 &\quad \text{یا} \quad y-4=0 \quad \text{یعنی} \\ \Rightarrow y &= -\frac{15}{2} \quad \Rightarrow y=4 \end{aligned}$$

y کی قیمت کو مساوات (iii) رکھنے سے

جب $y=4$ تو $x=\frac{7+2(4)}{3}=\frac{15}{3}=5$

جب $y=-\frac{15}{2}$ تو $x=\frac{7+2\left(-\frac{15}{2}\right)}{3}=-\frac{8}{3}$

بہس حل سیٹ $\left\{(5,4), \left(-\frac{8}{3}, -\frac{15}{2}\right)\right\}$ ہے



20.7.(i) (b) جب دونوں مساواتیں دو درجہ جی ہو (When both the equations are quadratic):

ہم نظام کو حل کرنے کے طریقے وضاحت کرتے ہیں مندرجہ ذیل مثال کے ذریعے جب دونوں مساوات دو درجہ جی ہوں

مثال 3: $x^2 + y^2 = 4$ اور $2x^2 - y^2 = 8$ مساواتوں کے نظام کو حل کریں

حل:

$$x^2 + y^2 = 4 \quad (i)$$

$$2x^2 - y^2 = 8 \quad (ii) \text{ اور}$$

y^2 خارج کرنے کے لیے مساوات (i) اور (ii) کو جمع کرنے سے ہمیں پاس

$$\therefore 3x^2 = 12$$

$$\Rightarrow x^2 = 4$$

$$\Rightarrow x = \pm 2,$$

$\therefore$ مساوات (i) میں $x = \pm 2$ رکھنے سے ہمیں ملا

$$(2)^2 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow 4 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow y^2 = 4 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow y = 0$$

$$(-2)^2 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow 4 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow y^2 = 4 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow y = 0$$

پس حل سیٹ $\{(-2, 0), (2, 0)\}$ ہے

مثال 4: $x^2 + y^2 = 13$ اور $xy = 6$ مساوات کے نظام حل کریں

حل:

$$x^2 + y^2 = 13 \quad \dots \quad (i)$$

$$xy = 6 \quad \dots \quad (ii) \text{ اور}$$

مساواتوں کے اس اقسام میں ہم مستقل کو خارج کرتے ہیں

مساوات (i) کو 6 سے اور مساوات (ii) کو 13 سے ضرب دینے سے ہمیں ملا

$$\therefore 6x^2 + 6y^2 = 78 \quad \dots \quad (iii)$$

$$13xy = 78 \quad \dots \quad (iv) \text{ اور}$$

مساوات (iii) اور (iv) کو تفریق کرنے سے

$$6x^2 - 13xy + 6y^2 = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 9xy - 4xy + 6y^2 = 0$$

$$\Rightarrow 3x(2x - 3y) - 2y(2x - 3y) = 0$$

$$2x - 3y = 0 \quad \text{یا} \quad 3x - 2y = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{3y}{2} \quad \text{یا} \quad x = \frac{2y}{3}$$



پس ہمارے مندرجہ ذیل دو نظام ہیں نظام B میں

$$\left. \begin{aligned} xy &= 6 \\ x &= \frac{3y}{2} \end{aligned} \right\} \text{ (A) اور}$$

$$\left. \begin{aligned} xy &= 6 \\ x &= \frac{2y}{3} \end{aligned} \right\} \text{ (B)}$$

نظام A میں

$$\left(\frac{3y}{2} \right) y = 6, \quad \left(\because x = \frac{3y}{2} \right)$$

$$\Rightarrow 3y^2 = 2 \times 6$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{2 \times 6}{3} = 4$$

$$y = \pm 2 \quad \text{جب } y = \pm 2 \quad x = \frac{3}{2}(\pm 2) = \pm 3$$

(ii) 20.7 دو درجی مساوات سے متعلق روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنا

مثال 1: دو متواتر مثبت صحیح اعداد معلوم کریں جن کا حاصل ضرب 72 ہے

حل: فرض کریں x اور $x+1$ متواتر صحیح اعداد ہیں

دی گئی شرط کے مطابق

$$\begin{aligned} x(x+1) &= 72 \\ \Rightarrow x^2 + x - 72 &= 0 \\ \Rightarrow (x+9)(x-8) &= 0 \\ \Rightarrow x+9 &= 0 \quad \text{یا} \quad x-8 = 0 \\ \Rightarrow x &= -9 \quad \Rightarrow x = 8 \end{aligned}$$

$x = -9$ کا منفی عدد رہنا نظر انداز کر دیں


8 اور 9 مطلوبہ متواتر صحیح اعداد ہیں

مثال 2: مستطیل پلاٹ کا رقبہ 320 مربع میٹر ہے۔ پلاٹ کی چوڑائی پلاٹ کی لمبائی 4 میٹر کم ہے۔ پلاٹ کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کریں

حل: فرض کریں پلاٹ کی لمبائی x ہے تو چوڑائی $x-4$ ہے دیا گیا ہے

پلاٹ کا رقبہ $320 m^2 =$ مربع میٹر

$$\begin{aligned} \Rightarrow x(x-4) &= 320 \quad [\text{رقبہ} = \text{لمبائی} \times \text{چوڑائی مربع میٹر}] \\ \Rightarrow x^2 - 4x - 320 &= 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow x^2 - 20x + 16x - 320 &= 0 \\ \Rightarrow x(x - 20) + 16(x - 20) &= 0 \\ \Rightarrow (x - 20)(x + 16) &= 0 \\ \Rightarrow x - 20 = 0 \quad \text{یا} \quad x + 16 = 0 \\ \Rightarrow x = 20 \quad \Rightarrow x = -16 \end{aligned}$$

$x = -16$ کو نظر انداز کریں کیونکہ لمبائی ہمیشہ مثبت ہوتی ہے
پس پلاٹ کی لمبائی 20 میٹر ہے اور پلاٹ کی چوڑائی 16 میٹر

مشق 20.7

مندرجہ ذیل مساواتوں کے نظام کل حل کریں

1. $x^2 + y^2 = 2$ یا $2x - y = 3$

2. $x^2 - 2x + y^2 = 0$ یا $2x + y = 4$

3. $4x + 3y = 25$ یا $\frac{4}{x} + \frac{3}{y} = 2$

4. $x^2 + (y + 1)^2 = 10$ یا $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$

5. $(4x - 3y)(x - y - 5) = 0$ یا $x^2 + y^2 = 25$

6. $2x^2 - 3xy + y^2 = 0$ یا $x^2 + y^2 = 16$

7. $xy = 2$ یا $x^2 + y^2 = 5$

8. $x^2 - 2xy = 2$ یا $x^2 + xy = 5$

9. $y + \frac{4}{x} = 25$ یا $x + \frac{4}{y} = 1$

10. 12 کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ ان کے مربعوں کا مجموعہ ان کے حاصل ضرب سے 4 زیادہ ہے۔

11. نماز کے ہال کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 5 میٹر زیادہ ہے اگر ہال کا رقبہ 36 مربع میٹر ہے تو ہال کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کریں۔

12. دو مثبت اعداد کے مربعوں کا مجموعہ 100 ہے ایک عدد دوسرے عدد سے 2 زیادہ ہے۔ اعداد معلوم کریں

13. قائمہ الزاویہ مثلث کے قاعدے کی لمبائی عمود کی لمبائی سے 3cm زیادہ ہے۔ جبکہ مثلث کا وتر 15cm ہے تو قاعدہ اور عمور کی لمبائی معلوم کریں۔

14. ایک متماثل الساقین مثلث کا احاطہ 36 سنی میٹر ہے مثلث دو غیر مساوی اضلاع کا ارتفاع 12 سنی میٹر ہے۔ مثلث کی تینوں اطراف کی لمبائی معلوم کریں۔

15. دو اعداد کا فرق 5 ہے اور ان کے مربعوں کے مربعوں کا فرق 275 ہے اعداد معلوم کریں

$$(a) \frac{3}{5} \quad (b) \frac{5}{3} \quad (c) \frac{7}{5} \quad (d) \frac{7}{5} \quad (e) \frac{2}{5}$$

$$\text{II} \quad \int_0^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x} \quad 0 \neq x, 0 = xq + x^2 \quad \int_0^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x} \quad \int_0^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

iii. $\frac{b}{b} - \frac{c}{c} = 0$ (a) $\frac{c}{b} - \frac{c}{b} = 0$ (b) $\frac{c}{b} - \frac{c}{b} = 0$ (c) $\frac{c}{b} - \frac{c}{b} = 0$ (d) $\frac{c}{b} - \frac{c}{b} = 0$

iv. $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$

(c) ہیر کی کڑی (p) تین کی کڑی

(q) کھجور کی کڑی (r) کھجور کی کڑی

$$\begin{array}{ll} 0 = \gamma - xq - \frac{1}{2}xp & (p) \qquad 0 = \gamma + xq - \frac{1}{2}xp \quad (c) \\ 0 = \gamma - xq + \frac{1}{2}xp & (q) \qquad 0 = \gamma + xq + \frac{1}{2}xp \quad (e) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 0 = v - xq - {}_v x^2 & \text{(p)} \\ 0 = v + xq + {}_v x^2 & \text{(q)} \end{array} \quad \begin{array}{ll} 0 = q + xv + {}_v x^2 & \text{(c)} \\ 0 = v + xq + {}_v x^2 & \text{(e)} \end{array}$$

VII. $\frac{a^3 + b^3}{a^2 + b^2}$ تي β اور α تي رو، $x^2 - 2x - 15 = 0$ (d) -26 (c) 26 (b) -34 (a) 34

(a) مساوی اور حقیقی
(b) مساوی اور ناقص حقیقی
(c) مساوی اور غیر حقیقی
(d) حقیقی و غیر حقیقی


ix. اگر دو مربع مساوی ہوں تو $2 + \sqrt{2}$ اور $\sqrt{2}$ کے درمیان

(a) 2 (b) $-2 + \sqrt{3}$ (c) $2 - \sqrt{3}$ (d) $-2 - \sqrt{3}$

$$\begin{array}{ll} 0 = 1 - x + \frac{1}{z}x & \text{(p)} \\ 0 = 1 + x + \frac{1}{z}x & \text{(q)} \\ 0 = 1 - x - \frac{1}{z}x & \text{(r)} \\ 0 = 1 + x - \frac{1}{z}x & \text{(s)} \end{array}$$

۱. پتھر اسی سے بنی ہے





2. مندرجہ ذیل مساوات کے روٹس کی نوعیت پر بحث کریں۔
- i) $x^2 - 7x + 12 = 0$ ii) $x^2 - 14x + 49 = 0$
- iii) $x^2 - x + 7 = 0$ iv) $x^2 - 5 = 0$
3. k کس قیمت کے لیے مساوات $x^2 + kx + 4 = 0$ کمپلیکس روٹس ہیں
- i) مساوی روٹس ہیں ii) کمپلیکس روٹس ہیں
- iii) حقیقی روٹس ہیں iv) ناطق روٹس ہیں
4. 729 کے مکعب روٹس معلوم کریں
5. مندرجہ ذیل دو درجی مساواتوں کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کریں
- i) $x^2 - 7x + 29 = 0$ ii) $x^2 - px + q = 0$
- iii) $7x - 8 = 5x^2$ iv) $11x = 9x^2 - 28$
6. دو درجی مساوات کے سمیٹرک تفاعل کی تعریف کریں
7. دو درجی مساوات تشکیل دیں جس کے روٹس $1 - \sqrt{3}$ اور $1 + \sqrt{3}$ ہیں
8. مساوات معلوم کریں جس کے روٹس مساوات $x^2 - 10x + 16 = 0$ کے روٹس کے معکوس ہیں۔
9. مندرجہ ذیل مساوات کے نظام کو حل کریں۔
- i) $x^2 + y^2 = 13$ ii) $x^2 + y^2 = 37$
- $x + y = 5$ $2xy = 12$

خلاصہ

- دو درجی اظہار $ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کا فرق کنندہ $\Delta = b^2 - 4ac$ ہے
- i. اگر $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ تو روٹس حقیقی اور غیر مساوی ہیں
- ii. اگر $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ تو روٹس غیر حقیقی ہیں (کمپلیکس یا غیر حقیقی)
- iii. اگر $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ تو روٹس ناطق اور مساوی ہیں، پر ایک $-\frac{b}{2a}$ کے برابر ہے
- iv. اگر a, b, c ناطق ہیں اور $\Delta = b^2 - 4ac$ مکمل مربع ہے تو روٹس ناطق اور غیر مساوی ہیں ورنہ غیر ناطق
- اکائی مکعب روٹس $1, \omega, \omega^2$ ہیں
- اکائی مکعب روٹس کی خصوصیات ہیں
- i. ہر اکائی کا مکعب کمپلیکس روٹ دوسرے کا مربع ہوتا ہے
- ii. اکائی کے تینوں مکعب روٹس کا مجموعہ صفر ہوتا ہے
- iii. اکائی کے تینوں مکعب روٹس کا حاصل ضرب 1 ہوتا ہے
- iv. ہر اکائی کے مکعب کا کمپلیکس روٹ دوسرے کا معکوس ہوتا ہے
- اگر α اور β دو درجی مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کے روٹس ہیں تو:
- $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ اور $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
- دو درجی مساوات کے روٹس کے سمیٹرک تفاعل ایسے تفاعل ہوتے ہیں جب روٹس آپس میں تبدیل کئے جاتے ہیں تو تفاعل تبدیل نہیں ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ یعنی: $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$